30455/C/2

Ex. de Montgenier

FKZ 1789

CC4

55250

DESCRIPTIONS
ET USAGES
DE PLUSIEURS NOUVEAUX
MICROSCOPES,
TANT SIMPLES QUE COMPOSEZ;

Avec de nouvelles observations faites sur une multitude innombrable d'insectes, & d'autres animaux de diverses especes, qui naissent dans des liqueurs préparées, & dans celles qui ne le sont point.

Par L. JOBLOT, *Professeur Royal en Mathématiques ; de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture ; demeurant sur le Quay de l'Horloge du Palais, au gros Raisin.*

Ex Bibliot. d. praesidis de Montesquieu Catal. inscript.

A PARIS,
Chez JACQUES COLLOMBAT Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture ; ruë Saint Jacques, au Pelican.

M. DCC. XVIII.
AVEC APPROBATIONS ET PRIVILEGE DU ROY.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AVERTISSEMENT.

UNe partie de cet Ouvrage n'eſt, à proprement parler, qu'une eſpece de Journal des obſervations que j'ay faites ſur une multitude infinie de tres-petits animaux inviſibles à la portée ordinaire de nos yeux.

La facilité que j'ay trouvé dans l'uſage de mes nouveaux Microſcopes, m'a conduit inſenſiblement plus loin que je ne penſois ; & m'a fait deſcendre dans un détail qui pourra être ennuyeux à ceux qui ne ſont pas accoûtumez à ſuivre la nature dans ſes operations, & qui n'ont pas appris par experience, que trop de négligence ſur des circonſtances qui ne ſemblent repréſenter rien de conſiderable, a ſouvent privé les Phyſiciens du fruit qu'ils auroient tiré d'une plus exacte application.

J'ay ajouté à mes obſervations des conjectures ſur les productions des differentes eſpeces de petits animaux qui ſe trouvent dans les liqueurs ; je ne puis être du parti de ceux qui les attribuent à la putrefac-

tion : cette opinion eſt d'autant moins concevable ; que ce ſeroit abandonner aux irrégularitez du hazard des Ouvrages qui ſe font toujours dans un ordre qu'on ne peut jamais aſſez admirer. J'en ay donc ſubſtitué une autre, qui me ſemble répondre nettement à la multitude presque infinie de toutes mes experiences.

J'ay diviſé tout cet Ouvrage en deux Parties : la premiere contient la conſtruction & les uſages de pluſieurs Microſcopes, plus commodes & plus parfaits qu'aucuns de ceux qui ſont venus juſqu'à preſent à ma connoiſſance. On les voit mis en perſpective ſur vingt-deux Planches, avec les plans & les profils qui ſont néceſſaires pour en bien faire comprendre la méchanique & l'uſage. Il y a deux ou trois de ces Microſcopes qui ſont d'une étenduë preſque univerſelle, & particulierement le dernier, qui a été repréſenté dans les Planches 20. & 21, ſur lequel on pourra monter en tres-peu de tems, & tout de ſuite, non-ſeulement des lentilles de differens foyers, mais auſſi de tres-petits Microſcopes à deux & à trois verres, depuis un pouce de longueur juſqu'à trois, dont les plus courts ont des avantages conſiderables, comme de faire paroître les objets dans leur ſituation droite ou naturelle, en les repréſentant clairement & diſtinctement ; faiſant d'ailleurs l'office de pluſieurs Loupes de differens foyers, & tellement conſtruit, que la lentille objective y devient oculaire quand on veut, ſans changer ſenſiblement la diſtance des deux verres qui le compoſent, ni le lieu qu'ils occupent dans la monture.

Et à ce dernier Microſcope univerſel, on pourra tres-facilement & ſans embarras appliquer des poiſſons de differentes longueurs & groſſeurs, & même de diverſes eſpeces, comme des Tétarts, des Grenoüilles, des Lamproyes, des Anguilles, des Brochetons, des Tanches, des Carpes, des Goujons, &c. en la queuë deſquels, & ailleurs, on aura le plaiſir de voir les divers mouvemens du ſang dans des vaiſſeaux diverſement courbez, formant entr'eux comme des ſyphons, dont les branches ſe rencontrent de telle maniere, qu'elles forment tantôt un arc de cercle, tantôt un angle droit, tantôt un obtus ou un aigu.

On y verra de plus de deux ſortes de vaiſſeaux de traverſes, tres-menus & tres-courts, ſituez differemment entre deux plus gros vaiſſeaux qui ſont paralleles entr'eux, de l'un deſquels on voit le ſang s'échaper par ces vaiſſeaux de traverſes, pour paſſer dans l'autre à angles droits, aigus, ou obtus. Et il faut remarquer qu'on ne voit dans ces vaiſſeaux ni anaſtomoſes, ni valvules qui empêchent le ſang de retourner en arriere.

Toutes ces diverſes obſervations, & pluſieurs autres dont je ne parle point icy, ne peuvent être confirmées que par un grand nombre d'experiences réïterées, & faites avec beaucoup de ſoin ſur les divers ſujets dont on vient de parler. Nous en avons déja fait voir une partie à pluſieurs perſonnes d'un merite diſtingué, & j'eſpere être dans peu de jours, en état de pouſſer encore plus loin que nous n'avons fait ces nouvelles découvertes; car ayant fourni pluſieurs Mi-

croſcopes à de celebres Medecins, à de fameux Anatomiſtes, & à pluſieurs autres illuſtres amateurs de ces nouveautez, il eſt preſque impoſſible que chacun d'eux, s'occupant agréablement à l'examen des effets ſurprenans de la nature, ne découvre tous les jours des choſes nouvelles & ſingulieres, dont on pourra dans peu faire part au Public, tant par des Conférences particulieres que nous eſperons faire, que par les Journaux des Sçavans, dans leſquels tous ceux qui les voudront lire, trouveront de quoy augmenter à l'infini le petit Ouvrage que je donne maintenant au Public.

Outre ces nouveaux Microſcopes, dont on vient de parler, je donne encore des deſſeins & des explications de pluſieurs autres que j'ay perfectionnez, en étendant leurs uſages ſans en augmenter conſiderablement la dépenſe : on verra, par exemple, dans la 10e. Planche le deſſein d'un Microſcope à tiges qui n'eſt pas de mon invention; mais les additions & les changemens que j'ay jugé à propos d'y faire, pourront peut-être plaire à ceux qui ont quelque eſtime pour cet inſtrument, que nous faiſons ſervir aux obſervations des animaux de pluſieurs liqueurs.

En corrigeant quelques defauts des Microſcopes à Canon de verre, qui ont encore été nommé Tombeaux; j'en ay auſſi étendu l'univerſalité plus loin qu'on n'avoit fait juſqu'à preſent.

On parle de plus d'un petit Microſcope à trois verres, repreſenté ſur la 15e. Planche, qui peut auſſi ſervir à deux verres conveves des deux côtez, en ſupprimant celuy du milieu, avec lequel on fera, ſi l'on

veut, en un moment, une petite lunette d'approche, qui fera paroître les objets dans leur ſituation droite ou naturelle.

Le même verre du milieu de ce Microſcope, & ſon oculaire, étant placez, comme on le dit, dans ſon lieu, ſerviront à faire une petite lunette d'approche, qui fera voir les objets dans une ſituation toute contraire à la précedente, n'employant pour cela que le corps du Microſcope même avec ce qu'il contient; & ce même inſtrument étant monté ſur un pied qui luy convienne, pourra encore ſervir à rendre viſibles les animaux de quelques liqueurs, & la circulation du ſang dans la queuë & ailleurs, de tous les poiſſons qui ſeront d'une grandeur & d'une groſſeur commode pour être appliqué ſans peine à cette petite machine.

En expliquant les uſages de chacun des Microſcopes qui ſont repréſentez dans cette premiere Partie; j'ay dit la maniere de préparer une même choſe differemment pour y être appliquée & obſervée. Ces repetitions m'ont paru néceſſaires en ces endroits; puiſqu'elles ſervent à rendre l'uſage de ces machines plus univerſel, & à ſatisfaire ceux qui ne veulent avoir qu'un ſeul Microſcope, accompagné d'une explication ſuffiſamment étenduë pour les inſtruire des uſages qu'ils en peuvent eſperer.

La ſeconde Partie de ce Livre contient douze Planches de même grandeur que les premieres, ſur leſquelles on a exprimé une partie des nouvelles découvertes que nous avons faites, par un grand nombre de Figures deſſinées & gravées élégamment, repré-

ſentant une multitude preſque infinie de divers animaux qui ont été inconnus juſqu'à preſent, & qui ont été vûs marchant, rampant & nageant dans des eaux préparées, & même dans celles qui ne le ſont point.

L'Hiſtoire anatomique que nous donnons de la plûpart de ces animaux nouvellement découverts, par la ſeule application de quelques gouttes preſque inſenſibles de liqueurs miſes au-devant de mes yeux, armez tantôt de l'une de nos nouvelles Machines, appellée Microſcope, tantôt d'une autre diverſement conſtruite, donne lieu d'eſperer que cet Ouvrage pourra être agréable au Public, tant par ſa nouveauté, que par l'utilité que les Phyſiciens, les Medecins, les Chirurgiens, les Anatomiſtes, les Chymiſtes, & d'autres perſonnes en pourront retirer; comme ſont les Deſſinateurs, les Peintres, les Graveurs, les Fabricateurs d'inſtrumens de Mathématiques, les Joüailliers, les Lapidaires, les Médailliſtes, les Antiquaires, les Verificateurs d'écritures, les Horlogeurs, les Lunetiers, &c. puiſque par le ſecours des verres de ces Microſcopes, les Artiſtes dont on parle, auront l'avantage de découvrir juſqu'aux moindres défauts de leurs Ouvrages, & même le moyen de les éviter, ou du moins d'approcher de plus près du point le plus haut de perfection; ce qu'ils ne pourroient faire ſans ce ſecours.

Je n'ay pû décrire les petits animaux qui ſe trouvent dans toutes les infuſions dont il eſt parlé dans cette ſeconde Partie, ſans leur donner des noms qui en fiſſent connoître la difference. Pour cet effet, j'ay cherché dans la nature des choſes qui me fuſſent aſſez

connuës,

connuës, & qui euſſent quelque rapport de reſſemblance avec les poiſſons que j'ay vûs dans mes liqueurs, pour leur donner les mêmes noms qu'on a donnez à ces diverſes choſes. Mais n'ayant pas toujours été aſſez heureux pour rencontrer de quoy me ſatisfaire, ſans doute, faute d'avoir une connoiſſance aſſez étenduë des divers êtres de la nature, j'ay été contraint de nommer d'autres poiſſons autrement, en leur donnant des noms qui en marquaſſent les inclinations particulieres, ou leurs mouvemens les plus ordinaires. Ainſi j'ay nommé les premiers Cornemuſes, Ovales, Chenilles aquatiques, Antonnoirs, Poules hupées, Rognons, &c. Et j'ay donné aux autres les noms d'Aveugles, de Piroüetteurs, de Goulus, d'Inconſtans, de Bouffons, d'Elegans, &c.

Enfin on verra une Diſſertation ſur la maniere dont les objets ſont vûs dans les Microſcopes, & dans les Lunettes d'approche, contenant pluſieurs experiences nouvelles, qui donnent occaſion de ſe déterminer en faveur de la meilleure des deux opinions qu'on s'y propoſe.

Imprimé aux dépens de l'Auteur.

APPROBATION.

J'Ay lû par l'ordre de Monſeigneur le Chancelier un Manuſcrit, qui a pour titre : *Deſcriptions & uſages de pluſieurs nouveaux Microſcopes, avec de nouvelles Obſervations, &c.* par M. Joblot Profeſſeur Royal en Mathématiques. Outre les nouveaux Microſcopes que l'Auteur y décrit, il en perfectionne pluſieurs autres, & rapporte quantité d'obſervations fort curieuſes qu'il a faites avec beaucoup de ſoin ; ainſi cet Ouvrage peut être utile & agréable au Public. A Paris ce trentiéme Novembre 1716.

Gauger.

APPROBATION DE L'ACADEMIE ROYALE de Peinture & Sculpture.

AUjourd'huy Samedy cinquiéme Decembre mil ſept cens ſeize, l'Académie s'eſt aſſemblée à l'ordinaire pour les Conferences ; Monſieur Joblot y a apporté un Ouvrage qu'il a compoſé, qui a pour titre : *Deſcriptions & uſages de pluſieurs nouveaux Microſcopes, tant ſimples que compoſez ; avec de nouvelles Obſervations faites ſur une multitude innombrable d'inſectes, & d'autres animaux de diverſes eſpeces, qui naiſſent dans des liqueurs préparées, & dans celles qui ne le ſont point.*

La Compagnie, aprés avoir écouté la lecture de la diviſion de tout l'Ouvrage, fait en deux Parties ; & avoir examiné plus de trente Planches in 4°, remplies de Figures deſſinées & gravées élégamment, repréſentant ſes nouveaux Microſcopes mis en perſpective, & accompagnez de tous les Plans & profils néceſſaires pour en bien faire comprendre la méchanique & l'uſage, a auſſi remarqué que dans la ſeconde Partie l'Auteur met en uſage ſes nouvelles Machines, pour faire l'hiſtoire anatomique d'une multitude preſque infinie de tres-petits animaux, qui ont été juſqu'à preſent inconnus, à cauſe de leur petiteſſe, & des grands défauts qui ſont inſéparables des Microſcopes ordinaires.

C'eſt pourquoy, la Compagnie ayant conſideré que cet Ouvrage pouvoit être tres-agréable au Public, tant par ſa nouveauté, que par l'utilité que les Phyſiciens, Medecins, Anatomiſtes, Chimiſtes & autres en pourroient retirer ; elle a bien voulu luy accorder la permiſſion de ſe ſervir du Privilége que le Roy a accordé à ladite Académie.

Fait & extrait par moy Secretaire de l'Académie, ce cinq Decembre mil ſept cens ſeize. Signé, Tavernier.

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT, portant Privilége du Roy.

Du 28. Juin 1714.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

SUR ce qui a été representé au Roy, étant en son Conseil, par son Académie Royale de Peinture & Sculpture, que depuis qu'il a plû à Sa Majesté donner à ladite Académie des marques de son affection, Elle s'est appliquée avec soin à cultiver de plus en plus les beaux Arts, qui ont toujours fait l'objet de ses exercices ; & comme la fin que Sa Majesté s'est proposée dans l'établissement de ladite Académie, composée des plus habiles du Royaume, a été non-seulement que la jeunesse profitât des instructions qui se donnent journellement dans l'Ecole du Modéle, des Leçons de Geométrie, Perspectives & Anatomies, & à la vûë des Ouvrages qui y sont proposez pour servir d'exemples ; mais encore que le Public fut informé du progrès qu'y font les Arts du Dessein, de la Peinture & Sculpture, en luy faisant part des Discours, Conférences & Descriptions qui pourroient le luy faire connoître, principalement en multipliant par la gravûre & impression les beaux Ouvrages de ladite Académie Royale, afin de les conserver à la posterité, unique moyen de perfectionner les Arts, & d'exciter de plus en plus l'émulation. A CES CAUSES, SA MAJESTE' desirant donner à ladite Académie, & à tous ceux qui la composent, toutes les facilitez & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs travaux utiles au Public: LE ROY E'TANT EN SON CONSEIL, a permis & accordé à ladite Académie, de faire imprimer & graver les Descriptions, Memoires, Conférences, Explications, Recherches & Observations qui ont été & pourront être faites dans les Assemblées de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture ; comme aussi les Ouvrages de Gravûre en taille-douce ou autrement ; & generalement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître sous son nom, soit en Estampes ou en impressions, lorsque aprés avoir examiné & approuvé lesdits Ouvrages de chacun des particuliers qui la composent, elle les aura jugez dignes d'être mis au jour, suivant & conformement aux Statuts & Reglemens de ladite Académie ; faisant SA MAJESTE' tres-expresses inhibitions & défenses à tous Imprimeurs, Libraires, Graveurs & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, excepté celuy qui aura été choisi par ladite Académie, d'imprimer ou faire imprimer, graver ou contrefaire aucuns Memoires, Descriptions, Conférences & autres Ouvrages gravez ou imprimez concernant ou émanez de la susdite Académie, ni d'en vendre des Exemplaires contrefaits en nulle maniere que ce soit, ni sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit de ladite Académie, à peine contre cha-

cun des contrevenans de trois mil livres d'amende, confiſcation, tant de tous les Exemplaires contrefaits, que des preſſes, caracteres, Planches gravées, & autres utenſiles qui auront ſervi à les imprimer & contrefaire, & de tous dépens, dommages & intereſts. VEUT SA MAJESTÉ que le preſent Arreſt ſoit executé dans ſon entier; & en cas de contravention, SA MAJESTÉ s'en reſerve la connoiſſance & à ſon Conſeil, & icelle interdit à tous autres Juges. FAIT au Conſeil d'Etat du Roy, SA MAJESTÉ y étant: tenu à Marly le vingt-huit Juin mil ſept cens quatorze.

Signé, PHELYPEAUX.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: Au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis; Nous te mandons & commandons par ces Preſentes, ſignées de notre main, que l'Arreſt dont l'extrait eſt ci-attaché ſous le contre-ſcel de notre Chancellerie, ce jourd'huy donné en notre Conſeil d'Etat, Nous y étant, tu ſignifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, & faſſes pour ſon entiere execution, tous Actes & Exploits néceſſaires, ſans demander autre permiſſion: Car tel eſt notre plaiſir. DONNÉ à Marly le vingt-huitiéme Juin l'an de grace mil ſept cens quatorze, & de notre regne le ſoixante & douziéme. *Signé*, LOUIS; *Et plus bas*, Par le Roy, PHELYPEAUX.

L'An mil ſept cens quatorze, l'onziéme jour de Septembre, à la requête de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture, établie par Sa Majeſté dans ſon Louvre à Paris; J'ay Pierre Colin Huiſſier Audiencier aux Requêtes du Palais, demeurant ruë de la Juiverie, Paroiſſe ſaint Germain le Viel, ſouſſigné, ſignifié & laiſſé copie imprimée du preſent Arreſt du Conſeil d'Etat du Roy, & Commiſſion ſur iceluy obtenus aux fins y contenuës, au Sieur Charles Robuſtel Syndic de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, en leur Bureau & Chambre Syndicale ruë des Mathurins, en parlant à ſa perſonne, & ce tant pour luy que pour les autres Libraires & Imprimeurs, à ce qu'ils n'en ignorent, ait à y ſatisfaire, & faire ſçavoir à ſa Communauté; lequel Sieur Robuſtel parlant que deſſus, a fait réponſe tant en ſon nom qu'en celuy de ſes Adjoints & de ſa Communauté, qu'il accepte la preſente ſignification, & qu'il n'empêche que le preſent Arreſt portant Privilége accordé par Sa Majeſté à ſadite Académie Royale de Peinture & Sculpture, n'ait ſon entiere execution; en ſe conformant par ceux qui feront graver & imprimer quelques Ouvrages ou Eſtampes en execution dudit Arreſt, aux Reglemens rendus au ſujet de l'Imprimerie & de la Librairie, & notamment à l'Arreſt du Conſeil du 17. Octobre 1704. qui ordonne, que de tous les Livres, feüilles, Eſtampes & gravûres, il en ſera fourni, avant de les expoſer en vente, huit Exemplaires en la Chambre Syndicale de la Communauté, & a ſigné, ROBUSTEL, Syndic.

Contre laquelle réponſe j'ay, pour ladite Académie, réïteré les défenſes portées au ſuſdit Arreſt, & proteſté de tout ce qu'il y a à proteſter, & laiſſé copie, tant du ſuſdit Arreſt & Commiſſion ſur iceluy, que du preſent. Signé, COLIN, avec paraphe. *Contrôlé à Paris le* 13. *Septembre* 1714. *R.* 45. *folio* 72. Signé, PONTAINT, avec paraphe.

Et en conſequence de l'Arreſt du Conſeil d'Etat ci-deſſus, portant Privilége, l'Académie Royale de Peinture & Sculpture a choiſi pour ſon Imprimeur-Libraire, le Sieur JACQUES COLLOMBAT Imprimeur ordinaire du Roy.

NOUVELLES

NOUVELLES OBSERVATIONS

Faites avec des Microscopes tout nouveaux, ſur une multitude innombrable d'insectes, et d'autres Animaux de diverses especes qui naissent dans des liqueurs prepareés et dans celles qui ne le sont point

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Description des Microscopes dont je me suis Servi.

Ayant dessein de raporter ce qui ſe peut Observer de plus ſingulier, et de plus imperceptible à la ſimple vûë dans divers mixtes, ſoit ſolides ſoit liquides, et ſur tout de décrire les petits Animaux que les yeux armez, d'exelents Microscopes, y apercoivent; J'ay crû

qu'aprés avoir préparé des infusions differentes, & même d'autres liquides qui doivent servir de matiere à cette Histoire naturelle, il falloit exposer d'abord toutes les pieces des instrumens que j'ay employez à ces recherches. Ceux qui auront du goût pour ces découvertes, pourront verifier par eux-mêmes mes experiences, & les pousser plus loin que je n'ay fait.

Description & usage des nouveaux Microscopes, dont on peut se servir à la lumiere du jour, ou à celle d'une chandelle.

CHAQUE Microscope me paroît avoir ses usages particuliers; de sorte que je ne pense pas qu'on en puisse inventer aucun qui renferme seul toutes les proprietez de ceux que je vais proposer.

En voicy un qui paroît exemt des défauts qu'on remarque dans les autres, & plus universel que ceux que j'ay vûs: seul, il servira à toutes les experiences qu'on fait ordinairement avec beaucoup d'autres diversement construits; & quoyqu'il paroisse d'abord fort composé, on avoüera qu'il est tres-simple par rapport à la diversité de ses effets; il a même cet avantage, que l'on peut comprendre en un instant la maniere de s'en servir, dans l'examen d'une infinité de nouveaux objets tres-agréables à la vûë, & tres-propres à prouver la puissance infinie du Createur, en exposant à nos yeux tant d'especes d'animaux, qui sont peut-être un million de fois plus petits que le ciron, que l'on peut regarder comme l'Elephant de la plûpart de ces insectes.

Planche 1. Ce Microscope représenté tout entier en A, est composé de quatorze à quinze pieces principales.

Planche 2. B, qui en est le profil, fait par la section d'un plan qui l'a divisé en deux parties égales, pour en faire voir le dedans, & les differentes épaisseurs des pieces qui le composent.

C, est la representation d'un manche qui se monte à vis sous le petit canon cilindrique du Microscope, où l'on a soudé une virole dans laquelle il y a un écrou, comme on voit dans le profil B.

D, est le dessein d'une petite boëte ou porte-lentille.

E, en

E, en eſt le profil; F, l'entrée; & G, le deſſous, où il y a un petit rebord pour ſoutenir un diaphragme qui doit porter la lentille marquée 2.

1, eſt une virole au bord ſuperieur de laquelle on a reſervé une moulure pour la tenir plus facilement; elle eſt refenduë en quatre differens endroits également eſpacez, pour faire l'effet d'un reſſort.

3, eſt le plan du deſſous de cette virole : ſon uſage eſt de retenir la lentille qui ſe met dans la boëte D, & de l'y affermir entre deux petits diaphragmes de plomb placez au centre.

H, eſt une platine vûë par devant, au milieu de laquelle il y a un trou de quatre lignes de diametre, pour recevoir pluſieurs boëtes l'une après l'autre, comme D, dans chacune deſquelles il y a une lentille, dont le foyer eſt different de celuy de chacune des autres; ce qui eſt tres-avantageux pour réüſſir dans les diverſes obſervations que l'on ſe propoſe de faire.

I, repreſente la même platine vûë par derriere; L, eſt le profil de la platine H, où on voit l'épaiſſeur de la queuë qui y eſt rivée & ſoutenuë par une roſette, comme on le remarque au bas de la platine H, où eſt ſon profil L.

M, eſt le deſſein d'un verre taillé en forme d'un quarré long, creuſé ſpheriquement au milieu, pour porter les gouttes de liqueurs qu'on y met, en ſorte qu'on puiſſe aſſez l'approcher de la lentille.

Ce verre M, qu'on peut nommer porte-objet, & qui doit avoir tres-peu d'épaiſſeur dans le milieu, eſt taillé en biſeaux des deux côtez les plus longs, afin qu'il entre juſtement dans une couliſſe repreſentée ſur la platine N; & qu'il y ſoit encore retenu, ſi l'on veut, par un levier à reſſort qui s'appuye deſſus; ainſi qu'on le voit exprimé dans le deſſein marqué N, & mieux encore dans ſon profil P O.

O, eſt le plan tout uni du derriere de cette même piece N.

P, eſt le profil du reſſort de la couliſſe, où l'on fait entrer les portes-objets, qui doivent être differens & nombreux, pour faire voir en peu de tems pluſieurs ſortes de choſes.

Q, eſt le deſſein d'une autre piece vûë par devant, qu'on peut nommer porte-pincette, à cauſe qu'on y en peut mettre pluſieurs l'une après l'autre ; tenant l'une un poux, l'autre une puce, &c. que l'on conduit vis-à-vis de la lentille du Microſcope, pour y être obſervée de tous côtez, par les mouvemens divers de la pincette, qu'on y tourne comme on veut; ſoit en l'avançant, ſoit en la reculant.

Planche 3.

Planche 3.

R S, eſt le profil de la pincette qu'on voit arrêtée ſur la piece marquée Q.

T, T, T, T, ſont differens deſſeins de pluſieurs pincettes à reſſort, plus commodes que la précedente, pour pincer facilement les petits inſectes vivans ou morts qu'on y veut attacher. X, eſt la repreſentation d'une platine ſoudée par le bas au petit canon cilindrique. Cette piece a deux ouvertures, la plus grande eſt de onze lignes de diametre; on y voit l'autre repreſentée dans ſa juſte grandeur, & dont les uſages ſeront cy-après expliquez.

V, X & Z, ſont trois pieces qui doivent être jointes & attachées enſemble, de chacune deſquelles il faut donner une idée aſſez claire pour en faire comprendre la méchanique & l'uſage.

V, eſt le deſſein de la premiere des trois pieces dont je viens de parler, vûë par devant; elle a une ouverture ronde de ſix lignes de diametre, & trois petits écrous autour d'elle, également eſpacez : & ſur le même plan on y a rivé deux pieces un peu élevées pour former une couliſſe.

Au derriere de cette même piece marquée par Y, & tout à l'entour de ſon ouverture, on y a fait une élevation en forme de parapet ou d'une virole épaiſſe d'une ligne, qui ſe loge & tourne librement dans l'ouverture ronde de la platine X.

Cette platine X, qui eſt la ſeconde & la plus grande des trois pieces qui doivent être liées enſemble, a onze lignes de diametre pour ſon ouverture.

Z, eſt la troiſiéme qui eſt toute ronde par ſes bords, & de peu d'épaiſſeur, auſſi-bien que les deux précedentes; elle eſt vûë ſeulement du côté poſterieur du Microſcope, & cachée du côté où ſont les reſſorts d'acier, dont nous parle-

tons bien-tôt. L'ouverture qui eſt au milieu n'a que ſix lignes de diametre : il y a vers le bord de cette circonference trois petits trous qui répondent juſtement aux trois écrous de la platine V.

On a de plus pratiqué autour de cette platine Z, & vers le bord exterieur de ſa circonference, un petit canal de deux lignes de largeur, & de peu de profondeur, pour y loger à des diſtances égales trois petits reſſorts d'acier trempez, qui ſont fixez par un bout ſur le fond de ce canal.

Cela ſuppoſé, il faut maintenant aſſembler ces trois platines ; & pour cet effet, appliquez le derriere Y de la platine V ſur le devant de la platine X ; & celle qui eſt marquée Z, ſur le derriere de la même platine X, en ſorte que les reſſorts la touchent, faiſant auſſi répondre les trois trous de l'une aux trois trous de l'autre ; & arrêtant enſuite ces trois platines ainſi poſées, avec trois petites vis, on aura le mouvement de la piece V, doux, égal & uniforme, en ſorte qu'elle demeurera fixe dans tous les endroits où il ſera néceſſaire qu'elle reſte.

&, repréſente le deſſein d'une piece compoſée d'un petit canon cilindrique, d'une autre piece à couliſſe, d'une virole au-dedans de laquelle il y a un écrou pour y faire entrer à vis le manche qui ſert à ſoutenir le Microſcope entier ; & enfin d'une petite rouë marquée b, au milieu de laquelle il y a un écrou. Planche 4.

a, eſt la repréſentation du profil de toutes les pieces dont nous venons de parler dans le deſſein marqué &.

c, eſt le plan de la largeur du reſſort attaché interieurement au-dedans du canon, par le moyen de deux petites vis, dont on voit les têtes & le corps dans le profil a.

5, 6, 7, ſont trois deſſeins d'une même piece creuſe, qui eſt faite en forme d'un parallelepipede rectangle, à laquelle on a attaché un reſſort qui regne le long de ſa partie ſuperieure, comme on voit en la figure 6, & une vis à ſon extrémité qui entre dans l'écrou de la rouë b, dont l'uſage eſt d'approcher ou d'éloigner les objets de la platine H, par un mouvement uniforme.

5 & 7 ſont deux profils de cette même piece ; l'un de ces

profils marqué 7, fait voir le dedans de la piece, & l'autre qui eſt repreſenté par le chiffre 5, la fait voir par le côté & par dehors, afin de voir l'épaiſſeur du reſſort.

d, eſt la repreſentation d'un gros canon, garni par dedans d'un tuyau de velours ou de drap noir, & de deux diaphragmes appliquez à ſes extrémitez.

e, eſt le profil de ce gros canon cilindrique : f & g, en repréſentent les diaphragmes.

h, eſt une eſpece de virole ou de boëte ouverte des deux côtez, qui ſert à arrêter les diaphragmes de diverſes ouvertures, qui ſe placent à l'extrémité objective du gros canon, auquel ſont attachez deux tenons à jour, par où paſſe une eſpece de regle à couliſſe, ſoudée à la partie ſuperieure du petit canon &. Entre les deux tenons de ce gros canon cilindrique, on apperçoit un petit reſſort d'acier trempé, dont l'uſage eſt de rendre le mouvement du canon plus égal.

La plus grande partie des pieces de ce Microſcope ſe peut faire d'argent ou de laiton. Les portes-objets doivent être faits de beaux morceaux de glace des plus tranſparens, & des mieux choiſis. On peut auſſi en faire quelques-uns de carton, ouvert par le milieu, ou de quelqu'autre matiere qui convienne aux divers objets qu'on y veut mettre, comme aîles de mouches, plumes menues de ſerins de canarie, &c.

Nous avons negligé de déterminer par des meſures particulieres, la grandeur de chaque piece de ce Microſcope ; parce que les Figures les repréſentent aſſez bien & aſſez juſte, dans les mêmes proportions que Monſieur le Febvre, tres-habile Ingenieur pour la conſtruction des inſtrumens de Mathematiques, les a executées.

Des uſages de ce Microſcope.

JE n'aurois jamais fait ſi je voulois rapporter tous les uſages de ce Microſcope ; c'eſt pourquoy, pour ne pas entrer dans un détail trop long, je me contenteray de dire en general, qu'on le peut employer tres-avantageuſement à l'examen des petits animaux, de leur ſang, & des autres

liqueurs contenuës dans leurs differens vaiſſeaux ; & à la découverte des moindres particules, tant des mineraux que des plantes, où l'on apperçoit une infinité de choſes nouvelles dans leurs graines, dans leurs tiges, dans leurs feüilles, dans leurs boutons, dans leurs fleurs ; & enfin dans toutes les infuſions de chacune de ces parties, ou de pluſieurs enſemble, dont la moindre goutte contient ſouvent une multitude prodigieuſe de créatures vivantes d'une petiteſſe qui échape aux meilleurs yeux deſtituez du ſecours de l'art.

Lorſque l'on ſe propoſe d'examiner quelques-unes des liqueurs dont il eſt parlé dans cette Hiſtoire, il faut enfoncer le petit bout d'un menu bâton, ou l'extrémité la plus menuë d'une plume, juſqu'à profondeur de deux lignes au plus, & vers les bords du vaiſſeau, y faiſant même toucher ce bout de plume, pour le porter enſuite chargé d'un peu de liqueur ſur le milieu du concave fait ſur le porte-objet de verre engagé dans la couliſſe, de la piece du Microſcope marquée N, qui eſt décrite cy-devant : par ce moyen une partie du peu de la liqueur, qui s'étoit attachée au bout de la plume, coule dans cette cavité du porte-objet, & y forme une gouttelette du diametre d'une ligne ou environ, qui paroît au Microſcope comme un lac d'une vaſte étenduë, dans lequel on voit nager une quantité ſurprenante de tres-petits poiſſons de diverſes groſſeurs, figures & mouvemens. Planche 2.

Nous expliquerons plus loin une nouvelle maniere d'appliquer le vinaigre ſur le porte-objet du Microſcope, plus convenable que celle-cy, parce qu'on y peut mettre tres-facilement beaucoup plus d'anguilles ; nous dirons ſeulement icy que les lentilles qui groſſiſſent le plus ſont les moins propres à obſerver ces inſectes, à cauſe que la grandeur monſtrueuſe ſous laquelle ces lentilles les font paroître, empêche de les voir toutes entieres ; de ſorte qu'il ſuffit de les obſerver avec une lentille d'environ une ligne & demie de foyer, pourvû qu'elle ſoit excellente.

Nous avons déja dit que les poux, les puces, & d'autres animaux de pareille groſſeur, pouvoient s'y obſerver tout vivans, par le moyen des pincettes qu'on ajoûtoit à la platine marquée Q, & nommée porte-pincettes ; & nous ajoû-

tons de plus, que ces mêmes inſectes peuvent être enfermez en un des portes-objets de verre creuſé ſpheriquement, & couvert d'une lame fort mince de verre ou de talc, afin de les empêcher de ſortir de leur priſon.

Pour faire tenir ce couvercle plat & tranſparent ſur le concave, on ſe ſervira d'un peu d'eau gomée, ou de la ſimple humidité de l'halene qu'on y pouſſera de près.

On peut encore attacher ces eſpeces d'inſectes, comme les mittes de fromage, les fourmis, &c. ſur un petit verre plan, ou ſur un concave de même matiere, au moyen d'un peu d'eau gomée dont on le moüille legerement avec un pinceau, ou avec le bout du doigt.

Les cheveux, les aîles de mouches, les petites plumes des oiſeaux, &c. ſe peuvent attacher à des portes-objets de carton fin percez à jour, qui entrent dans la couliſſe de la
Planche 2. platine N, où eſt attaché le petit levier à reſſort qui les y fixe, pour y être plus facilement obſervez.

Les mouches, & d'autres animaux de ſemblable petiteſſe, s'y peuvent obſerver toutes entieres, en les traverſant d'une aiguille, & les regardant dans cet état avec une lentille d'un foyer proportionné au volume de ces animaux.

Les rubans & les étoffes de ſoye s'attachent en petits morceaux à l'une des pincettes dont on a parlé, ou au bout d'un poinçon emmanché, qui doit entrer dans le petit bras cilindrique & creux du porte-pincette.

Les grains de ſable, les petites graines, la pouſſiere qu'on trouve dans les fleurs, & generalement tous les corps durs de pareille groſſeur, tranſparens ou non, s'y peuvent auſſi voir & obſerver tres-exactement.

Les grains de ſable y paroiſſent diverſement, ſelon les differentes façons de les préparer pour les y regarder.

Premierement, on les peut répandre ſur le concave ou porte-objet, humecté ſimplement de l'halene, en obſervant de n'y en mettre qu'autant qu'il y en faut pour n'être pas les uns ſur les autres, & les regarder avec une lentille de deux lignes de foyer ſeulement; tantôt au jour, & tantôt à la lumiere d'une chandelle; car de ces lumieres differentes il naîtra differentes ſenſations.

Secondement. Si ſur ces mêmes grains de ſable vous y faites tomber une petite goutte de vinaigre, dans lequel il s'y trouve des anguilles, elles vous fourniront un nouveau ſpectacle aſſez divertiſſant, par rapport à l'embarras où elles ſe trouvent de ſe dégager d'entre les maſſes de rochers formées par ces grains de ſable qui leur tombent ſur le corps, par les ſecouſſes qu'elles leur donnent, en les écartant les uns des autres, pour ſe faire un paſſage libre.

Troiſiemement. Mais comme cette préparation du grais, ou du ſable mis ſeul ſur le concave du verre, ou avec les anguilles, demande beaucoup d'adreſſe pour éviter qu'il ne ſe faſſe des rayes ſur ce concave ou porte-objet, qu'il faut tâcher de conſerver le plus long-tems qu'il eſt poſſible, à cauſe de la difficulté qui ſe trouve à le bien faire; j'ay jugé à propos de chercher un autre moyen de donner le même plaiſir, en évitant le danger dont je viens de parler.

Pour cet effet il n'y a qu'à ſe ſervir d'un porte-objet fait d'une lame de laiton, au milieu de laquelle on fait un trou d'une demie ligne de diametre, dans lequel vous mettrez une petite goutte de vinaigre, que vous pourrez obſerver ſeule, ou avec les grains de ſable, en les y répandant en petite quantité.

Quatriémement. Ces grains de ſable ſe peuvent encore obſerver, en les mettant ſur un porte-objet d'ébene noire, fait comme une petite dame, au bord de laquelle on y a reſervé deux petites élevations qui les empêchent de tomber, & un petit trou fait dans l'épaiſſeur de cette piece, où l'on fera entrer un manche d'argent ou de laiton, qui ſervira à la tenir comme en l'air, en le fourrant dans le bras du porte-pincette, & regardant ce qui ſera deſſus ce porte-objet de haut en bas, comme on regarde ordinairement les mêmes choſes avec un Microſcope à trois verres; puis comparant cette façon de voir à la précedente, on remarquera pluſieurs circonſtances qui feront peut-être le ſujet d'une diſſertation aſſez propre pour nous inſtruire de pluſieurs faits nouveaux ſur l'optique.

Toutes les graines & les autres corps d'une certaine grandeur ſe placeront de même, en obſervant de mettre ſur

une dame noire ceux qui seront blancs, & ceux qui auront de la transparence, & les opaques sur une autre dame blanche.

CHAPITRE II.

Description d'un autre nouveau Microscope à liqueurs.

CE Microscope, quoyque de petit volume, ne laisse pas d'être un des plus commodes que l'on ait jusqu'à present inventé; & principalement en ce que le porte-objet conserve à l'égard de la lentille le même point de distance qui ne se dérange pas, en y mettant de la liqueur nouvelle. Il est composé d'environ quinze pieces que l'on a dessinées séparement, afin d'en mieux faire connoître la construction & l'usage.

Planche 5. La Figure A est la représentation du Microscope entier, composé de toutes ses parties.

B, est une piece d'ébene façonnée, vûë par-dessous, & percée à jour dans son milieu; comme il paroît dans son profil D, où l'on voit un petit rebord x x, abaissé au-dessous de son plan inferieur, plus ou moins haut, selon l'épaisseur de la lentille qu'on y veut arrêter.

Cette piece d'ébene, dont le dessous est vû en B, pour exprimer non-seulement le plan qui s'applique sur la piece marquée F, de laquelle on va parler, mais aussi la largeur du rebord x x, celle de la virole, & l'un des deux diaphragmes de plomb qui doit couvrir la lentille, font ce qu'on nomme ordinairement le porte-lentille, dont le circuit x x doit entrer avec justesse dans l'ouverture pratiquée en F, & s'y arrêter ainsi montée par le moyen de deux petits tenons tournans, qui se peuvent remarquer à droit & à gauche de cette piece F.

Il est à propos d'avoir deux montures d'ébene ainsi construites, & de les garnir de lentilles d'inégales convexitez, pour augmenter plus ou moins l'apparence des objets.

La Figure E ou F, represente une plaque de laiton, qui doit

doit être attachée avec deux vis sur le corps du Microscope, comme on le peut voir en A.

Cette même piece est vûë en F par-dessus, & en E par le dessous, où l'on voit le ressort courbé qui y est attaché avec deux petits rivez.

Ce ressort que l'on a separé de la piece E, est representé tout seul au-dessous de la lettre H; le corps de ce Microscope, qui est une virole de laiton assez épaisse pour pouvoir être vissée par dehors, & avoir un écrou en dedans, est représenté par la Figure O ou N : il doit avoir deux petits bras qui débordent la circonference de son extrémité superieure, pour y attacher la piece E avec deux petites vis, comme elle paroît dans cette Figure N.

Cette même virole, au bas de laquelle on a fait une vis, doit aussi avoir un écrou en dedans qui luy réponde, comme on le peut remarquer dans son profil N; elle doit aussi avoir deux ouvertures quarrées à ses côtez opposez, de la largeur chacune d'un peu plus du quart de son circuit, pour recevoir la piece de laiton représentée en T M, qui y doit hausser & baisser librement, lorsqu'elle est poussée par la piece representée en Q, ou repoussée par le ressort H; & c'est entre cette piece & le ressort que se place le porte-objet creusé spheriquement, de maniere que la concavité de ce verre soit tournée vers la piece R, dont je parleray bien-tôt.

La Figure Q est une autre virole dans laquelle il y a un écrou pour recevoir la vis de la piece O, qui est le corps du Microscope.

Cette virole a un rebord dentelé, pour empêcher que les doigts ne glissent dessus en la tournant. Cette piece étant mûë en un sens, force le ressort, & pousse la plaque T M vers F; & par consequent approche de la lentille le porte-objet qu'elle soutient, & qui s'éloigne au contraire de cette même lentille, en tournant la virole Q d'un autre sens.

La Figure marquée par la lettre P, est le profil de la virole dont on vient de parler, où l'on voit un écrou en dedans.

S, représente un canon cilindrique d'ébene tres-noire, façonné au tour & enrichi de quelques moulures, ayant en-

viron vingt lignes de longueur : il eſt percé à jour, d'un bout à l'autre, pour laiſſer paſſer la lumiere, comme on le peut remarquer par ſon profil marqué R. Il y a une vis à l'un de ſes bouts qui doit entrer dans l'écrou interieur du corps du Microſcope, & à l'autre bout quelques moulures qui ne ſervent que d'ornemens, & un petit enfoncement qu'on y a pratiqué, pour y arrêter un diaphragme marqué V, au milieu duquel on fait un trou plus ou moins grand, ſuivant le plus ou le moins de lumiere qu'il faut, pour bien voir les objets qui ſont tout le ſujet de notre attention.

Pour ſe ſervir de ce Microſcope, la lentille étant arrêtée où nous avons dit qu'elle devoit l'être, & le porte-objet I placé entre la piece T M & le reſſort ; il n'y a qu'à ôter le canon S, & dans le milieu du concave qui ſe preſente, mettre avec le bout d'une plume un peu de la liqueur où ſont les animaux que l'on veut obſerver ; puis ayant remis le canon, approcher ou éloigner le porte-objet de la lentille, en tournant ou détournant la virole Q, juſqu'à ce qu'il ſoit au foyer.

CHAPITRE III.

Deſcription d'un troiſiéme Microſcope à liqueurs.

Planche 6. A, Repréſente le Microſcope tout entier vû de côté. B, eſt le profil de ce Microſcope, fait par la ſection d'un plan qui diviſe toutes ſes parties en deux également, pour en voir les diverſes épaiſſeurs.

C, eſt le deſſein du même Microſcope vû par-devant.

a, a, a, a, repreſentent quatre deſſeins du porte-lentille, dans l'un deſquels il eſt vû de côté ; dans un autre il eſt vû par-devant ; & les deux autres en ſont des profils, vûs dans deux ſituations differentes, l'une verticale, & l'autre horiſontale.

b, eſt une platine de laiton bien dreſſée des deux côtez, un peu recourbée par en bas, & ouverte par le haut d'un grand trou rond où s'enchâſſe le porte-lentille, qu'on y

arrête fermement par le moyen de deux petits tenons, rivez & mobiles au-devant de cette platine.

On a aussi rivé ou soudé au bas de cette même platine ; une vis d'acier d'environ quinze lignes de longueur, & de deux lignes au moins de diametre, qui s'engage à angles droits dans l'épaisseur de cette même piece.

c, c, c, c, est la representation du profil & des plans les plus larges d'un ressort d'acier trempé, & recourbé à peu prés comme sont les pincettes de même matiere qui servent à arracher le poil, & duquel les branches inégales contribuent à approcher & à éloigner parallelement au porte-objet f, la platine b. Ce ressort qui n'est attaché à aucune des pieces du Microscope, s'y applique pourtant tres-avantageusement, comme on le va dire.

On fait entrer le bout recourbé de la branche la plus courte de ce ressort dans une entaille ou fente faite vers l'extrémité superieure de la virole, où s'engage le manche du Microscope. Et l'autre bout recourbé du même ressort entre dans deux petites coches taillées aux côtez du bas de la platine marquée b.

d, d, d, est une seconde platine qui fait l'office d'un ressort, fenduë en sa partie superieure, ouverte par son milieu d'un grand trou rond, coudée un peu au-dessous de son extrémité d'en-bas, où elle est entaillée en demy cercle, pour embrasser la moitié du petit canon cilindrique, étant arrêtée d'ailleurs par une vis qui se fait voir entre les deux canons du profil B, de tout le Microscope.

e, e, e, e, representent une troisiéme platine, ouverte comme la précedente dans le milieu de sa plus large partie, étant soudée par sa base à la virole qui reçoit le manche du Microscope.

On voit au bas de cette même platine e, un petit canon cilindrique & creux, d'environ huit à neuf lignes de longueur, & de deux ou trois lignes au plus de diametre ; on l'y voit appliqué à angles droits & soudé : il est de plus traversé de bout en bout d'une vis attachée à la platine b.

Au derriere de la platine e, on y voit deux petits tenons en forme de crochets, qui servent à arrêter fermement le

gros canon au bout duquel on met les diaphragmes de diverses ouvertures.

f, eſt le porte-objet de verre, plan d'un côté, & concave de l'autre, pour y appliquer les liqueurs & les autres objets que l'on veut obſerver.

Ce porte-objet ſe fourre entre les deux platines d, e, de maniere que le côté plan regarde la lentille; & dans cette ſituation on le peut mouvoir ſelon le beſoin.

g, g, g, eſt une petite rouë dentelée, ſervant d'écrou à une vis attachée à la platine b, dont l'uſage, joint à celuy du reſſort, eſt d'approcher & de reculer la lentille de l'objet.

h, h, h, h, eſt un gros canon d'ébene qui ſert de diaphragme, & qui ſe monte derriere la troiſiéme platine e, à peu près comme le couvercle d'un ſucrier, ſur le ſucrier même.

Des Deſſeins auſſi correcTs & auſſi élegans que le ſont ceux-cy, de toutes les diverſes pieces qui compoſent ce Microſcope, ne me paroiſſent pas avoir beſoin d'une plus ample explication, particulierement ſi l'on ſe reſſouvient de ce que nous avons déja dit de quelques pieces qui entrent dans la compoſition des Microſcopes précedens, leſquelles ſont ſemblables, ou ont beaucoup de rapport à celles de celuy que je viens de décrire.

CHAPITRE IV.

Deſcription & uſage d'un quatriéme Microſcope tres-ſimple.

Planche 7. ABC, ſont les profils des trois pieces DEF, qui compoſent le Microſcope, que je fais ordinairement d'ébene.

La piece E du milieu, qu'on peut nommer le corps du Microſcope, contient deux écrous, l'un ſuperieur, & l'autre inferieur, qui ſe découvrent dans ſon profil B, pour recevoir les vis des pieces DF.

C, eſt le profil d'une autre piece percée à jour, ſur laquelle il y a une vis, & un verre qui eſt concave d'un ſeul

côté, dont l'usage est de porter les objets qu'on met dessus pour y être observez.

A, est le profil d'une autre piece, où l'on voit une vis qui se monte dans l'écrou superieur de la piece du milieu marquée B. Cette piece A peut être appellée porte-lentille; parce qu'on y en met une entre deux diaphragmes representez en G, G; & on les y fixe avec une petite virole de laiton H, qui fait ressort.

Cette lentille I étant ainsi portée proche de l'œil, fait découvrir un champ d'autant plus grand, qu'elle en est prés. Il ne faut pourtant pas que ce verre soit si proche de l'œil, qu'il en puisse être terni par la transpiration de cet organe.

Il y a un trou au-dessus du porte-objet F, d'environ une ou deux lignes de diametre, qui permet le passage aux rayons de lumiere qui servent à éclairer les objets que l'on met sur le concave F.

Le diaphragme de laiton ou de plomb qui se met entre la lentille & l'œil, doit avoir une ouverture proportionnée au foyer de cette lentille; & il faut qu'elle soit d'autant plus petite que la lentille aura moins de foyer.

Je mets aussi souvent un semblable diaphragme O, au-dessous du concave F, & j'en proportionne l'ouverture aux experiences que j'en veux faire, & au plus ou moins de foyer de ce concave, & même à la transparence plus ou moins grande des objets placez au concave F, où on les attache differemment. Par exemple, si vous y voulez mettre du sable, de menues graines, ou quelques poudres transparentes, vous les y ferez suffisamment tenir, en humectant de votre haleine ce porte-objet.

Les aîles de mouches ou leurs pattes, les fourmis, les poux, les puces, les mittes de fromage, les plus petites plumes des oiseaux, les cheveux, &c. s'y arrêtent avec un peu d'eau gomée, ou quelque chose d'équivalent, qu'on y applique en petite quantité, & aux endroits convenables.

On peut aussi enfermer des animaux vivans, comme des mittes avec leurs œufs, entre le concave F & un verre plan des deux côtez, qui soit de peu d'épaisseur.

Le ſang des animaux s'y met tout chaud, avec le plus petit bout d'une plume à écrire.

Les gouttes de l'eau des huiſtres à l'écaille, & toutes les infuſions qui contiennent des animaux aſſez gros pour y être vûs, s'y attachent pareillement d'elles-mêmes.

Les anguilles de vinaigre ſe prennent & s'y mettent avec un petit tuyau de verre en forme d'antonnoir, de la grandeur & de la figure qui eſt icy repreſentée; ce qui ſe pratique tres-facilement en cette ſorte. J'enfonce dans le vinaigre la partie MN de l'antonnoir, & après l'avoir poſée ſur mon concave, j'y fais deſcendre la petite goutte de vinaigre contenuë dans l'eſpace MN, en boûchant la plus large ouverture avec le doigt, pour preſſer l'air contenu depuis L juſqu'en M, après quoy on met ainſi ce vinaigre aſſez près de la lentille pour y voir les anguilles à loiſir; puiſque cette goutte doit être aſſez groſſe pour n'être évaporée qu'en une heure ou environ dans un tems temperé.

On peut, ſi l'on veut, les y conſerver durant ſept ou huit jours en eſté, & pendant quinze en hyver, en mettant ſur le concave où elles ſont un petit verre plan des deux côtez, qui empêchera que ce peu de liqueur ne s'évapore entierement durant tout ce tems-là, & donnera lieu à un ſpectacle des plus curieux, par les differentes choſes qu'on y verra, & dont nous devons parler dans la ſuite de cet Ouvrage.

Pour faire auſſi que ce Microſcope ſerve à diſtinguer les petits objets qui ne ſont pas tranſparens, & à les obſerver comme on le fait avec les Microſcopes à deux ou à trois verres; il n'y a qu'à faire une ou deux ouvertures quarrées à côté de la piece E, qui ſert de corps au Microſcope, & mettre ces objets ſur le concave, ou ſur un autre porte-objet qui leur conviennent, tournant au jour l'une de ces ouvertures.

On peut tourner pluſieurs pieces ſemblables à celle qui ſe voit marquée par F, & garnir de differens petits corps choiſis tous les portes-objets comme F qui doivent les ſoutenir, & être aiſément ſubſtituez les uns aux autres, afin de faire voir plus promptement à une ou à pluſieurs perſonnes ce qu'on y aura appliqué.

Ce n'eſt pas une neceſſité de multiplier les portes-objets, il ſuffira d'en avoir ſeulement deux, ſçavoir un pour y fixer le verre concave C, & l'autre marqué F, qui ait un petit rebord pour mettre dedans pluſieurs cartons ſur leſquels on aura arrêté divers objets, que l'on placera l'un après l'autre ſur la piece marquée F, afin de les y obſerver.

Le deſir que j'ay eu de ſatisfaire la curioſité de pluſieurs perſonnes de merite, & la neceſſité où je me ſuis trouvé de tranſporter dans des lieux éloignez quelques-unes des infuſions, dont je parle dans la ſeconde Partie de ce Traité, pour y faire voir dans la moindre goutte de chacune les divers animaux qu'elle contenoit, m'ont obligé de chercher une invention commode pour ſervir à ce tranſport.

En méditant là-deſſus il ſe preſenta pluſieurs moyens; dans chacun deſquels je trouvois des défauts conſiderables, qui ne me permettoient de m'en ſervir, que parce que de meilleurs me manquoient. Je deſirois toujours d'en trouver un, tel que le vaiſſeau où ſeroit la liqueur fut fort petit, & déboûché même dans le tranſport, ſans pourtant que la liqueur qu'on y auroit miſe en pût ſortir d'elle-même, en quelque ſituation qu'il ſe trouvât; que ce vaiſſeau fût facile à préparer, & enfin ſi commode qu'avec peu d'adreſſe on pût facilement garnir de liqueurs les portes-objets des Microſcopes dont je me ſers.

Toutes les conditions de ce Problême me parûrent d'abord tres-difficiles à remplir; & je puis aſſurer qu'il n'y eût que la néceſſité où j'étois d'en venir à bout qui fut capable de m'obliger à pourſuivre mes recherches. Et enfin je m'aviſay d'une machine la plus ſimple & la plus aiſée de toutes celles qu'on pourroit fabriquer pour l'uſage auquel on la deſtine.

P Q, eſt le profil d'une petite phiole de verre à long col, faite par un Emailleur: elle a environ trois pouces de longueur, & la boule ſix lignes ou environ de diametre: l'ouverture de l'extrémité P eſt d'une bonne demie ligne, & cela ſuffit pour empêcher la liqueur d'en ſortir d'elle-même.

Maintenant pour faire entrer la liqueur dans une de ces

petites machines, qu'on peut regarder comme une eſpece particuliere de Thermométre ; il faut fourrer en dedans un fil de laiton R S, plus menu que ſon ouverture, après l'avoir moüillé dans toute ſa longueur, en ſorte qu'y étant enfoncé, ſon extrémité d'en-haut ſurpaſſe de deux lignes l'ouverture qui eſt en P, afin qu'ayant plongé le menu bout du petit antonnoir dans la liqueur dont on veut garnir le Thermométre, on porte enſuite ſur l'extrémité R du fil ce même bout N par où la liqueur s'eſt inſinuée à la hauteur M N, de deux ou trois lignes, de maniere que ce fil de laiton y entre ; puis preſſant du doigt l'ouverture ſuperieure de l'antonnoir, l'on fera deſcendre la liqueur dans le Thermométre P Q ; ce qui ſe réïtérera autant de fois qu'on le jugera à propos : & ce Thermométre ainſi préparé ſe pourra tranſporter par tout.

Lorſque l'on voudra garnir d'une goutte le concave ou porte-objet du Microſcope, il n'y aura qu'à poſer le bout P du Thermométre dans ce concave, & envelopper ſa boule avec les doigts, afin qu'en échauffant & rarefiant quelque peu l'air qu'elle contient, il en puiſſe faire ſortir un peu de liqueur. Et il faut remarquer que quand on aura mis du vinaigre, par exemple dans l'un de ces Thermométres, il n'y faudra pas mettre d'autre liqueur, parce que la ſeule vapeur du vinaigre feroit mourir ſubitement les petits inſectes de cette liqueur.

Enfin ſi l'on veut que ces petits Thermométres ſervent pluſieurs fois, il faudra en faire ſortir la liqueur qui y ſera reſtée après s'en être ſervi durant quelque tems ; parce que venant à s'épaiſſir par l'évaporation, ce qui reſtera ne manqueroit pas de faire une craſſe aſſez épaiſſe pour rendre cette petite machine incapable de ſervir une autre fois.

CHAP.

CHAPITRE V.

Conſtruction d'un cinquiéme Microſcope à liqueurs, par le moyen duquel on pourra employer des lentilles ſoufflées, & de celles qui ne le ſont point, depuis les plus petits foyers juſqu'aux plus grands.

CE Microſcope, qui ſe voit repreſenté tout entier en A, y eſt vû à peu près de la grandeur que nous l'avons conſtruit; il eſt à la verité un peu plus compoſé que le précedent; mais il a en récompenſe de plus grands uſages, comme il ſera facile de le comprendre par l'explication que nous en allons donner. Planche 1.

La premiere piece de cet inſtrument contient deux vis, dont les pas ſont égaux: elles ſont faites ſur des cilindres de differens diametres, comme on le peut voir dans le profil marqué I.

Cette piece, qui eſt creuſée interieurement dans toute ſa hauteur, a deux diaphragmes, l'un en B & l'autre en C, afin de ne laiſſer paſſer que les rayons de lumiere qui la traverſeront directement par le milieu de C en B.

La ſeconde piece marquée 2 eſt cilindrique & creuſe dans toute ſa hauteur, qui n'eſt pas conſiderable; puiſque trois lignes au plus ſuffiſent pour y faire un écrou d'un pas de vis ſemblable & égal à celuy de la plus petite vis de la premiere piece ſur laquelle cet écrou doit être monté.

E, repreſente le profil d'un verre concave d'un côté, & plat d'un autre; ſi mince à l'endroit creuſé, qu'il n'y ait pas plus d'épaiſſeur de verre, que la lentille la plus convexe dont on ſe ſervira aura de foyer.

On attache ce verre concave, ou une feüille de talc bien tranſparente, avec un peu d'eau gomée, en ſorte que le côté plat du verre concave ſoit exterieur; ainſi qu'on l'a repreſenté en E: il eſt à propos d'avoir au moins deux pieces ſemblables & égales à cette ſeconde, l'une qui porte un mor-

ceau de talc, & l'autre un verre plan concave, pour servir à diverses experiences.

3, est une autre piece cilindrique creuse, & assez haute pour faire qu'étant montée à vis, au moyen d'un écrou qu'on y aura formé, sa base L L puisse descendre jusqu'au dernier pas qui est sous m m, diametre de la plus grosse vis faite sur la premiere piece, aprés avoir monté la seconde sur la plus petite vis qui est au haut de cette premiere piece; de sorte qu'elle sert comme de surtout aux pieces précedentes 1. & 2.

On pratique au haut de cette piece un rebord tres-mince & fort ouvert dans son milieu, comme on peut voir en G G; afin que ce peu d'épaisseur n'empêche pas d'approcher assez la lentille des objets que l'on voudra observer.

La quatriéme piece est un porte-lentille qui a peu d'épaisseur; il est percé d'un trou rond d'une grandeur convenable à la lentille, & aux pieces qui luy servent de monture.

Quand les lentilles sont d'un long foyer, par exemple de deux à trois lignes, on les y monte à peu prés comme nous l'avons dit dans l'explication du Microscope précedent; & lorsqu'elles sont d'un tres-court foyer, il les faut arrêter entre deux petites platines de laiton gratté tres-mince, ou entre deux platines de plomb qui soient de peu d'épaisseur, & qui se colent l'une contre l'autre vers les bords en dedans avec un peu d'eau gomée, ou plutôt avec de la cole dont les Menuisiers se servent.

Cette monture se doit enchâsser dans une petite piece d'ébene tournée proprement, qui soit d'un diametre un peu plus grand que celuy de la troisiéme piece, ainsi qu'on la voit representée en la quatriéme Figure, où 1, 1 marquent les extrémitez de tout le diametre de cette piece qu'on applique à l'œil, & dont le milieu H est l'endroit où la lentille est placée.

Tout cela supposé, nous passerons à l'explication des usages de ce Microscope. Si l'on veut premierement examiner les anguilles du vinaigre, il faudra prendre tres-peu de cette liqueur avec la petite machine de verre faite en forme d'antonnoir, dont on a déja parlé, & faire descendre

cette goutte dans la concavité du porte-objet de verre attaché à la piece 2, puis monter cette piece ſur la plus petite vis de la premiere ; enſuite on mettra le ſurtout par-deſſus, & au haut de celle-cy le porte-lentille marqué 4, que l'on promenera ſur G G, avec les deux premiers doigts d'une main, tenant en même tems avec les deux doigts de l'autre l'extrémité D D de la premiere piece, qu'on tournera d'un côté ou d'un autre, afin de mettre les objets qui auront été poſez dans le concave, au point de diſtinction où ils doivent être arrêtez pour y être apperçûs comme il faut; à l'occaſion dequoy il eſt neceſſaire d'avertir, qu'on ne voit bien exactement ces animaux, que lorſque toute la goutte de vinaigre eſt preſque entierement évaporée, particulierement ſi l'on ſe ſert d'une lentille d'un tres-court foyer, à cauſe de l'extrême vîteſſe avec laquelle ils y nagent au commencement que la liqueur eſt trop fluide.

En ſecond lieu, ſi l'on veut examiner les animaux des autres liqueurs, il vaut mieux ſubſtituer au verre concave la piece où eſt la feüille de talc, à cauſe de la difficulté qu'il y a à creuſer le verre comme il le doit être, pour bien faire ces ſortes d'obſervations avec les plus petites lentilles.

D'ailleurs, comme il faut moins de liqueurs pour découvrir ces derniers animaux, que pour les premiers, l'évaporation s'en fera plutôt, & l'on ne tardera pas à appercevoir ce qu'il y a de plus conſiderable dans cette petite portion de liqueur appliquée ſur ce talc.

Ce Microſcope a cet avantage par-deſſus les autres, qu'on peut en un inſtant connoître exactement tous les foyers de differentes lentilles qu'on y applique l'une aprés l'autre ; & quoy qu'on ne l'ait imaginé que pour les obſervations des liqueurs, il peut auſſi ſervir à examiner tous les petits corps tranſparens ; & parce qu'on peut mouvoir aiſément la lentille pendant l'obſervation, on a le plaiſir de ſuivre un animal dans ſon allure, durant tout le temps qu'il parcourt l'étenduë de la goutte de liqueur qu'on a miſe ſur le porte-objet du Microſcope.

Si l'on veut ſe ſervir de ce Microſcope pour examiner les cheveux, les aîles de mouches, les grains de ſable, les

mittes, &c. il faudra faire plusieurs pieces semblables à la deuxiéme, garnie chacune d'une petite feüille de talc bien transparente qui tienne en E, & attacher aussi de même ce qu'on veut voir, y employant les lentilles qui conviennent le mieux à chacun des objets qu'on y aura attachez.

L'on sçaura au reste qu'il y a des objets qu'il faut examiner à la lumiere d'une chandelle, plutôt qu'à celle du jour pour les bien appercevoir.

Que la seconde piece de ce Microscope doit avoir une ouverture assez spacieuse pour pouvoir facilement ôter la saleté que laissent les liqueurs qu'on y avoit mises en experience, tant sur le verre que sur le talc, ce qui s'execute en moüillant d'un peu de salive un petit linge dont on couvre le doigt pour détremper & essuyer ces endroits, qui doivent être tres-nets avant que d'y remettre de nouvelle liqueur.

Et qu'enfin la plûpart des pieces de ce Microscope peuvent être construites d'argent ou de laiton, d'ébene, &c.

Pour peu que l'on fasse de réflexion sur tout ce que nous avons dit de la construction & des nsages des Microscopes, l'on jugera de la necessité qu'il y a d'en avoir de plus d'une sorte, si l'on desire de satisfaire pleinement sa curiosité là-dessus.

CHAPITRE VI,

Description d'un sixiéme Microscope à liqueurs, d'une construction fort singuliere, pour mettre en usage les lentilles d'un tres-petit foyer.

LE dessein APO, represente ce Microscope tout entier.

B, est une petite platine d'argent ou de laiton de peu d'épaisseur, au milieu de laquelle est un trou rond d'environ
Planche 9. quatre lignes de diametre.

On voit au haut de cette platine une petite entaille d'une

ligne en quarré, pour loger un tenon dont on va parler. Au milieu du bas de cette platine on y voit une reserve longue d'environ une ligne ou deux, & d'un peu moins de hauteur, pour servir en partie à fixer cette platine sur celle dont je vais parler.

C, D, sont deux diaphragmes de plomb.

E, est une seconde platine un peu plus grande que la précedente, & de même matiere, au milieu de laquelle on a fait une ouverture ronde égale à celle qui a été faite au milieu de la premiere; & au-delà de sa circonference on y a pratiqué un petit rebord creusé dans l'épaisseur de cette platine E, pour y poser les diaphragmes C, D, comme on pose un tableau dans sa bordure.

On voit au sommet de cette même platine, & immediatement sous la lettre E, un petit tenon qu'on peut hausser & baisser, ou le tourner, si on le fait autrement, pour servir à arrêter le haut de la premiere platine B.

Il y a encore au bas de la platine E un petit trou quarré plus long que large, où l'on fait entrer la petite piece recourbée qui a été reservée à l'extrémité inferieure de la premiere platine B; ainsi on arrête fermement les deux diaphragmes C, D, & la lentille du Microscope que l'on place adroitement entre ces deux platines.

Cette seconde platine E, dont on voit l'épaisseur dans son profil au-dessous de G, est soudée à angles droits sur l'extrémité d'un petit canon F, qui doit couler librement & avec justesse dans un autre canon plus court marqué P.

Le canon F est ouvert par-dessous dans toute sa longueur, afin que la vis attachée à la rouë H puisse appuyer sur la fourchette I, qui fait ressort, & tourner en avançant & en reculant, pendant que l'on approche de l'œil, ou qu'on en éloigne la lentille du Microscope.

H, est une rouë au centre de laquelle on a rivé une vis d'environ un pouce de longueur, qui sert à faire mouvoir la platine E, que l'on peut nommer porte-lentille.

I, I, est une piece de laiton ou d'argent, vûë de front à droit, afin que l'on en puisse découvrir la largeur; & de côté à gauche, pour en faire voir l'épaisseur.

Cette piece eſt courbée en équerres, & au-deſſus de ſa courbure on a fait un écrou dans un trou rond, dont on a retranché la partie ſuperieure, pour former du reſte une eſpece de fourchette qui ſe voit à l'endroit marqué I, dont on va parler.

Cette petite fourchette s'introduit par-deſſous la vis R, qui en eſt pouſſée de bas en haut, à cauſe du point d'appuy qu'elle a ſur le haut de la virole du manche O; ainſi cette fourchette fait l'office d'un reſſort attaché par ſon extrémité d'en-bas, au moyen d'une petite vis qui entre dans la virole de ce manche, à l'endroit marqué N.

Le deſſein L, qui eſt à gauche, eſt la repreſentation d'un porte-objet vû par derriere; & celuy qui eſt du côté droit le repreſente vû par devant.

On voit bien par ces deux figures que le verre concave où l'on met la liqueur que l'on veut obſerver, entre à couliſſe dans une piece de laiton ou d'argent de peu d'épaiſſeur, dont la conſtruction en découvre aſſez la méchanique, pour qu'on puiſſe ſe paſſer d'une explication plus étenduë que ce que j'en viens de dire, pour en donner l'intelligence.

Ce porte-objet ſe place au-devant d'une troiſiéme petite platine, au milieu de laquelle (comme au milieu des precedentes) il y a un trou rond.

Cette petite platine eſt ſoudée ſur l'extrémité exterieure du gros canon qui ſe voit immediatement au-deſſous de la lettre A, par le moyen d'une ouverture qu'on a faite à cette platine, & de deux eſpeces d'oreilles qui font reſſort, comme on le peut facilement juger, en jettant pour un moment les yeux ſur les endroits marquez Q, Q, dans le deſſein qui repreſente le porte-objet L.

On voit en M un diaphragme façonné au tour, qui ſe met au bout exterieur du gros canon A de ce Microſcope. Il eſt bon d'en avoir de pluſieurs ouvertures, parce qu'une ſeule ne ſuffit pas toujours pour qu'on puiſſe bien diſtinguer les animaux de diverſes groſſeurs & de diverſes tranſparences.

O, eſt la repreſentation du manche qui ſert à tenir le Microſcope d'une main, pendant que l'on obſerve les liqueurs qui ſe mettent l'une aprés l'autre ſur le porte-objet ou con-

cave de verre represénté en L, qui s'approche de l'œil, ou qui s'en éloigne en tournant d'un côté ou d'un autre, avec le second doigt de la même main qui tient le manche du Microscope, la petite rouë marquée H.

Enfin il n'est pas difficile de comprendre, que ce Microscope a encore l'avantage de faire partir le porte-lentille dés le moment que l'on commence à tourner cette rouë H, à cause que le levier I, poussant continuellement la vis R de bas en haut, elle l'empêche d'avoir d'autre jeu que celuy dont elle a besoin pour faire le bon effet que les habiles gens desirent icy.

CHAPITRE VII.

Description & usage d'un nouveau Microscope à tiges, tres-commode pour observer toutes sortes de petits objets, soit de jour ou de nuit, à la lumiere d'une chandelle.

Cette petite machine est faite de trois ou quatre gros fils de laiton ou d'argent tirez à la filiere, ayant chacun environ trois pouces & demi de longueur, & un peu plus d'une ligne de diametre ; de deux doubles équerres ; de deux petits ressorts ; de plusieurs lentilles de differens foyers, & de quelques autres pieces dont je vais parler. Planche 19.

On voit ce Microscope placé debout sur un petit pied au milieu de cette planche, & environné des pieces qui doivent l'assortir.

La premiere tige E, E, est refenduë pour former une pincette, si commode que chacun s'en peut servir ; car en pressant les deux petits boutons qui sont rivez aux branches de la petite pincette, elle s'ouvre facilement, & lorsque l'on cesse de les presser, elle se ferme d'elle-même.

La seconde tige B G est recourbée en équerre, afin qu'elle puisse porter d'une façon convenable les pieces que nous avons nommées portes-lentilles, & les approcher ou éloigner des objets que l'on veut observer.

La troisiéme tige H H porte une pointe d'éguille à l'une de ses extrémitez, pour servir aux divers usages dont je parleray ci-aprés.

Chacune des doubles équerres, que l'on voit en D C D, est percée en trois endroits ; sçavoir, d'un trou bien rond à chacune de ses extrémitez, & d'un autre trou aussi tres-rond dans le milieu.

Ces équerres sont adossées l'une sur l'autre, & attachées ensemble par le moyen d'un clou rond, si bien rivé par ses extrémitez, qu'on les puissent tourner autour de ce même clou, comme on tourne les deux jambes d'un compas autour de celuy qui les lie ensemble.

Les deux petits ressorts courbez en façon d'un arc, sont deux pieces minces de laiton ou d'argent battuës à froid, de la longueur de l'espace interieur compris entre chaque double équerre.

Ces ressorts ainsi courbez doivent être un peu creusez en rond & en long sur leurs extrémitez pour recevoir une partie des tiges, les engager en quelque façon, & les empêcher de couler trop librement dans les yeux des équerres.

Enfin l'on passe deux tiges, par les yeux de chacune de ces équerres, aprés avoir placé entr'eux les ressorts qui doivent pousser ces tiges, & composer ainsi ce qu'on peut appeller le corps du Microscope.

Il faut maintenant parler des autres pieces qui entrent dans la composition de cette petite machine ; pour cet effet, nous dirons premierement que la lentille est un petit morceau de glace bien choisie, taillée de façon qu'elle devienne tranchante par ses bords, afin que l'axe commun à ses deux convexitez soit perpendiculaire aux surfaces convexes de cette lentille.

Le porte-lentille est une piece d'ébene, au milieu de laquelle on a pratiqué un trou rond, que je nomme l'orbite de la lentille, parce qu'il la reçoit & qu'il sert à l'enchâsser ; de même que la partie de notre crâne, nommée de ce nom, sert à enchâsser l'œil qui contient le cristalin, figuré de même que la lentille dont nous parlons, & qui a de semblables proprietez.

Le

Le petit trou qui eſt au milieu d'un diaphragme de plomb, ou d'une autre matiere convenable, qui ſe place ſur la lentille, & dont la petite ouverture doit être tournée du côté de l'œil, repreſente la prunelle, parce qu'elle en fait icy l'office.

Le trou qui eſt fait dans l'épaiſſeur du bord du porte-lentille, ſert à mettre le bout G recourbé de la tige B G.

Le porte-objet ſimple, repreſenté en I, eſt une piece d'ébene noire d'un côté, & blanche de l'autre, à peu prés ſemblable à une dame à joüer, ayant autour de ſa circonference une petite élevation en forme de parapet, pour empêcher que le ſable, ou quelque petite graine qu'on y aura miſe, ne tombe de deſſus.

Cette eſpece de dame eſt percée dans le milieu de ſon épaiſſeur; & le trou rond qu'on y a fait eſt rempli d'une petite cheville de liege, pour y enfoncer la pointe d'une groſſe aiguille que l'on voit repreſentée au bout de la tige H H.

Le porte-objet MNO, qui doit ſervir à l'examen des animaux qui ſe trouvent dans les liqueurs, eſt un petit tuyau cilindrique d'un pouce ou environ de longueur, & de huit à neuf lignes de diametre, garni comme on le va dire.

L'une des extrémitez de ce tuyau, & la plus éloignée de l'œil, eſt bouchée d'une piece de bois dur, au milieu de laquelle on a fait un petit trou rond d'environ une ligne de diametre, pour ſervir de diaphragme.

On ferme auſſi l'ouverture M, de ce même tuyau cilindrique, d'une ſeconde piece de bois tournée, & tellement conſtruite, que l'on puiſſe enchâſſer dans ſon milieu un petit verre concave d'un ſeul côté ſeulement, dans le milieu duquel on met les liqueurs que l'on veut obſerver.

Il y a un petit trou fait au-deſſus de la ſuperficie cilindrique de ce tuyau, tellement accommodé à la groſſeur de la pointe d'aiguille qui eſt enchâſſé en H, qu'il puiſſe être arrêté fermement ſur cette pointe, afin de ſervir aux divers uſages pour leſquels on deſtine ces pieces.

La Figure P repreſente un diaphragme qui doit être placé

ſur les lentilles d'un long foyer, qui s'enchâſſent dans des portes-lentilles ſemblables à celuy qui eſt marqué par F; & on l'y fixe au moyen d'une petite virole à reſſort, marquée par la lettre Q.

Le deſſein repreſenté en R eſt un petit carton à jour, dans l'épaiſſeur duquel on a placé l'aîle d'une mouche, pour faire comprendre comment on peut arrêter certains objets, afin qu'on les puiſſe facilement obſerver étant placez dans la pincette.

S, eſt un petit tuyau de verre fait en forme d'antonnoir, pour ſervir comme on l'a déja dit.

Et T, eſt une petite bouteille à long col, de l'uſage de laquelle on a auſſi parlé.

Des uſages de ce Microſcope.

CE Microſcope, quoyque tres-ſimple, ne laiſſe pas d'avoir beaucoup d'uſages. Il peut ſervir à obſerver des animaux tres-petits, qui marchent ou qui rampent ſur la terre; & même ceux qui volent dans l'air, ou enfin qui nagent dans des liqueurs préparées, & dans celles qui n'ont aucune préparation. Il ſert auſſi pour obſerver de tres-petits corps, dans leſquels on ne remarque aucun mouvement apparent, quoyque toutes leurs parties ſoient dans une agitation continuelle.

Si l'on bat le fuſil ſur une feüille de papier blanc, & qu'on ramaſſe une partie de ce qui ſera tombé avec une lame de coûteau aimantée, en obſervant ces petites particules miſes ſur un porte-objet blanc, on aura le plaiſir d'y voir de petites boules d'acier tout pur, pendant que l'on en découvrira qui ſont moitié acier & moitié verre; & enfin d'autres qui ſeront de verre toutes pures. Et ſi l'on ſe donne la peine d'examiner le papier, les endroits où ſont tombées les boules paroîtront noirs & brûlez. Je ne m'arrête pas icy à rendre raiſon de ces effets, parce qu'il eſt facile de les expliquer.

L'aîle d'une mouche ordinaire nous manifeſte des choſes digne d'admiration. Si on l'obſerve exactement, on verra

que ses bords sont garnis de deux sortes de poils roides & aigus, artistement rangez, & espacez également. Qu'elle a des veines & des arteres, & par consequent qu'il s'y fait une circulation de la liqueur qui les remplit. Que le tissu fin & délié de la membrane qui se trouve entre ces veines & ces arteres, est parsemé d'un grand nombre d'autres poils plus petits que ceux qui environnent l'aîlé de la mouche; & qu'ils sont plantez obliquement dans l'étenduë de cette membrane d'une maniere tres-singuliere.

La moindre petite plume d'un oiseau, comme par exemple celle d'un serin de Canarie, étant observée avec ce Microscope monté d'une lentille d'environ deux lignes de foyer, nous fait voir que sa composition est telle, que chaque petit brin de sa barbe est une plume toute entiere, qui a son tuyau & ses brins semblables à ceux de la grosse plume; & ainsi de suite.

Le tissu d'un morceau de toile, celuy des rubans de diverses couleurs, & des taffetas changeans, étant bien observez, il nous fera comprendre en un moment ce qui seroit devenu peut-être le sujet d'une meditation de plusieurs années, si nous n'eussions employez que nos seuls yeux, pour regarder toutes ces choses.

Pour observer le poux & la puce tout vivans, durant plusieurs jours de suite, il les faut pincer par la croupe avec la pincette à boutons; par ce moyen on aura le plaisir d'observer toutes les parties exterieures du corps de chacun de ces animaux domestiques, que l'on voit quelquefois inquietez par d'autres animaux qui parcourent leurs corps, & qu'on peut nommer le poux du poux, & la puce de la puce; tant par le rapport de grosseur des uns à celle des autres, que par la figure des petits, & celle des gros.

Les mittes de fromage & leurs œufs, les poux des serins de Canarie, les mittes des poires & celles des pommes un peu vieilles, s'attachent sur un porte-objet noir avec un peu d'eau gomée, ou avec la pointe d'une aiguille moüillée de cette même eau, afin de les y voir tout vivans durant plusieurs jours de suite.

Les mouches un peu grosses, & plusieurs autres animaux,

s'empalent au moyen de la pointe d'aiguille qui eſt au bout de l'une des tiges de ce Microſcope ; & par ce moyen l'on pourra tres-facilement en examiner toutes les parties exterieures, & découvrir par-là l'erreur des Anciens, & de quelques Philoſophes modernes, qui ſe perſuadent que les mouches ne ſe tiennent ſuſpenduës contre les corps ſur leſquels elles marchent, qu'à cauſe qu'il ſort continuellement de leurs pattes une eſpece d'humeur gluante qui les y attache.

Pour obſerver les anguilles du vinaigre, il faut ſe ſervir du petit antonnoir marqué S, afin d'en prendre un peu pour le porter dans le concave de verre qui eſt au bout du canon cilindrique, qui ſe monte ſur la tige qui porte une pointe, pour y être obſervé.

Et à l'égard des autres liqueurs, on les placera l'une après l'autre dans ce concave de verre, en prenant la précaution de le rendre net à chaque experience que l'on voudra faire.

CHAPITRE VIII.

Deſcription & uſage des Microſcopes à Canon de verre ; que quelques perſonnes nomment Tombeaux : & d'autres, Cimetiere de divers animaux.

CEs Microſcopes, qui ſont au nombre de trois, & qui ne different entr'eux que dans la façon de les monter, ſont tres-commodes & tres-utils pour obſerver une partie de ce qui ſe paſſe tant dans les animaux vivans, que dans ceux qui ſont morts, depuis la groſſeur d'une puce juſqu'à celle d'un haneton. Planche II.

Le plus ſimple eſt compoſé de ſix pieces, ſçavoir d'un pied ou baſe, d'un canon de verre, d'un couronnement, de la piece de l'œil ou porte-lentille, d'une lentille de verre, d'une vis ou d'une petite virole pour arrêter cette lentille.

ABCDE, eſt le deſſein de ce Microſcope entier.

Figure I. A, eſt l'endroit où s'applique l'œil, pour voir les objets que l'on a mis dans ce Microſcope.

BB, represente la piece de l'œil, ou le porte-lentille qui se monte à vis dans le couronnement CC, au moyen d'un écrou qu'on y a fait pour la recevoir.

D, est la representation du canon de verre qui est collé ou enchâssé par ses extrémitez dans la partie superieure de la base EE de ce Microscope, & dans l'inferieure du couronnement CC.

G, est la lentille d'un foyer convenable à la hauteur du canon D; elle s'enchâsse dans une cavité pratiquée dans la piece de l'œil B, où on l'y arrête le plus fermement qu'il est possible par le moyen d'une virole H, au défaut de laquelle on peut employer une vis, qui sera même plus commode à monter & démonter la lentille, lorsqu'il sera necessaire de la nettoyer. Figure 1.

F, est le plan de la piece ABB, vûë par-dessus.

Et G, represente la lentille.

Description du second Microscope à Canon.

CE second Microscope, qui est monté d'une maniere tres-simple, est composé de sept pieces, sçavoir d'une base, d'un canon de verre, d'un couronnement, de la piece de l'œil, d'une lentille, d'une virole, & d'une boëte qui luy sert de pied. Planche XI. Figure 2.

ABCDE, est le dessein du Microscope tout entier, environné des pieces qui le composent.

EE, est la base de ce Microscope, ornée au milieu de quelques moulures, au-dessus & au-dessous desquelles on a representé deux vis pour y monter l'étuy F, qui se voit à gauche du Microscope, & dont F qui est à sa droite en est le profil, pour en faire voir le dedans.

D, represente le canon de verre, enchâssé & collé par ses extrémitez dans les cavitez pratiquées au-dessus de la base EE, & au-dessous du couronnement CC; & au haut de ce couronnement on y a fait un écrou pour recevoir la piece de l'œil marquée BB, qui porte la lentille.

IBB, est le plan superieur de la piece de l'œil vûë par-

deſſus, dont le milieu H eſt occupé par la lentille, que l'on voit ſeule du côté droit ; & G eſt la virole qui arrête cette lentille ; parce qu'elle eſt propre à faire reſſort.

La piece F, qui eſt à gauche du Microſcope, eſt ſa boëte, qui luy ſert auſſi de baſe, pour le tenir plus facilement.

Le deſſein auſſi marqué F, qui ſe voit du côté droit du Microſcope, eſt le profil de cette même boëte, pour en faire voir le dedans & ſon épaiſſeur.

Le troiſiéme Microſcope à canon eſt conſtruit comme le ſecond, à la reſerve ſeulement qu'il paſſe une baſe viſſée au travers de la piece E E, dans laquelle on a fait un écrou ; & c'eſt ſur le deſſus de cette piece viſſée que ſe poſent les objets pour y être examinez, en hauſſant ou en baiſſant la vis qui les ſoutient.

CHAPITRE IX.

Des uſages que l'on peut tirer des Microſcopes dont je viens de parler.

APrès avoir expliqué les diverſes manieres de monter les Microſcopes à canon de verre, il faut dire quelque choſe des principaux uſages que l'on en peut tirer ; & quoyque ces Microſcopes ne puiſſent point ſervir à voir les animaux des liqueurs, on ne les doit pas negliger pour cela. Ce que je vais dire de leurs proprietez, ſervira à perſuader de la neceſſité qu'il y a de s'en ſervir.

Pour obſerver les petites graines des plantes, & pour en découvrir facilement toutes les beautez, il les faut répandre chacune à part ſur des petits portes-objets blancs & noirs, où vous aurez mis un peu d'eau gomée pour les y attacher proprement ; afin de mettre après cela ces portes-objets l'un après l'autre ſur le fond du troiſiéme Microſcope ; car il eſt tres-commode pour faire l'examen de ces graines, & d'autres petits corps ſemblables en groſſeur que l'on veut conſerver long-tems.

Les poux des ſerins de Canarie, ceux des poules, les mittes de fromage & leurs œufs, les petits inſectes vivans, qui ſont à peu près de cette groſſeur, peuvent ſervir à former des groupes dans des Tableaux couverts de ces petits animaux vivans; ſur chacun deſquels on pourra appercevoir des choſes ſurprenantes, tant dans la groſſeur apparente, dans les couleurs, figures & mouvemens des parties de ces petites creatures, que dans l'inégalité de la durée de leur vie.

On mépriſe ordinairement ces inſectes, & d'autres petits animaux, que les hommes diſent devoir leur naiſſance à une matiere corrompuë; mais il eſt facile de montrer que ce mépris eſt injuſte, & qu'il n'eſt fondé que ſur l'ignorance de la choſe qu'on mépriſe, & ſur le préjugé, qui fait que l'on s'imagine voir les corps tels qu'ils ſont en eux-mêmes. Il n'y a rien de mépriſable dans la nature, & tous les ouvrages de Dieu ſont dignes qu'on les reſpecte & qu'on les admire; principalement ſi l'on prend garde à la ſimplicité des voyes par leſquelles Dieu les a faits & les conſerve. Les plus petits moucherons ſont auſſi parfaits que les animaux les plus énormes: les proportions de leurs membres ſont auſſi juſtes que celles des autres; & il ſemble même que Dieu ait voulu leur donner plus d'ornemens qu'il n'en a donné aux plus gros, afin de récompenſer par-là la petiteſſe de leur corps.

Ils ont des couronnes, des aigrettes, & d'autres ajuſtemens ſur leurs têtes qui effacent tout ce que le luxe des femmes peut inventer: & l'on peut dire que tous ceux qui ne ſe ſont encore ſervis que de leurs yeux, n'ont jamais rien vû de ſi beau, de ſi juſte, ni même de ſi magnifique dans les Palais des plus grands Princes, que ce qu'on voit avec le Microſcope ſur la tête & ſur le corps d'une ſimple mouche.

Il eſt vray que ces choſes ſont tres-petites, mais elles en ſont plus ſurprenantes, puiſqu'il ſe trouve tant de beautez ramaſſées dans un ſi petit ſujet; & quoyqu'elles ſoient communes, elles n'en ſont pas moins eſtimables.

Si l'on enferme dans ce Microſcope à canon de certaines chenilles, & qu'on les y examine durant quelque tems & à diverſes repriſes, on les apperçoit toutes veluës, & couvertes de longs poils brillans, de couleurs variées & diſperſées

avec tant d'art, que ce qui nous effrayoit d'abord, se trouve ensuite un sujet d'admiration; car au bout d'environ cinq ou six semaines on les voit quitter un charmant surtout, qui conserve tres-long-tems la beauté des couleurs qu'on y avoit vûës, pour se faire voir sous la forme de plusieurs coques à peu prés semblables à celles des vers à soye, sans qu'on puisse remarquer en ces coques aucun mouvement apparent: mais au bout de quelque tems notre étonnement semble devoir se redoubler, en voyant sortir de ces nouvelles prisons, qui paroissoient bien fermées, des papillons bien aîlez & tout vivans.

Cette métamorphose apparente, quoyque belle, ne contient pas tant de faits surprenans, que nous en avons remarquez durant près d'un an, à l'occasion d'un petit insecte dont je vais parler.

Le dixiéme Juin de l'année 1692. je trouvay à terre dans mon cabinet un petit ver, dont les diverses formes sous lesquelles je le vis dans un Microscope à canon de verre, meritent bien que j'en fasse une description particuliere, pour donner lieu à l'explication de tout ce que nous en dirons de singulier.

Ce petit ver me parut d'abord de couleur brune, tirant sur celle d'un caffé qui n'est pas encore assez torrefié. Son corps, qui avoit six lignes de longueur & une & demie de diametre, étoit presque rond dans toute cette dimension.

Il paroissoit composé de onze anneaux, sans y comprendre la tête, ornée d'une espece de cocluchon arondi par le bas.

Le dernier des anneaux qui terminoit son corps, finissoit par deux aiguillons courts & obtus, qui representoient une queuë fourchuë.

Tous ces anneaux beaux & luisans étoient attachez à une membrane tres-fine & blanchâtre, que ses contractions & ses extentions alternatives pouvoient approcher & écarter les uns des autres, en rendant cet animal tantôt plus court & plus gros, tantôt plus long & plus menu.

On remarquoit trois petites pattes de chaque côté de son corps, & une seule griffe au bout de chacune, laquelle étoit d'une

d'une couleur d'ambre bien foncée ; celles des deux pattes les plus proches de ſa tête, luy ſervoient comme de main pour prendre ſa nourriture, & pour la porter à ſa bouche.

Sa tête étoit ornée de deux yeux bien noirs, placez des deux côtez, au-devant deſquels étoient plantées deux petites cornes, compoſées de pluſieurs articles.

Les premiers jours que je conſideray ce petit animal, il étoit d'une vivacité merveilleuſe, faiſant des ſauts qui marquoient beaucoup de force & de ſoupleſſe dans le ſujet qui les executoit.

Depuis le dix Juillet juſqu'au deuxiéme de Septembre, cet inſecte en produiſit dix autres tres-menus qui luy reſſembloient tous, & qui dés le premier moment de leur naiſſance marchoient d'une vîteſſe ſurprenante. J'en garday un en vie durant dix jours ſans luy donner aucune nourriture ; ce qui ne paroîtra pas trop extraordinaire, lorſqu'on ſçaura que ſa mere, pendant une année ou environ, n'en conſuma pas plus que de la groſſeur d'environ un pois.

Cet inſecte aprés avoir fait ſes petits, quitta entierement ſa peau durant vingt-quatre heures, aprés quoy il parut d'une blancheur vive & plus gros qu'auparavant, marquant même plus de force & de mouvement, qu'il n'en avoit montré depuis pluſieurs jours.

On peut dire que cette peau luy tenoit lieu de ſurtout pour envelopper toutes les parties exterieures de ſon corps; puiſqu'on remarquoit dans ce ſurtout juſqu'au moule des yeux, des jambes & des griffes de cet animal.

J'employai aſſez de tems à conſiderer cet ancien fourreau, ſans pouvoir deviner comment l'inſecte avoit pû faire pour s'en dépoüiller ; parce que ce vêtement étant tout d'une piece, & tres-intimement appliqué ſur ſon corps, je ne comprenois pas comment cette nymphe ſi irréguliere, ſi fine & ſi délicate avoit pû être tirée ſans ſe rompre. Mais peu de tems aprés je revins de mon étonnement, & je ceſſai d'admirer cette méchanique, en découvrant ſa ſimplicité ; car cette membrane venant à ſe ſeicher, les fibres qui la compoſoient ſe reſſerrant laiſſerent voir tout l'artifice, qui conſiſtoit en une fente étenduë depuis le bec de l'animal juſqu'à

l'anus ; laquelle, à meſure que le ver en ſortoit, ſe refermoit en rapprochant par le reſſort de la pellicule, ſes bords l'un de l'autre, qui ſe joignoient ſi juſtement qu'il n'étoit pas poſſible d'y appercevoir aucune ſeparation.

Dés le ſoir même du jour que ce ver eût quitté ſon ſurtout, ſa couleur me parut changée ; car de blanc qu'il étoit, en deux jours il redevint auſſi brun qu'il avoit été ; & je luy vis paſſer tout l'hyver en cet état. Il fut aſſez en repos durant tout ce tems-là, ne remuant qu'inſenſiblement, ne mangeant point, ni ne rendant aucun excrement viſible : mais étant ſurvenu quelques beaux jours de Soleil, & l'y ayant expoſé, il commença à s'y mouvoir un peu plus qu'il ne faiſoit auparavant, & même il mangea quelque peu d'un carton qui ſervoit de baſe ou de fond au Microſcope dans lequel je le conſervois.

Sur la fin du mois d'Avril je ne luy remarquai, pendant neuf jours qu'il demeura couché ſur le dos, aucun ſigne de vie, aprés lequel tems je fus ſurpris de voir qu'il travailloit fortement à quitter un ſecond ſurtout, qu'il pouſſoit tout le long de ſon corps, de la tête vers la queuë, où il en reſta juſqu'au ſixiéme Juin, durant lequel tems je le crus mort : cependant le même jour au ſoir je m'apperçûs qu'il avoit entierement quitté cette derniere peau, & qu'il paroiſſoit ſous une forme nouvelle, qui ne differoit pas moins de la precedente, qu'un ver differe d'une mouche. En effet, le ſixiéme Juin à ſept heures du matin il s'étoit métamorphoſé en une mouche tres-ſinguliere, ayant environ cinq lignes de longueur, & une ligne un quart de largeur par le milieu de ſon corps.

En obſervant cette mouche, je remarquai qu'entre la tête & ſon corps il y avoit une autre partie en forme d'anneau mobile ; que la couleur étoit differente en divers endroits du corps ; le deſſus de la tête, & cette partie en forme d'anneau, étant d'un rouge brun, & le reſte ayant une blancheur tirant ſur le roux ; mais cette couleur blanchâtre ſe diſſipa en peu de tems ; car deux heures aprés le tout parut d'un rouge brun.

A la place des onze anneaux qui ſe diſtinguoient dans la

longueur du ver, on voyoit alors tout ſon corps long de huit lignes, couvert de deux aîles fermes & dures.

Au lieu de ſix pattes courtes dont j'ay parlé, on en voyoit ſix autres, chacune deſquelles avoit pour le moins quatre fois la longueur des premieres, & étoit compoſée de trois articles; étant terminées par deux griffes aſſez foibles, au lieu d'une ſeule un peu forte.

Les cornes qu'il avoit au-devant des yeux étoient extrémement courtes, & celles d'aprés tres-longues; en ſorte que l'on y remarquoit onze articulations en chacune, dont il y en avoit huit qui reſſembloient à des grains de chapelets un peu ovales.

Le huitiéme Juin au matin, il me parut d'une couleur brune, ſemblable à celle des féves de caffé bien torrefiées. Le neuviéme cette couleur devint noire, & les pattes de cet animal ſe firent voir d'un rouge brun.

Enfin le treiziéme il fit paroître quelques excremens d'un jaune pâle, au lieu que ceux du ver étoient fort bruns, les uns & les autres aſſez durs, & provenans du carton qu'il avoit rongé, & qui faiſoit, comme j'ay dit, le fond du Microſcope.

Nous finirons l'explication abregée des uſages de ce Microſcope, en ajoûtant encore, que l'on découvre ſur le corps des groſſes mouches de tres-petits animaux qui les incommodent durant leur vie, & qui les mangent aprés leur mort: ce qui ſuffit pour faire comprendre, que ce qui arrive aux uns peut arriver de même aux autres.

Les araignées que l'on y enferme y font leurs œufs; elles les y ramaſſent par pelotons, qu'elles enveloppent de leur ſoye pour les conſerver de la rigueur du tems; elles vivent ſeules enfermées dans ce tombeau durant plus de trois mois, ſans y prendre aucune nourriture apparente. Et ſi une groſſe s'y trouve enfermée avec pluſieurs petites, celles-cy en ſont mangées; ainſi l'on remarque que les unes ſervent de nourriture aux autres.

Si vous enfermez dans ce Microſcope une groſſe araignée avec une mouche ordinaire, auſſi aſſez groſſe, vous aurez le plaiſir d'y voir la mouche dans une grande agitation, pen-

dant que l'araignée y demeure comme immobile ; couchée sur le dos, les pattes en l'air & écartées les unes des autres ; attendant ainsi avec beaucoup de tranquilité que la mouche, lassée de voltiger çà & là, luy tombe sur le corps, pour l'environner de ses pattes, la piquer à la gorge, & la faire mourir subitement ; se contentant d'en tirer le sang sans endommager le reste de son corps, qui demeure tres-long-tems dans son entier, & jusqu'à ce que d'autres tres-petits insectes blancs la viennent devorer & manger en partie.

Nous ne dirons rien icy de la construction de la mouche ordinaire ; ni de celle de l'araignée ; parce qu'il en a été parlé ailleurs, & que ce Microscope à canon ne suffit pas pour en faire voir assez exactement les petites parties, qui ont d'ailleurs été examinées avec d'autres Microscopes, & representées élégamment par des Figures dessinées tres-correctement par Monsieur de Vigneux.

On va voir que trois differens portes-objets étant mis l'un aprés l'autre dans un même Microscope à canon de verre, causeront trois differentes sensations d'un même objet qui y sera placé successivement, étant regardé au travers d'une même lentille & d'une même distance.

Premiere Observation.

Si dans l'un de ces Microscopes à canon de verre, au lieu du fond noir que l'on y met ordinairement au-dessous des objets blancs, on en met un fait d'un morceau de glace ou de verre un peu épais, duquel le dessous soit brute ou dépoli, & mis sur une base d'ébene noire sous le canon du Microscope ; les objets qui seront posez sur le côté poli de ce morceau de glace, paroîtront comme étant en l'air, & avec d'autant plus de relief que ce porte-objet de verre sera plus épais, à cause que la lumiere qui tombe sur la surface polie du verre, qui sert de porte-objet, ne vient pas en assez grande quantité dans l'œil du spectateur, pour y faire une impression assez forte, pour nous faire juger que les objets y sont placez ; & c'est ce qui fait paroître ces mêmes objets comme vûs en l'air.

Seconde Obſervation.

Les objets blancs doivent être poſez ſur un fond noir ; afin qu'en réfléchiſſant le moins de lumiere qu'il ſera poſſible, la ſenſation que nous avons des blancs, n'en ſoit point tant alterée.

Troiſiéme Obſervation.

Les objets noirs & les bruns doivent être poſez ſur des fonds blancs ; afin que les parties ſolides de ces corps noirs & bruns, puiſſent nous renvoyer plus de lumiere qu'elles ne feroient s'ils étoient poſez ailleurs.

Il ſuit des mêmes experiences, qu'il n'eſt pas indifferent de préferer un fond de couleur à un autre, ſi l'on veut donner un grand relief aux figures peintes d'un Tableau. Un Chriſt, par exemple, qui ſera peint ſur la ſurface d'une glace de miroir, qui ne ſoit point étamée, étant poſée ſur un fond des plus noirs, paroîtra en l'air ; & ſon relief ſera vû d'autant plus grand, que la glace, ſur laquelle on aura peint ce Chriſt, aura plus d'épaiſſeur.

Aprés avoir parlé des avantages conſiderables qu'on peut tirer des Microſcopes à canon, il faut auſſi dire quelque choſe des défauts qui les accompagnent ordinairement ; puis eſſayer d'y remedier, afin de n'être pas privé des bons uſages qu'on en peut faire.

Ces défauts ſont au nombre de trois ; le premier, qui n'eſt pas conſiderable, vient de ce que l'ouverture de la monture, où l'on fait un écrou, étant trop petite, par rapport à la groſſeur du canon, on a de la peine à le bien nettoyer par dedans ; à quoy on pourra remedier, en faiſant cette ouverture la plus grande qu'il ſera poſſible ; ou bien il faudra faire en ſorte que la piece entiere qui couronne le deſſus du canon puiſſe s'ôter & remettre quand on voudra.

Secondement. La matiere dont le canon eſt fait ſe trouve quelquefois ſi mauvaiſe, qu'elle pouſſe un ſel au-dehors qui l'engraiſſe, qui le ternit, & le rend comme fêlé en mille en-

droits ; de ſorte que perdant ſa tranſparence , il devient inutile.

L'unique remede à ce défaut, eſt de tâcher d'en trouver un autre qui convienne ; mais parce que cela eſt preſque impoſſible , il faudra ſe ſervir du moyen que je vais donner pour en faire un de carton, qui ſervira comme le précedent.

Enfin, ſi le canon que l'on deſtine à faire un Microſcope eſt beau , & que ſa monture ſoit faite d'un bois qui ne ſoit pas bien ſec , il change de figure par la ſechereſſe ; de rond qu'il étoit il devient ovale , & le canon ſe trouvant alors plus preſſé en des endroits qu'il n'eſt en d'autres , il caſſe , à moins que ſa réſiſtance ne ſurpaſſe l'effort du bois qui ſe reſſerre.

Pour empêcher que les montures ordinaires ne caſſent les canons de verre, il n'y a qu'à les environner par le haut & par le bas de deux petites bandes ou ceintures de carton fin d'environ deux lignes de largeur , pour en coller la moitié autour de chaque canon , laiſſant déborder l'autre moitié qui ſervira d'entrée aux montures de bois, dans leſquelles on ne l'enfoncera que tres-peu ; afin que ſi le bois vient à ſe reſſerrer , il n'agiſſe que ſur la moitié des petites bandes de carton , qui obéïront aſſez pour éviter le fracas du canon de verre.

Voicy deux nouvelles méthodes pour ſe paſſer de canon de verre , en faiſant de gros Microſcopes, dont les corps dureront tant que l'on voudra.

La premiere de ces méthodes conſiſte à faire un gros tuyau de bois ou de carton bien rond , & à l'ouvrir par un ſeul ou par pluſieurs endroits , pour donner un libre paſſage à la lumiere : puis montant ce tuyau préparé , comme ſi c'étoit un tube de verre , on aura un Microſcope , dont les ouvertures pourront , ſi on le juge à propos , être fermées par des pieces de verre blanc , qu'il y faudra coller tres-proprement par dedans.

Au lieu de ce canon rond , on peut en conſtruire d'une autre maniere , qui ſera plus agréable à la vûë , & même plus prompte dans l'execution que la précedente. Pour cet effet , prenez un carton fin , duquel vous couperez une bande aſſez

longue & assez large pour y tracer six ou huit quarrez longs, que vous ouvrirez par autant de petites fenêtres de même figure, sur chacune desquelles il faudra coller en dedans des pieces de verre blanc coupées proprement, & des plus minces qu'il sera possible de trouver, que l'on couvrira par aprés d'un second carton plus petit que le premier, & ouvert de même. Cet espece de canon, ou plutôt ce corps de Microscope, étant ainsi préparé, il n'y aura plus qu'à tourner une monture qui luy convienne, & l'on aura un Microscope presque parfait dans sa maniere.

CHAPITRE X.

Description & usage d'un tres-petit Microscope, monté d'une seule lentille.

CE petit Microscope, qui n'a pas plus de neuf lignes de hauteur, est vû tout entier au-dessous de la lettre A, ou de son profil marqué B: il est fait comme une petite boëte cilindrique ouverte par-dessus & par-dessous, pour donner un libre passage à la lumiere qui se reflêchit de l'objet que l'on regarde au travers de la lentille, qui se place comme on la voit dans le profil B de ce Microscope. Planche 12. Figure 1.

Des usages de ce Microscope.

SI vous observez un chiffre gravé sur la surface d'un cachet d'argent, vous l'y verrez d'abord enfoncé, de même que nous le voyons de nos seuls yeux; & si l'on continuë de le regarder sans changer de situation, on verra ce même chiffre d'un beau relief, éclairé & ombré du même côté que les enfoncemens l'étoient auparavant qu'on eût la sensation de cette derniere apparence.

2°. Si vous continuez à observer ce chiffre avec la même attention que vous avez fait, ce qui vous paroissoit de relief deviendra enfoncé comme il étoit auparavant, & ainsi de suite.

3°. Il arrive ſouvent qu'ayant obſervé ces choſes, ſi vous diſcontinuez pour un moment, & qu'enſuite vous recommenciez la même experience; vous ſerez ſurpris de voir que ce chiffre, au lieu de commencer à paroître comme la premiere fois, c'eſt-à-dire enfoncé, il paroît de relief.

4°. Si pendant que l'on eſt tourné du côté que vient le jour, on ſe releve en continuant de regarder la ſurface du cachet, ce qui paroiſſoit enfoncé ſemble ſe relever tout à coup, & l'ombre paroît ſouvent de part & d'autre du relief; mais ſi l'on continuë d'obſerver ce relief apparent, pendant que l'on ſe tourne comme il faut pour recevoir le jour du côté droit, on voit l'ombre du côté d'où vient le jour, ce qui ne ſurprend pas peu. Et au contraire l'ombre ſera à gauche, ſi le jour donne ſur le chiffre, en venant du côté gauche.

5°. Si vous obſervez ce qui eſt de relief ſur la ſurface d'un loüis d'or, par exemple, vous le verrez toujours de relief en quelque ſituation que vous ſoyez, & de quelque jour qu'il ſoit éclairé.

6°. Il y a un grand nombre de perſonnes qui obſervent les mêmes choſes que j'ay vûës.

7°. Il y en a qui voyent toujours enfoncé ce qui l'eſt effectivement; & d'autres qui apperçoivent toujours le contraire.

De toutes ces obſervations, que j'ay faites avec autant de ſoins qu'il m'a été poſſible, il en faut conclure que les diverſes ſenſations que l'on a de cet objet ne ſont produites qu'à l'occaſion du plus ou du moins de délicateſſe des filets du nerf optique, qui font le tiſſu de la Retine; puiſque le moindre changement qui arrive dans ces filets, eſt capable de faire changer l'apparence des concavitez du chiffre: & à l'égard de ceux qui voyent toujours enfoncé, ou toujours de relief une même choſe; cela n'arrive qu'à cauſe de la ſituation conſtante & uniforme qui ſe trouve toujours la même ſur la Retine, pendant qu'ils regardent le chiffre.

Il eſt inutile de s'étendre davantage ſur les uſages de ce petit Microſcope; puiſqu'on peut juger, par ce que j'en viens de rapporter, qu'il peut tres-utilement ſervir à obſerver tous les petits corps qui peuvent être tenus avec les

doigts

doigts d'une ſeule main, ou avec des pincettes, pendant que l'on tient le Microſcope de l'autre main.

CHAPITRE XI.

Deſcription d'un tres-petit Microſcope à deux verres, qui repreſente les objets dans leur ſituation droite & naturelle.

MOnſieur de Puget, dont le merite eſt aſſez connu des Sçavans par les divers Ouvrages qu'il a donnez au Public, nous aſſure, dans ſa premiere lettre écrite au R. P. Lamy Religieux Benedictin, touchant les obſervations qu'il a faites ſur la ſtructure des yeux de quelques inſectes, en parlant des divers effets de deux Microſcopes ; " Que Monſieur Leevuenhoec raconte, que tous les objets qu'il voyoit multipliez par la cornée d'une mouche, luy paroiſ-ſoient à rebours. Les hommes, par exemple, avoient la tête en bas & les pieds en haut ; & que cela ne ſe pouvoit faire autrement, puiſque tous les objets qu'on voit au travers de deux lentilles, paroiſſent toujours renverſez. "

Nous allons faire voir tout le contraire dans un Microſcope à deux verres convexes, dont voicy les proportions.

A B, eſt le Microſcope repreſenté dans ſon entier, & à peu prés de la longueur & de la groſſeur qu'il a été executé. Planche 12. Figure 2.

C, eſt la piece de l'œil, & D ſon profil, où eſt enchaſſé le verre oculaire.

E, eſt le porte-lentille, & F ſon profil.

G & H, ſont deux viroles qui ſervent à arrêter les deux verres.

Le foyer du verre oculaire n'a que quatorze lignes ; celuy de la lentille eſt d'un peu plus de quatre lignes ; & la diſtance d'entre ces deux verres eſt de dix lignes ; d'où il ſuit que deux lentilles ſemblables à celles dont je viens de parler, & de differens foyers, étant montées dans deux tuyaux, de maniere que l'un des deux puiſſe être tellement enfoncée dans l'autre, que le foyer de l'une des lentilles

passe au-delà du foyer de l'autre. Ces deux verres ainsi montez composeront un Microscope, par le moyen duquel on verra les objets dans leur situation droite & naturelle.

J'en ay fait depuis plusieurs autres à deux verres plans convexes, qui font l'effet de trois Microscopes, & de 4. Loupes.

CHAPITRE XII.

Description & usage d'une nouvelle Machine, tres-utile aux Anatomistes, aux Dessinateurs, aux Graveurs, aux Peintres qui travaillent en Mignature ; & generalement à tous ceux qui veulent découvrir ce que les yeux seuls ne peuvent appercevoir ; & pousser leurs Ouvrages au point le plus haut de perfection.

AB, est le pied d'un instrument, que je nomme Porte-loupe, qu'on peut faire de bois & de laiton.

Planche 13. C D, est un porte-objet, qui peut se monter à vis ou autrement, sur la surface plane du pied A B, tellement construit, qu'on le puisse hausser & baisser facilement quand on voudra, & même le fixer où il sera besoin.

E, est une petite tige de laiton, élevée à plomb sur le bord superieur du pied A B, d'une force & d'une hauteur convenable aux differens usages ausquels on destine le porte-loupe.

F, F, F, sont trois genoüils qui se suivent, & qui ont une telle liaison entr'eux, que chacun peut être mû diversement, pour concourir à produire ensemble un même effet.

Au lieu de ces genoüils, on peut faire trois especes de charnieres semblables à peu prés à celles d'un compas commun qui s'entresuivent, & qui soient affermies par le moyen de trois vis, & d'autant d'écrous.

G, est une virole de laiton, tournée proprement, & d'une ouverture qui soit telle qu'on y puisse enchasser justement, & l'une aprés l'autre, les loupes de differens foyers ; & même de petits Microscopes à deux ou trois verres, pour servir à des usages particuliers.

Des usages de cette Machine.

H, Represente un œil placé au-dessus de la Loupe que l'on a mise dans la virole G, regardant un petit animal posé sur le porte-objet C D, où l'on place tout ce que l'on veut dissequer, pour dessiner d'après les préparations qu'un habile Anatomiste aura mises en état d'être représentées sur le papier.

On voit bien que l'on pourra par ce moyen parvenir à connoître la structure de la peau, celle des ongles, des poils, & la tissure de presque toutes les membranes du corps des animaux.

Avec ce secours on peut entreprendre de faire l'anatomie des gros insectes, & de les representer avec autant d'exactitude, qu'on en aura employé à les bien préparer.

On a déja découvert la semence de plusieurs plantes, qu'on s'étoit persuadé, sans raison, n'en avoir point, comme celle de fougeres, des mousses, des truffes, &c.

On a observé que le sang est composé d'une serosité blanche & transparente, où nagent des globules rouges de differentes grosseurs. On l'a vû circuler diversement dans les vaisseaux de plusieurs animaux vivans, & l'on a reconnu que les veines & les arteres ne sont que des tuyaux ou des syphons recourbez.

La facilité que l'on aura de changer de porte-objet, de Loupes, de Microscopes à deux ou à trois verres, & de poser successivement differens petits Tableaux préparez, au-dessous de cette Loupe ou de ces Microscopes, fourniront des moyens nouveaux pour voir parfaitement, & en peu de tems, une grande varieté de choses bien differentes les unes des autres.

Enfin il est facile de comprendre que cette machine renferme aussi tous les usages des Microscopes à canon de verre; & que ces canons n'ayant pas besoin de montures, ils ne seront pas sujets à se rompre.

CHAPITRE XIII.

Explication de toutes les parties qui composent un Microscope à trois verres convexes, des deux côtez.

ON voit d'abord dans cette Planche deux grandes Figures dessinées l'une à droite au-dessous de la lettre A, qui représente l'élevation geometrale du Microscope tout entier; & l'autre qui est placée à sa gauche en est le profil, fait par la section d'un plan vertical, qu'il faut concevoir passer par l'axe du Microscope, pour le separer en deux parties égales, découvrant dans l'une de ses moitiez tout le dedans de cette machine.

Planche 14.

A B B, est un bouton qui sert de couronnement au Microscope.

C C, est la piece de l'œil, dans laquelle on a fixé le verre oculaire.

D D, est une autre piece, où l'on a enchassé le verre du milieu. Cette piece est colée à un petit bout de tuyau, qui porte un diaphragme à son extrémité d'en-bas.

E, est le corps du Microscope couvert de chagrin, qui sert à recevoir le bout du tuyau colé à la piece D D.

F, est la base du corps de ce Microscope.

G, est une bonnette ou porte-lentille, qui se visse sur la base F, pour y demeurer fermement attachée.

H, est une petite virole de laiton, ornée de quelques moulures, soudée à un petit bras, qui est aussi soudé au coulant representé à côté de la lettre I.

C'est dans cette virole que l'on fait entrer le milieu de la base F, pour soutenir à plomb tout le corps du Microscope.

I, est le coulant qui peut être mû sur la tige d'acier L, & demeurer à l'endroit de cette tige, où l'on voudra, par le moyen d'un petit ressort d'acier placé entre la tige & le coulant.

M, est le petit vase tourné, qui sert d'ornement à la tige.

Immediatement au-dessus de l'endroit L, on y voit une petite pincette à boutons marquée N.

O, est un verre concave, pour servir de porte-objet aux liqueurs qu'on mettra dans sa concavité.

P, est une espece de porte-objet de laiton, composé de plusieurs pieces, tellement ajustées les unes avec les autres, qu'on le peut promener sur le pied du Microscope marqué Q.

R, est une petite boëte de laiton en forme d'une virole, dans laquelle on met des diaphragmes de differentes ouvertures.

S, S, S, sont trois petites boules affaissées, & attachées au-dessous du pied pour luy donner plus de grace.

T, est une platine de laiton, sur laquelle on a attaché trois petits ressorts, qui rendent égal le mouvement du porte-objet marqué P.

Explication du profil de ce Microscope.

B b b, est le profil du bouton qui sert de couronnement au Microscope.

c c, est le profil de la piece de l'œil, où l'on voit le verre oculaire placé immediatement au-dessous du couronnement.

d d, represente une autre piece qui porte le verre du milieu, & qui est attaché à un bout de tuyau, au bas duquel est un diaphragme.

e, est le corps du Microscope, dont on voit l'épaisseur, que nous avons dit être couvert de chagrin, & servir à recevoir le tuyau enchassé & collé avec la piece f, qui sert de base au Microscope.

g, est le profil de la bonnette ou porte-lentille, qui se monte à vis sur le bout d'en-bas de la piece f.

h, est le profil de la virole de laiton, soudée au bas de la coulisse marquée i.

l, est un quarré ou verge d'acier, au haut de laquelle on voit un petit vase qui luy sert de couronnement.

n, est le profil d'une petite pincette à boutons.

o, est le profil d'un verre concave, où l'on met les liqueurs en plus grande quantité que celles qu'on met sur un talc, ou sur un verre plan.

p, eſt le porte-objet composé, dont il a été parlé.

q, eſt le profil du pied du Microſcope.

r, eſt celuy de la petite boëte ou virole, qui porte les diaphragmes de differentes ouvertures.

s, s, s, ſont trois petites boules affaiſſées, pour ſervir d'ornement au pied du Microſcope.

t, eſt le profil d'une petite platine de laiton attachée à une virole, où l'on fait entrer la petite boëte marquée r.

Du foyer de chacun des trois verres de ce Microſcope, & des diverſes diſtances qui ſont entr'eux.

L'Oculaire, qui eſt un verre convexe des deux côtez, a huit lignes de foyer; on l'a placé au-deſſous de l'œil, à une diſtance d'environ ſix lignes.

Le verre du milieu, qui eſt auſſi convexe des deux côtez, a dix-huit lignes de foyer; ſa diſtance de l'oculaire eſt de douze lignes.

Et la lentille, qui eſt de quatre à cinq lignes de foyer, eſt placée au moins à la diſtance de trente lignes du verre du milieu; & cette même lentille s'en peut éloigner de trente-quatre à trente-cinq lignes, ſi l'on veut que ce Microſcope faſſe paroître l'objet plus gros qu'il ne fait à la moindre diſtance: mais il eſt à propos d'avertir que l'objet ne paroîtra pas ſi bien éclairé, étant vû d'une grande diſtance, que s'il l'étoit d'une moindre.

Des uſages que l'on peut tirer de ce Microſcope à trois verres.

EN conſiderant, par exemple, la lettre A d'un loüis d'or avec ce Microſcope à trois verres, dont l'effet ordinaire eſt de faire paroître à la renverſe tous les objets qu'on y obſerve; on remarque 1°. que cette lettre qui eſt de relief y paroît enfoncée.

2°. Que cet effet n'arrive pas toutes les fois qu'on le deſire.

3°. Que ſouvent en regardant cette lettre avec beaucoup d'attention, & durant quelques momens, ce qui paroiſſoit

enfoncé, paroît ensuite de relief.

4°. Qu'un certain mouvement de tête apporte quelquefois du changement dans la maniere de voir l'objet.

5°. En faisant avancer le Microscope sur une table, pendant qu'on y regarde le loüis d'or, ce qui paroissoit de relief s'y enfonce en apparence, & peu de tems aprés avoir été ainsi observé, on apperçoit tout à coup que le relief revient.

6°. Si l'on passe d'un côté d'une table à l'autre, on est tout surpris de voir que ce qui venoit de paroître en relief, paroît enfoncé, & au contraire.

7°. Ces effets differens ne sont point apperçûs de tous ceux qui font ce petit manége, dans lequel on remarque des bizarreries extraordinaires, suivant la force ou la foiblesse des yeux de l'observateur; car souvent une même personne apperçoit le même objet differemment, en le regardant tantôt d'un œil & tantôt de l'autre, & cela successivement.

8°. Il m'est arrivé quelquefois qu'ayant observé le relief du loüis d'or, & l'ayant vû comme enfoncé, étant d'un côté de la table où étoit posé le Microscope, la même chose m'est encore apparuë l'étant allé observer de l'autre côté de cette même table.

9°. Il arrive souvent que quand on regarde l'objet tantôt d'un œil & tantôt de l'autre, les objets qui sont naturellement de relief y paroissent creux.

10°. Un de mes amis, Officier d'artillerie, a toujours vû enfoncé ce qui étoit de relief, quelque situation qu'il ait pris pour observer la lettre A, dont nous parlons.

11°. Le même caractere alphabetique d'une piece d'argent, produit sur mes yeux les mêmes effets que nous avons remarquez touchant le loüis d'or.

12°. Il arrive souvent qu'en faisant une de ces observations, il suffit d'approcher ou d'éloigner l'oculaire du verre du milieu, pour appercevoir un changement contraire à celuy qu'on apperçoit auparavant.

13°. Voicy une autre experience qui n'est pas moins curieuse que les précedentes; elle consiste à mettre un cachet d'argent, qui represente un chiffre sur le porte-objet du Microscope; ce chiffre, quoyque gravé profondement, paroî-

tra de relief & ſans aucun enfoncement ; ce qui ne ſurprend pas peu.

14°. Quand j'obſerve le chiffre gravé ſur ce cachet, à la lumiere d'une chandelle, vis-à-vis laquelle je ſuis tourné, je vois d'abord le creux comme il eſt naturellement ; un moment aprés je le jugerois volontiers de relief, ſans changer de ſituation ; mais en raiſonnant ſur les ombres qui paroiſſent, je me trouve obligé de penſer autrement ; parce que ces mêmes ombres me paroiſſent toujours où elles doivent être ; & il en eſt de même des effets de la lumiere répanduë ſur ce chiffre.

15°. Mais quand je releve le cachet & ma tête, pendant que j'en obſerve la ſurface, je vois de relief ce qui eſt enfoncé ; parce que je ne vois plus d'ombre, à cauſe du peu de lumiere que je reçois alors par la refléxion d'un bonet rouge que j'ay ſur ma tête.

Et ſi je regarde obliquement la ſurface de ce cachet, pendant que la lumiere de la chandelle y tombe à plomb ; je ne le vois point de relief, parce que je ne reçois point de lumiere de ſes enfoncemens.

Ceux qui préferent les Microſcopes à deux verres à celui dont je viens de parler, n'ont qu'à ſupprimer le verre du milieu, ſans y apporter d'autre changement ; ſi ce n'eſt que lorſqu'il s'agira de faire voir la circulation du ſang dans la queuë d'un tétart, dans celle d'une lamproye, &c. il n'y aura qu'à mettre une lentille objective d'un foyer plus court que celle qui y eſt.

CHAPITRE XIV.

Deſcription d'une petite Machine nouvelle, qui contient trois ſortes de Microſcopes, & deux petites lunettes d'approche.

LE deſſein que l'on voit icy au-deſſous de la lettre A ; repreſente un Microſcope monté ſur ſon pied ; & celuy qui eſt repreſenté au-deſſous de B en eſt le profil, fait par

la

la ſection d'un plan vertical qui le diviſe de haut en bas en deux parties égales, pour en faire voir le dedans ; par ce moyen l'on découvre les lieux où ſont placez les trois verres qui compoſent le premier des trois Microſcopes. Planche 15.

Celuy de ces verres qui répond à côté de la lettre c, eſt un oculaire d'environ huit lignes de foyer.

Le verre du milieu, qui ſe voit à côté de la lettre d, a ſoixante lignes de foyer ; & la diſtance d'entre ces deux verres c, d, pourra être depuis ſix lignes juſqu'à dix ou douze ; de ſorte que pour faire ce changement de diſtance, il ſera à propos de monter le verre d, dans un bout de tuyau qui puiſſe être facilement hauſſé & baiſſé ; afin de l'arrêter dans le lieu où ſon effet ſera le plus convenable aux obſervations que l'on voudra faire, & de mettre un diaphragme à l'autre bout d'en-bas de ce tuyau ; comme cela ſe peut voir à côté de la lettre f.

La lentille objective qui répond à côté de la lettre e, a environ ſix lignes de foyer : ſa diſtance ordinaire du verre du milieu ſera d'environ quarante-trois lignes. Ainſi s'achevera le premier Microſcope, dont les effets ont été rapportez dans les Chapitres précedens.

Si l'on veut maintenant faire un ſecond Microſcope, dans lequel il n'y aura que deux verres, il ſuffira de ſupprimer celuy du milieu marqué par la lettre d ; ce qui ſe fait en ôtant le tuyau où il eſt enchâſſé, laiſſant ſeulement c, & la lentille e.

Et pour faire un troiſiéme Microſcope qui puiſſe ſervir à découvrir ce qu'il y a de plus beau & de plus ſingulier dans les liqueurs ; il faudra ôter la lentille e, & mettre en ſa place une autre lentille de trois lignes au plus de foyer, en reglant l'ouverture de cette derniere ſur ce nouveau foyer ; ce qui n'eſt pas de peu de conſequence, quand on veut ménager la clarté & la diſtinction, qui ſont deux choſes tres-differentes, & qu'il eſt néceſſaire d'avoir dans tous les Microſcopes.

Si l'on veut maintenant faire une lunette d'approche, qui faſſe paroître les objets dans leur ſituation naturelle, il n'y a qu'à ſupprimer la lentille marquée c, & la lentille e, puis

mettre en la place de cette derniere lentille e, un oculaire concave, qui convienne à la longueur du foyer du verre d, qui deviendra l'objectif de cette lunette. Et il faut remarquer que le concave est dans une partie de sa monture, placé dans une petite boëte pratiquée au-dedans de la solidité du couronnement B g h, comme on l'y peut remarquer.

Enfin s'il étoit nécessaire, on pourroit encore pousser la curiosité plus loin; & trouver dans cette machine dequoy faire une seconde lunette d'approche, sans augmenter le nombre des verres que nous y avons employé jusqu'à present, laquelle lunette feroit paroître les objets renversez, à l'imitation de celles qui s'appliquent aux niveaux, aux quarts de cercles, & à celles qui servent aux Asttonomes pour faire les observations celestes.

Pour l'executer, il n'y auroit qu'à se servir de l'oculaire c; & du verre du milieu marqué d; & parce que cette lunette deviendroit plus longue que la précedente, il faudroit qu'elle contint un second bout de tuyau, à l'une des extrémitez duquel il y aura une petite monture; qui servira à mettre l'oculaire marqué c.

Il ne reste plus qu'à ajuster au bas de la tige du Microscope une petite pincette, pour y attacher les animaux tout vivans; & à faire des portes-objets qui conviennent aux liqueurs & aux autres objets qu'on veut observer.

CHAPITRE XV.

Description d'un nouveau Microscope universel, & de ses usages.

ON a desiré depuis long-tems d'avoir un seul Microscope qui fut portatif & universel, c'est-à-dire un instrument qui puisse servir à observer toutes sortes de petits objets; les durs, les mols, & tout ce qui se peut voir dans les liquides. En voicy un que l'on croit capable de renfer-

mer tous ces avantages, parce qu'il contient toutes les choſes qui ſont néceſſaires pour faire l'effet de pluſieurs Microſcopes; c'eſt pourquoy il n'a pas été poſſible d'éviter d'y faire entrer un grand nombre de pieces tres-differentes les unes des autres, de chacune deſquelles il faut parler aſſez exactement pour en faire comprendre la méchanique & l'uſage. Mais afin d'entrer facilement dans ce détail, nous eſtimons qu'il eſt bon de jetter les yeux ſur la premiere des deux Figures repreſentées dans la ſeiziéme Planche, qui nous montre le Microſcope vû par-devant, & dans une élevation geometrale, de la même grandeur qu'il a été executé par Monſieur le Febvre Ingenieur en inſtrumens de Mathématiques; & où l'on voit d'abord trois reſſorts d'une conſtruction particuliere. Planche 16.

Le premier de ces reſſorts eſt appliqué au haut de la piece marquée A, ſes montans ſe voyent en B B, preſſant le porte-lentille F, qui eſt derriere eux.

Le ſecond marqué c eſt attaché en D.

E E, ſont les montans du troiſiéme reſſort que l'on voit attaché en H, ſur une platine I qui eſt au-delà.

Il faut premierement remarquer que les ſommets des montans de ces trois reſſorts ſont un peu courbez en devant pour faciliter l'entrée de quelques pieces plattes & minces que l'on mettra derriere eux, comme on l'expliquera cy-aprés. Ces trois reſſorts ſont auſſi un peu courbez vers le milieu de leur longueur, pour faire place aux pieces qu'on doit introduire derriere eux.

F, eſt le premier des deux portes-lentilles nouveaux, qu'on peut nommer Eprouvette; parce qu'il peut ſervir à éprouver de ſuite des lentilles de diverſes groſſeurs & de differens foyers.

I, eſt une piece de laiton qui ſert à ſoutenir une partie des pieces dont on vient de parler. Cette piece doit avoir plus d'épaiſſeur que les précedentes, & s'enfoncer un peu dans le milieu ſuperieur de la piece à coquille où elle eſt ſoudée.

L L, eſt un morceau de glace qui doit être des plus beaux & des plus tranſparens qu'on puiſſe trouver, au milieu du-

quel on a taillé un petit concave, pour y mettre les liqueurs que l'on voudra obſerver.

M M, eſt une grande piece de laiton, au haut de laquelle on a fait une ouverture en forme d'un quarré long, pour faire paſſer par-deſſus & à couliſſe le morceau de glace L L, que nous avons appellé ailleurs porte-objet, ou porte-liqueur.

N N, eſt une grande rouë à dents, qui ſert à conduire la lentille au point où elle doit être, pour qu'on puiſſe voir les objets le plus diſtinctement qu'il eſt poſſible.

O, eſt une virole attachée au manche du Microſcope, au haut de laquelle eſt un écrou qui reçoit une vis d'acier ſoudée au-deſſous de la piece à coquilles, qui termine le bas du Microſcope.

Voilà l'explication abregée de toutes les pieces viſibles de cette premiere Figure; & voicy celle des pieces que l'on voit dans la ſeconde, qui en eſt le profil.

Figure 2. a a a, eſt le profil d'une piece courbée en équerre, dont les dimenſions ſont exactement obſervées dans cette Figure, & dans la précedente.

b, eſt le premier des trois reſſorts qui ſont au-devant de la premiere Figure; il n'eſt pas vû dans celle-cy, à cauſe de l'épaiſſeur du haut de la piece a a a, où elle s'enfonce.

c, eſt le ſecond reſſort que l'on voit attaché en d par une vis, & fixé en partie par une petite pointe fichée dans la piece A de la premiere Figure, afin qu'il ne puiſſe tourner d'aucun côté.

e, eſt le ſommet de l'un des montans du troiſiéme reſſort que l'on voit attaché en h, & s'inſinuer dans un petit trou fait au haut de la piece à coquilles.

f, eſt le premier des nouveaux portes-lentilles.

I, repreſente la hauteur & l'épaiſſeur d'une platine de laiton, qui eſt ſoudée par en bas dans le milieu de la piece à coquilles qui répond au-deſſus de la virole O, & qui ſert à ſoutenir & affermir la plus grande partie des pieces précedentes.

l, eſt un verre concave ou porte-objet, taillé en biſeaux, pour être fermement arrêté dans une couliſſe faite ſur la piece marquée m.

n, eſt le profil d'une grande rouë à dents, & d'une vis rivée à ſon centre.

o, eſt la virole qui s'attache au manche du Microſcope, comme il a été dit.

p, eſt une regle d'acier rivée en deux endroits de ſa largeur ſur la piece du milieu marquée I.

Cette regle, dont on voit icy la longueur & l'épaiſſeur, eſt ouverte par le milieu en forme d'un quarré long qui a peu de largeur; & elle en doit avoir moins que le côté horiſontal de l'équerre a a a, qui luy eſt parallele.

q, eſt une piece façonnée proprement, au bas de laquelle il y a un écrou par lequel on fait paſſer une vis, dont le bout r eſt formé en pivot bien rond, pour être mû avec juſteſſe dans un trou fait au bas d'une eſpece de conſole marquée t, le haut de laquelle entre quarrément dans l'ouverture de la regle d'acier p, & y eſt fixé par le moyen d'une vis, dont la tête ſe perd dans l'épaiſſeur de cette regle.

Il faut maintenant remarquer que l'extrémité ſuperieure de la piece q eſt en partie quarrée, & en partie viſſée; & que celle qui eſt quarrée ſe termine dans l'épaiſſeur de la regle d'acier p, où elle peut couler librement; & ce qui eſt viſſé traverſe le bras horiſontal de l'équerre a a, ſe terminant comme on le voit en s, où l'on peut remarquer qu'une petite rondelle de laiton en eſt enfilée, & qu'on a encore mis par-deſſus une petite rouë à dents qui a un écrou à ſon centre, pour ſerrer cette rondelle, plus ou moins, ſuivant le beſoin.

u x, eſt un quatriéme reſſort de laiton fermement attaché avec deux petites vis qui entrent dans la piece marquée I.

y, eſt le profil d'une piece de laiton mince, courbée & recourbée en équerre double, pour ſoutenir par ſon extrémité ſuperieure la virole & qui fait reſſort; parce qu'elle eſt fenduë en ſa partie ſuperieure, & dans laquelle on fait entrer le canon z noirci en dedans, & garni de diaphragmes de diverſes ouvertures.

Voilà l'explication de toutes les parties du Microſcope vû de côté; & voicy celle de chacune de ces pieces deſſinées à part, & marquées de lettres ſemblables à celles des Figures

précedentes ; afin qu'on y puiſſe avoir recours, ſi l'on juge que cela ſoit néceſſaire.

Explication de tout ce qui eſt contenu dans la Planche 17, qui a rapport avec les Figures de la précedente.

A, Eſt le deſſein de la partie verticale du devant de la piece de laiton courbée en équerre ; au derriere de laquelle, & ſur ſes deux montans, on a rivé une piece de laiton mince, pour ſervir d'appuy aux portes-lentilles qui s'adoſſent contre.

Mais auparavant que d'attacher cette piece, il faut avoir creuſé en talus le devant de la piece A, laiſſant la partie élevée du côté de la vis, pour loger l'extrémité de la queuë du reſſort BB, afin que ſes montans approchent plus prés de la piece mince qu'on aura rivée derriere.

Cette préparation étant ſuppoſée, voicy la méthode que l'on a ſuivie pour attacher les deux premiers reſſorts qui ſont ſur le devant de ce côté de l'équerre. On y a premierement fait deux trous qui ſe voyent au bas de la queuë de cette piece A, dont le ſuperieur, qui eſt un peu plus grand que l'inferieur, ſert d'écrou, & l'on a rivé un petit tenon dans l'autre trou, le ſurpaſſant ſeulement de l'épaiſſeur des deux reſſorts ; enſuite de cela on a encore fait deux trous ronds au bas de chacun des deux reſſorts B, C, qui conviennent tellement aux précedens, que la queuë du premier s'appliquant dans la cavité faite au-deſſous du milieu des montans de la piece A, on puiſſe mettre par-deſſus ce premier reſſort B, le ſecond C, & attacher enſemble ces pieces avec la vis, dont la tête paroît au-deſſous de la lettre D, Figure 1. & 2. de la Planche 16.

EE, eſt le troiſiéme reſſort qui s'applique & s'attache au-devant de la piece de laiton marquée I.

F, eſt le premier des deux portes-lentilles, où l'on voit une tetine pour loger la lentille ; on le fait d'une piece de laiton gratté tres-mince, dont une moitié eſt pliée ſur l'autre.

G, eſt le ſecond porte-lentille, qui eſt auſſi fait de laiton un peu plus fort que le précedent. Le deſſein en fait aſſez

connoître la construction; il suffira de dire, que la partie du dessus est de même largeur que la queuë, & que le coulant sert à retenir la lentille en place.

LL, est un morceau de glace, au milieu duquel on a taillé un concave, qui sert à y retenir une petite goutte de vinaigre, où nagent des anguilles.

On peut faire d'autres portes-objets de verre mince & de même grandeur sans le creuser, au-devant desquels, si la lentille dont on se servira est d'un tres-court foyer, on mettra les liqueurs pour les observer.

MM, est une platine de laiton, où il y a une coulisse pour recevoir les portes-objets précedens.

On en fait plusieurs autres avec du petit carton mince; au milieu desquels on fait une ouverture semblable à celle qui se peut voir au-dessous de la lettre K, où l'on attache des objets pour être vûs l'un aprés l'autre, avec des lentilles de foyers convenables.

x x, est le quatriéme ressort qui est attaché par deux vis derriere la piece I, & immediatement au-dessus du côté horisontal de l'équerre a a a, de la seconde Figure Planche 16. Ce ressort est un peu courbé au sommet, pour faciliter l'entrée d'une platine pliée & repliée en double équerre, & il l'est encore par en bas, comme on le peut voir exactement exprimé dans son profil, Planche 16.

NN, est le profil d'une grande rouë à dents, & d'une vis rivée à son centre.

o, est le dessein de la virole attachée au manche du Microscope, au haut de laquelle on a fait un écrou pour y faire entrer la vis qui se voit representée en o, au bas du profil, seconde Figure de la Planche 16.

p, est le plan superieur de la regle d'acier que nous avons mis icy, pour faire voir tout ce qui n'a pû être representé dans les Figures de la Planche 16.

q: cette piece est assez visible dans le profil de la Planche 16. pour n'avoir pas besoin d'une plus ample explication que celle qui en a été donnée.

y, est la representation perspective de la largeur d'une piece de laiton courbée & recourbée en double équerre,

au ſommet de laquelle on a ſoudé une virole marquée &c.

z z, eſt un canon cilindrique qui coule dans la virole &c, qui fait l'office d'un reſſort. Ce canon eſt garni de diaphragmes, & noirci interieurement pour en éviter le luiſant.

Le deſſein qui eſt marqué des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eſt une machine particuliere à ce Microſcope, que nous avons nommée porte-pincette. On voit qu'elle eſt compoſée de ſix principales pieces; ſçavoir, d'une petite pincette à boutons marquée 1; d'un petit canon vû en 2, dont l'un des bouts eſt à reſſort; d'une charniere chiffrée 3, qui tourne ſur une petite bande de laiton marquée 4; d'une tige ronde 5, qui entre dans deux petits canons 6, 6, pratiquez à l'extrémité de la piece 7, qui doit être de laiton mince. De ſorte que par cette diſpoſition de pieces, toutes differentes les unes des autres, on pourra aiſément mouvoir la pincette en tous les ſens que l'on voudra.

8, eſt une tige de laiton, à l'un des bouts de laquelle on a monté à vis ou autrement une pointe d'aiguille, pour ſervir aux uſages dont il ſera bien-tôt parlé.

9, eſt un porte-objet d'ébene, noir d'un côté & blanc de l'autre; il doit être fait à peu prés comme une dame à joüer, vers la circonference de laquelle on a dû avoir reſervé un petit rebord élevé en forme de parapet, pour empêcher que les petits corps qui ſe mettront ſur la ſurface, tant ſuperieure qu'inferieure, ne puiſſent rouler en bas.

10, eſt le profil de ce porte-objet, où l'on voit un petit trou rond qui ſe remplit d'une cheville de liege, afin qu'en y fourrant la pointe de la tige 8, la dame 9 y tienne attachée.

Des uſages de ce Microſcope univerſel.

NOus ſuppoſons d'abord que cette Machine ainſi conſtruite, ſoit encore accompagnée de pluſieurs lentilles de differens foyers parfaitement bien taillées, & bien montées dans des pieces de laiton ſemblables à celles qui ſont repreſentées au-deſſous des lettres F, G, Planche 17. aprés quoy on ſera en état de faire les experiences qui ſuivent.

Mais

Mais auparavant que j'entre en matiere, je me trouve obligé d'avertir, qu'une explication par écrit, quelque ample qu'elle soit, ne donnera jamais l'intelligence qu'il faut avoir pour bien conduire toutes les pieces de ce Microscope, pour préparer les objets qu'on y peut observer; & qu'en moins de deux heures de conversation avec une personne qui en aura l'intelligence, on apprendra plus de choses, que l'on ne feroit durant huit jours, d'une lecture qui rebuteroit ceux qui ne sont pas accoûtumez à lire ces sortes d'explications; c'est pourquoy je ne diray précisement que ce qu'il faudra dire pour ne point ennuyer.

Des Cartons préparez pour servir de portes-objets fixes.

LE dessein que l'on peut voir au-dessous de la lettre K, Planche 17, represente un des petits cartons, au milieu duquel on a pratiqué une ouverture ronde ou quarrée, pour y faire répondre divers corps durs & transparens, comme des aîles de mouches, des cheveux, de tres-petites plumes d'oiseaux, des tranches de bois tres-minces, &c. qu'on y attache avec un peu d'eau gomée, ou quelque autre chose d'équivalent. Ces cartons étant ainsi préparez & mis de suite dans la piece à coulisse de la platine M M, pour y être vûs avec des lentilles qui conviennent, divertiront agréablement les spectateurs par un grand nombre d'objets tous differens les uns des autres.

Du Porte-pincette, & des pieces qui l'accompagnent.

CEtte Machine est d'un grand usage pour servir avantageusement aux diverses observations que l'on se proposera de faire sur une infinité de petits corps durs ou mols: si ces corps sont durs, on les attache à la pincette à boutons marquée 1, 1, Planche 17; s'ils sont mols, comme les poux, les puces, &c. on les pince par la croupe, pour être observez tout vivans. Les mouches d'une certaine grosseur se peuvent empaler avec la pointe de la tige 8, qui se monte par aprés dans les deux petits canons 6, 6, de la platine 7. Si ce sont

des poux de ſerins de Canarie qu'on ait deſſein d'obſerver ; on trempe la pointe de cette même tige dans un peu d'eau gomée, aſſez épaiſſe pour y faire tenir ces poux. On en fait de même pour les mittes de fromage, qui paroiſſent bien differentes les unes des autres.

On peut auſſi enduire la petite dame 9 de cette eau gomée, & répandre deſſus ces petites bêtes vivantes qui s'y attachent, & qui y demeurent en vie tres-long-tems ; & pour les obſerver ſur cette dame, on fait entrer dans le trou qui eſt à ſon côté la pointe qui eſt au bout de la tige 8, qui y demeure ferme au moyen de la cheville de liege qui le remplit exactement. Les petites graines les plus menuës ſe placent ſur de ſemblables dames, blanches ou noires, ſuivant la couleur des graines qu'on y veut voir, & l'on employe à cet effet des lentilles convenables. Cette platine 7. ſe place au même lieu qu'eſt placée celle qui eſt marquée M M, dans la premiere Figure de la Planche 16. Et il faut remarquer que cette piece & la pincette s'y peuvent mouvoir de haut en bas, de bas en haut, & de côté, ſoit à droit, ſoit à gauche : mais pour faire avancer la lentille vers l'objet, ou pour l'en
*Planc. 16. Figure 2. éloigner, il faut tourner la petite rouë * S d'un certain ſens, puis pouſſer en avant ou en arriere la partie baſſe de l'équerre marquée a a a, l'arrêtant par le moyen de cette même rouë où l'on juge à propos de l'arrêter, prés ou loin de la lentille ſuivant ſon foyer ; & pour achever de la mettre préciſement au point où elle doit être pour bien voir l'objet ; il faut appliquer l'œil tout proche de la lentille, pendant qu'on tient le Microſcope d'une main ; puis faire tourner avec un des doigts de la même main, dont on tient le Microſcope, la grande rouë marquée N N, à droit ou à gauche, & l'arrêter dans le moment que vous appercevrez l'objet le plus diſtinctement qu'il ſera poſſible.

A l'imitation des deux tiges précedentes, marquées 1. & 8, on pourra en conſtruire de diverſes ſortes de même longueur & groſſeur ; mais de formes toutes differentes en chacune de leurs extrémitez, ſuivant le beſoin que l'on en pourra avoir. Par ce moyen l'on étendra l'univerſalité de ce porte-pincette, & en même tems celle du Microſcope, qui

tire tous ses avantages de sa bonté, & de l'industrie de celuy qui s'en sert.

De l'usage de ce Microscope pour les liqueurs.

SI l'on veut maintenant observer ce qui se peut découvrir dans une liqueur, il n'y a qu'à tremper le plus petit bout d'une plume à écrire dans une infusion de quelque plante, pour en moüiller le milieu du porte-objet de verre qui sera enchassé dans la coulisse de la piece marquée M M, en la premiere Figure de la Planche 16. afin de la faire répondre vis-à-vis de la lentille qui luy conviendra, & de la mettre au point de distinction. Ainsi l'on verra dans diverses liqueurs des animaux qui y nagent, d'autres qui y rampent & nagent, & d'autres enfin qui y marchent & qui y nagent.

Il faut remarquer que pour mettre beaucoup d'anguilles en experiences, il faudra employer le verre concave, & y mettre une assez grosse goutte de vinaigre avec le petit antonnoir dont nous avons parlé, dans l'usage des Microscopes précedens.

De la circulation du sang, & d'une nouvelle invention pour la faire voir dans la queuë d'un petit poisson, nommé Tétart ou Chabot.

L'Une des belles découvertes que l'on ait faites dans la Medecine, est celle de la circulation du sang, qui est dûë à Hervée fameux Medecin Anglois, qui la publia en l'année 1628. ou plutôt au Pere Frapaulo, celebre Ecrivain de son tems.

Quelques bons qu'ayent été les raisonnemens & les experiences de ces deux sçavans Hommes, pour établir cette opinion; tous les vieux Docteurs de ce tems-là s'éleverent contre cette nouveauté, & firent tout ce qu'ils pûrent pour la combattre; parce qu'ils manquoient alors d'experiences assez évidentes pour la preuve d'une si belle découverte. En voicy une qui met le fait hors de contestation.

Pour cela, vous n'avez qu'à préparer une platine de laiton

mince, de la figure & de la grandeur qu'eſt le deſſein marqué A B B ; préparez auſſi une bande de parchemin de la figure d'un quarré long, dont la hauteur ſoit d'environ 18. lignes, & d'une longueur ſuffiſante pour environner les montans B B de cette platine, & coller ſes deux bouts l'un ſur l'autre : après cela collez auſſi les deux extrémitez de deux petites bandes de même matiere, d'environ trois lignes de largeur au devant de cette piece, comme cela paroît aux endroits c c c c, laiſſant libre & dégagé tout le derriere des bandes ; afin que le tout étant bien ſec, vous puiſſiez paſſer librement entre ces bandes, & le derriere de la piece de parchemin doublée, les montans B, B, de la platine de laiton A.

Planche 18.

Ayez enſuite un petit morceau de glace de verre de peu d'épaiſſeur, taillé proprement, d'environ huit lignes en quarré, dont vous ferez entrer la moitié entre les deux côtez d'en-bas de la machine de parchemin, dont je viens de parler, pour la coller contre ſa partie anterieure ſeulement, ainſi qu'il paroît en D D : coupez adroitement une piece du devant de cette machine, qui ſoit de la figure du têtart, & faites que cette piece tienne par en haut, comme cela ſe voit au-deſſous de la lettre E : paſſez enſuite un bout de fil à l'extrémité du bas de cette piece libre, que vous venez de préparer, dont les bouts s'étendent à droit & à gauche, ainſi qu'il paroît en F ; en ſorte qu'il y en ait autant d'un côté qu'il s'en trouve de l'autre ; comme on le peut remarquer dans ce deſſein.

Lorſque vous voudrez faire voir la circulation du ſang dans les veines & dans les arteres qui ſont en la queuë d'un têtart, vous n'aurez qu'à en placer un au-deſſous de la piece de parchemin, que vous avez ſeparée en partie du reſte de ſa machine, aprés y avoir fait pluſieurs grands trous d'épingle, & humecté d'un peu d'eau l'endroit où vous le voulez enfermer, au moyen de la piece qui s'abaiſſe deſſus, & du fil marqué G F G, dont vous le lierez doucement, afin qu'il puiſſe reſpirer dans cet état.

Cette machine étant ainſi préparée, il la faudra porter à la place de celle qui eſt marquée M M, en la Fig. 1. Planche

16, faiſant répondre la queuë du tétart ſur le verre qui eſt au-deſſous, après l'avoir eſſuyé, l'approchant enſuite d'une lentille d'environ deux lignes de foyer, vous aurez le plaiſir de voir au jour, ou à la faveur d'une chandelle allumée, le ſang ruiſſeler dans un aſſez grand nombre de veines & d'arteres; découvrant en même tems pluſieurs autres Phénoménes aſſez curieux à obſerver.

Cette nouvelle maniere d'obſerver la circulation du ſang, & les animaux des liqueurs, eſt préferable à toutes celles où l'on employe un miroir plan, que l'on ajuſte dans une boëte préparée à cet effet; car le mêlange qui ſe fait de la lumiere refléchie par les parties ſolides du devant de la glace, de celle qui part de la ſurface du vif-argent mêlé avec l'étain, & de celle de l'air qui ſe trouve dans les pores de cet amalgame, ne produit qu'une lumiere confuſe, qui empêche le ſpectateur d'avoir une parfaite diſtinction de l'objet qu'il regarde.

Nous ſupprimons auſſi la Loupe placée entre la lumiere & l'objet, que l'on y place dans le deſſein d'éclairer davantage une petite étenduë de la queuë du poiſſon; parce que cette grande quantité de rayons de lumiere differemment modifiée, bien loin d'être avantageuſe dans cette occaſion, elle y nuit beaucoup, en empêchant le ſpectateur d'avoir une diſtinction parfaite de l'objet éclairé de cette maniere.

On peut auſſi voir la même choſe, en découvrant un plus grand champ, ou une plus grande étenduë de la queuë du tétart, en ſe ſervant d'un petit Microſcope à deux ou à trois verres convexes des deux côtez, dont voicy les proportions.

Profil d'un petit Microſcope, compoſé de deux ou de trois lentilles convexes des deux côtez.

ON voit au haut de cette Planche le profil des trois lentilles HIK, qui doivent être des plus parfaites, & montées dans le corps du Microſcope, dont le profil fait par la ſection d'un plan, paſſant par l'axe de toute ſa longueur, eſt repreſenté au bas de cette même Planche, avec les verres qui le compoſent. Planche 18.

L'oculaire marqué H, doit avoir six lignes de foyer : le verre I du milieu sera d'un pouce ; & K, qui represente la lentille, aura pour le moins deux lignes de foyer.

La distance de l'oculaire au verre du milieu sera de quinze lignes ou environ ; celle du verre du milieu à la lentille, sera de deux pouces ; & la distance de l'œil à l'oculaire, sera d'environ quatre lignes.

Enfin si l'on veut faire un Microscope à deux verres, il n'y aura qu'à supprimer celuy du milieu, & laisser le reste en l'état qu'il se trouve.

Ce Microscope à deux ou à trois verres, étant ainsi construit, s'enchassera dans la virole representée en L ; en sorte qu'il y soit fermement arrêté. M est le profil de cette virole, qui est un peu ouverte du sens de sa largeur, afin qu'elle fasse l'office d'un ressort : son épaisseur, qui est vûë en N, doit être imaginée plus haute que le plan O, sur lequel sa partie basse est enchassée de dix lignes ou environ en profondeur.

Ce plan O represente une petite platine mince de laiton d'environ quatorze lignes en quarré, percé au milieu d'un trou rond qui a cinq lignes de diametre, dont l'usage est de recevoir la bonnette qui fixe la lentille du Microscope, comme cela se peut remarquer au-dessous de la lettre P, qui est le profil de l'épaisseur de cette platine O.

Cela étant ainsi préparé, on engagera cette platine P Q, entre la piece A & le ressort C de la premiere Fig. Planche 16 ; par ce moyen on aura le plaisir d'appercevoir tout ce qui sera dans une petite goutte d'une infusion mise sur le porte-objet du Microscope, & d'y découvrir un champ beaucoup plus grand que n'est celuy que l'on découvre ordinairement avec une seule lentille, mais avec moins de clarté.

Il a encore un avantage particulier, qui est de servir à découvrir les objets d'une distance plus grande que l'on ne feroit avec une lentille d'un tres-court foyer.

Ce Microscope à deux ou à trois verres, étant monté de même que ceux qui sont composez d'autant de verres, servira aux mêmes usages.

En continuant de parler des usages du Microscope universel, nous dirons que pouvant écarter, tant & si peu qu'on le

veut, le porte-lentille de l'objet qu'on veut voir, on a la facilité de mettre en usage des lentilles de divers foyers ; & par consequent celuy de faire, avec cette nouvelle monture, un grand nombre d'experiences qu'on ne peut pas faire avec plusieurs autres d'une construction differente.

Comme on peut approcher en un instant la lentille de l'objet, avant que de porter le Microscope à l'œil, & achever de la mettre assez prés ou assez loin de l'objet, par le moyen de la rouë N N, que l'on tourne avec un seul doigt de la main qui le tient, cela donne le moyen de promener l'objet avec l'autre main, & de découvrir toute l'étenduë de la petite goutte d'eau mise sur le porte-objet, & en même tems ce qu'elle contient. Planche 16.

Cette rouë N N, sa vis, & la piece marquée q s, dans le profil de la Planche 16, font que ce Microscope a une proprieté qui consiste, en ce que dans le moment que l'on commence à tourner la rouë N N, la lentille part pour s'approcher ou pour s'éloigner de l'objet, ce qui fait juger de sa bonté ; car étant excellente, son meilleur effet paroît à une seule distance de l'objet ; au lieu que si elle n'étoit que mediocre, son effet se feroit voir le même en des distances inégales.

Le nouveau porte-lentille, marqué F, est si commode, qu'on peut par son moyen employer des lentilles d'un si court foyer que l'on voudra, & mettre les liqueurs au devant ou au derriere du porte-objet de verre ; ce qui donne occasion d'obſerver les poissons qui nagent dans ces liqueurs par devant ou par derriere, & de découvrir s'ils rampent ou s'ils marchent sur le porte-objet, ou enfin s'ils nagent dans l'eau que l'on examine. Planche 16. & 17.

On voit bien que ce Microscope ainsi construit, & accompagné de toutes les pieces qui en doivent faire l'assortiment, est presque universel, & qu'on peut faire avec cet instrument toutes les experiences dont j'ay parlé dans ce Traité, à la reserve de quelques-unes qui se font commodement avec les Microscopes à canons, & le porte-Loupe ; car il est évident qu'on ne le peut employer dans les dissections des petits animaux vivans ou morts ; qu'il ne peut servir à les dessiner ni à

les graver élégamment, ni même à les tenir enfermez durant plusieurs mois dans de petites prisons bien éclairées, comme on fait dans les Microscopes à tombeaux, où l'on voit comment les uns y font leurs œufs, & d'autres leurs petits tout vivans; comment ils s'y nourrissent; comment ils y changent de couleur; comment ils y combattent; & où enfin l'on découvre avec beaucoup de plaisir plusieurs especes de métamorphoses, qu'on ne se lasse point d'admirer.

CHAPITRE XVI.

Autre nouveau Microscope universel.

VOicy un second Microscope universel, plus simple que le précedent, & qui a par-dessus cela quelques avantages qui ne s'y rencontrent pas. On le voit representé dans cette dix-neuviéme Planche, en deux positions toutes differentes; la premiere, est une élévation géometrale du Microscope tout entier vû par devant; & la seconde le représente vû de côté.

Ce Microscope étant construit de plusieurs pieces semblables à celles du précedent, & ces pieces ayant icy les mêmes usages, nous passerons légérement par-dessus, nous contentant de nous étendre autant qu'il le faudra sur celles qui sont d'une nouvelle construction, & dont les fonctions sont plus parfaites & plus commodes.

Explication de la premiere & seconde Figure, qui représentent le Microscope tout entier vû par devant & de côté; où il faut remarquer que les grosses lettres servent de renvoy à la premiere Figure; & les petites, à la seconde.

AA, est une piece de laiton soudée par en bas, à une petite piece ronde & platte, ornée de quelques moulures pour servir de base à cette maîtresse piece, & de couronnement à la virole du manche sur laquelle elle se monte à vis, comme on le peut remarquer au bas de la seconde Figure.

Cette

Cette piece A A, qui reſſemble en quelque façon à une petite palette, dont les enfans ſe ſervent pour jouër au volant, eſt nommée la maîtreſſe piece; parce qu'elle ſert à ſoutenir & à porter les autres parties de ce Microſcope : ſa longueur, ſa largeur & ſon épaiſſeur ſont exactement repréſentées dans la premiere & ſeconde Figure.

b, eſt un canon en forme de quarré long, repréſenté en la ſeconde Figure, ſoudé par un bout au-deſſus du milieu de la maîtreſſe piece A A, ou a a.

c c, eſt un autre petit canon creux & de même figure, qui entre juſtement dans le précedent : ce petit canon eſt ſoudé à une petite piece de laiton marquée D ou d.

E, ou e e, repréſentent une vis qui tient à la piece d, ſur laquelle tourne la rouë F F, ou f.

G, ou g, eſt un reſſort d'acier trempé, dont le bas eſt attaché ſur la maîtreſſe piece A A, ou a a.

Le bout d'en-haut de ce reſſort eſt ſeparé en deux parties, formant une eſpece de fourchette platte par ſes extrémitez, pour laiſſer un paſſage libre à la vis e e; de maniere que les deux extrémitez du haut de ce reſſort appuyans contre le milieu de la piece marquée d, elles la pouſſent continuellement en avant.

On voit en la ſeconde Figure, tant au-deſſous de la lettre h, qu'au-deſſus d'i, les bouts de deux petits reſſorts d'acier placez, l'un dans le gros canon b, & l'autre dans le petit marqué c, pour rendre uniforme le mouvement du petit canon, & du bras horiſontal de l'équerre l l l, dont on va parler.

L, ou l l l, eſt une grande piece de laiton, formant une eſpece d'équerre, dont la branche horiſontale eſt toute ſimple, au lieu que ſa verticale eſt plus compoſée. La branche la plus ſimple eſt ſemblable à une petite regle ordinaire, dont toutes les ſurfaces oppoſées ſont paralleles entr'elles; afin qu'étant ainſi d'égale épaiſſeur, elle puiſſe couler librement, & d'un mouvement égal, dans le conduit qui aura été pratiqué au-dedans du petit canon marqué c.

La branche verticale de cette équerre eſt conſtruite de pieces ſemblables à celles du Microſcope univerſel préce-

dent, representées dans la Planche 16. Figure 1. & 2. par les lettres A, B B, C, & expliquées dans le Chapitre XV. qui précede celuy-cy.

M M, sont deux ressorts de laiton attachez fermement l'un à droite & l'autre à gauche, de la largeur de la piece A A, par le moyen de deux vis dont on voit les têtes, & de deux petites goupilles invisibles, qui sont rivées aux extrémitez d'en-bas de ces ressorts, courbez en deux sens differens, comme on le peut remarquer en h & en m, afin de faciliter l'entrée, & l'enfoncement des diverses pieces qui doivent s'introduire derriere ces mêmes ressorts.

Au milieu de l'épaisseur, & à l'extrémité superieure de la maîtresse piece A A, ou a a, il y a une ouverture faite en forme d'un petit quarré long, dont les moindres côtez sont également distans de la largeur de la platine A A, dans laquelle on fait entrer le bras vertical d'une petite regle de laiton d'environ vingt lignes de longueur, & de trois lignes de largeur, pliée par le milieu pour former une équerre, dont le bout horisontal n porte la virole p, qui fait ressort, dans laquelle on fait mouvoir le canon O, garni de même que celuy du Microscope précedent.

Les portes-lentilles, les portes-objets, les portes-pincettes, &c. s'éxecutent de même qu'ils sont representez dans les Planches du premier Microscope universel; & les usages de toutes ces pieces doivent être icy les mêmes, c'est pourquoy nous n'en parlerons pas.

CHAPITRE XVII.

Explication d'un troisiéme & dernier Microscope nouveau & universel.

JE vais finir la premiere Partie de ce Livre, par l'explication d'un troisiéme Microscope nouveau, & un peu plus universel que le précedent, où nous n'avons employé que des tétarts pour faire voir la circulation du sang; au lieu

que dans celuy-cy on y pourra ajuster des poissons de plusieurs especes, de differentes longueurs, & de diverses grosseurs. Et parce qu'il a d'ailleurs tous les avantages du précedent, on l'y doit préferer ; mais comme il contient beaucoup de pieces qui ont un grand rapport à celles de ce Microscope-là, & qu'elles ont été expliquées dans le Chapitre précedent, nous ne devons presque parler icy que de celles qui en sont differentes. Et afin d'abreger cette description autant que nous le pourrons, nous avertissons que les grosses lettres qui se voyent sur les parties de ce Microscope, representé en la premiere Figure de la Planche 20, servent de renvoy aux petites lettres de même nom, qui sont sur les mêmes parties du profil de ce Microscope, Figure 2 ; afin que par ce moyen on puisse avoir une intelligence plus parfaite de la construction & des usages de toute cette machine. Mais parce que les proportions de la hauteur, de la largeur, & de l'épaisseur du corps de ce Microscope, dépendent de la longueur, de la largeur & de l'épaisseur des poissons, dans la queuë desquels on voudra voir circuler le sang ; cela fait qu'on ne peut déterminer toutes ces choses qu'à peu près, & en donner des mesures qui répondent à celles des animaux dont le choix est plus convenable ; & d'autant que les petits poissons ont la queuë plus mince & plus transparente que n'est celle des gros, il les y faut préferer, & réduire la grandeur des parties du Microscope dans le moindre volume qu'il sera possible, afin d'en faciliter le transport.

Pour cet effet, nous avons jugé à propos de donner environ huit pouces de hauteur à toute la machine ; mais cette Planche n'en ayant pas assez pour la contenir toute entiere, nous avons résolu d'en marquer toutes les dimensions par des mesures exactes, afin que sur ce détail on la puisse facilement executer. Ainsi nous dirons que le corps du Microscope est fait de laiton ; que sa hauteur A B est divisée en deux parties ; que la poignée C D a quatre pouces de hauteur ; que sa largeur F F est de vingt lignes, & son épaisseur G H de treize ; que cette poignée est creuse & de figure cilindrique un peu applatie, en sorte que ses extrémitez sont

devenuës ovales, demeurans dans les mêmes proportions cy-dessus marquées.

La seconde partie superieure A I, est faite à peu près comme un parallelepipede rectangle, dont la hauteur a vingt-sept lignes; la largeur par le bas, tant du devant que du derriere, est de seize lignes, & par le haut des mêmes côtez de dix-huit; & que chacun des autres plus petits côtez n'a que dix lignes.

Cette même partie A I est inégalement divisée en deux autres; celle de dessous a seize lignes, & celle de dessus onze : les deux côtez de la premiere partie qui touchent la poignée, sont ouverts; & ceux de la seconde, qui répondent immédiatement au-dessus, sont fermez.

A peu près vers le milieu de la partie superieure du devant, & du derriere du corps du Microscope, on y a attaché deux plattes-bandes marquées l l, dans le profil Figure 2, qui en occupent toute la largeur, & dont les extrémitez sont entaillées pour servir de coulisse; & au milieu de la platte-bande du derriere du Microscope, on y a soudé une vis m d'environ un pouce de longueur, de deux lignes de diametre, & d'un pas assez gros.

Maintenant dans les entailles des deux pieces à coulisses dont on a parlé, on y fait entrer les côtez creux d'une double équerre o o, dont la concavité est faite en forme d'un quarré long.

Cette double équerre o o entre à coulisse par le devant du Microscope, & ses extrémitez posterieures, qui sont faites en tenons percez, reçoivent une piece de laiton platte marquée p p, qui est retenuë par deux goupilles; & il faut remarquer 1°. que la vis m dont nous venons de parler traverse librement le milieu de cette piece de laiton; 2°. Que cette piece de laiton jointe à la double équerre forment un châssis quarré qui environne le corps du Microscope, & qui pourra être mû en avant & en arriere, pour servir aux usages dont on parlera cy-après. Et enfin qu'au derriere du corps de ce Microscope on y a attaché un ressort d'acier marqué q, Q, dans la seconde & troisiéme Figure, d'environ trois pouces de longueur & de huit lignes de largeur, dont l'effet est de

pouſſer le châſſis en arriere ; & ayant monté une rouë dentelée r r ſur cette vis m, dont le diametre excede un peu les côtez de la double équerre, elle ſervira à pouſſer le châſſis d'un ſens oppoſé à celuy du reſſort marqué Q.

Dans les deux côtez creux des pieces à couliſſes, & par le devant du corps du Microſcope, on fait entrer deux lames d'acier s s, aux extrémitez deſquelles eſt rivée une piece platte marquée T, t, Figure 1. & 2, Planche 20. recourbée en double équerre, comme on le voit dans le profil de la ſeconde Figure, & dans celuy de la cinquiéme, Planche 21.

Le haut de cette partie platte, ainſi recourbée, eſt composé de pieces toutes ſemblables à celles du haut du Microſcope précedent ; & ces pieces doivent avoir icy & là à peu près les mêmes proportions & les mêmes uſages.

On voit paroître au-deſſous des lettres V, V, le haut de deux reſſorts d'acier, dont les extrémitez inferieures ſont attachées interieurement au corps du Microſcope, par le moyen de deux vis dont les têtes paroiſſent en X X, & ces reſſorts ſont retenus fermement en la ſituation qu'on les voit par deux petits tenons, dont les bouts paroiſſent quelque peu plus bas que ne ſont les têtes de ces vis.

Au deſſus, & au derriere de la partie ſuperieure de tout le corps du Microſcope, on y a pratiqué, dans le milieu de ſa longueur & de ſon épaiſſeur, une cavité reguliere d'environ Planche 20.
dix lignes de profondeur, de huit lignes de longueur, & d'un Figure 2.
peu moins d'une ligne d'épaiſſeur, pour y faire entrer la queuë & d'une virole 1. qui fait reſſort, & dans laquelle on introduit le canon 2, garni de diaphragmes.

La troiſiéme Figure de la 21. Planche, repreſente le Microſcope vû par derriere, & dans une élevation géometrale, où l'on peut voir la hauteur de la poignée I B couverte de chagrin, le grand reſſort d'acier marqué Q, la vis qui l'attache à peu près au milieu de cette poignée, la rouë dentelée R, montée ſur la vis M qui en traverſe le milieu ; le reſte du corps du Microſcope, le derriere du canon garni d'un diaphragme, & d'une virole qui le retient ſur le bord de ce canon ; & enfin une petite partie de tout ce qui ſe voit repreſenté au-deſſous de la quatriéme Fig. Planche 21.

Cette quatriéme Figure represente une machine composée d'un porte-canon z z, concave d'un côté & convexe de l'autre : on voit au milieu un petit anneau marqué & &, que l'on a reservé de part & d'autre de la même piece dont le canal est fait, sur le milieu duquel on a attaché un ressort d'acier trempé marqué I, qui se voit terminé en Y Y, dont les extrémitez sont recourbées d'un sens contraire à celuy du canal de laiton marqué z z qui luy répond, afin que ces deux corps ainsi figurez concourent ensemble à retenir les tuyaux de verre, d'argent ou de laiton, gros & menus, dans la cavité desquels on introduira les poissons qu'on y voudra mettre.

La partie superieure 2 2, de ce porte-canon, est faite de laiton mince, & elle est de la même grandeur & de la même figure que le dessein la represente. On y voit en haut & au milieu une ouverture en forme d'un quarré long, sur laquelle on pousse à coulisse un verre plan de même figure & de peu d'épaisseur, mais un peu plus grand, taillé en biseaux tout le long de ses plus grands côtez.

Enfin la Figure 5, qui est au bas de la Planche 21, est le profil d'une piece qui tient à la platte-bande T, Fig. 1. Planche 20, recourbée en double équerre, & sur le devant de laquelle on voit deux doubles ressorts d'inégales largeur & hauteur, derriere lesquels on introduit le porte-lentille, & la piece qui doit servir à soutenir un petit Microscope à deux ou trois verres convexes des deux côtez, comme il a été expliqué dans l'usage de l'un & de l'autre des deux Microscopes précedens.

Outre les pieces dont je viens de parler, qui accompagnent celuy-cy, on doit encore l'assortir d'un porte-pincette, d'un porte-tétart, d'un porte-objet à coulisse, pour y introduire des verres taillez diversement, & d'autres portes-objets, qui doivent servir à des usages differens, & dont il a été parlé ailleurs assez au long, pour n'avoir pas besoin d'une plus ample explication.

J'avertiray seulement que la curiosité & le desir de rendre cet Ouvrage autant parfait qu'il m'a été possible de le faire, m'ont engagez à rechercher les moyens de satisfaire pleine-

ment ceux qui voudront sçavoir si le sang circule d'une même maniere dans des poissons d'une même espece ; s'il se meut differemment dans ceux qui sont de diverses natures ; s'il va plus vîte dans les vaisseaux des uns que dans ceux des autres ; s'il y est plus ou moins rouge ; si les globules du sang qui passent d'une artere dans une veine, se divisent en d'autres globules plus petits ; si toute la masse du sang est uniforme, ou si on la voit composée de parties héthérogenes ; si les arteres & les veines ne sont que des tuyaux recourbez, comme les syphons ; si l'on voit le sang s'arrêter dans quelques vaisseaux d'un même poisson, pendant que son mouvement se continuë en d'autres ; si tout le sang d'un petit poisson, ou de quelque autre animal, comme d'une mitte de serin de Canarie, peut cesser de se mouvoir pour quelque tems seulement ; s'il est plus épais en de certains poissons qu'en d'autres ; pourquoy il paroît blanc en quelques-uns, & rouge en d'autres, &c. C'a donc été pour satisfaire ceux qui nous font l'honneur de nous proposer de semblables questions, & pour faciliter la résolution d'un nombre presque infini d'autres, qui rendent la Physique tres-utile & tres-agréable, que j'ay fait construire ce troisiéme Microscope universel, dans lequel on pourra facilement appliquer quand on voudra, & durant toute l'année, tantôt des tétarts ou chabots, tantôt de petites anguilles, quelquefois des lamproyes, d'autres fois de petites tanches ou des carpes, dans la queuë desquelles on aura le plaisir d'observer, comme on le va dire, à la lumiere du jour ou à celle d'une chandelle, toutes les choses dont je viens de parler. Et avec ce seul Microscope, accompagné des pieces qui doivent l'assortir, on pourra aussi faire toutes les experiences dont les deux précedens Microscopes sont capables.

CHAPITRE XVIII.

Comment on doit ajuster une Lamproye, une Anguille, ou un têtart, dans un tuyau de verre, d'argent ou de laiton. Comment on applique ces tuyaux dans la machine representée en la Planche 21. Fig. 4. Et enfin comment cette même machine doit être placée dans la capacité du corps du Microscope.

POur cet effet prenez un de ces tuyaux, qui soit un peu plus court que la lamproye, ou l'anguille que l'on y voudra faire entrer, & tellement construit, que l'un de ses bouts soit taillé à peu près comme celuy d'une plume à écrire, pendant que l'autre bout du même tuyau se terminera en pointe un peu émoussée & percée, afin que l'animal qu'on y fera entrer y puisse facilement respirer. Il faut observer que le tuyau dans lequel on fera entrer le poisson ne doit pas être trop grand, parce qu'il en pourroit sortir de luy-même, après l'y avoir fait descendre, en commençant par la tête.

Cela supposé, arrêtez la queuë de l'animal après l'avoir fait surpasser de quelques lignes, le bout d'en-haut du tuyau taillé obliquement, avec un peu de papier ou de linge, que vous ferez entrer dans ce tuyau sans beaucoup presser la queuë de l'animal, qu'il faudra faire répondre sur le verre à coulisse; ensuite de quoy il n'y aura plus qu'à mettre cette machine, ainsi préparée, dans l'espace vuide du corps de ce Microscope, en l'y arrêtant du sens qu'il faut, derriere les ressorts d'acier que l'on voit representez en V V, de la premiere Fig. Planche 20. faisant encore répondre le bout de la queuë de ce poisson vis-à-vis la lentille que l'on mettra facilement au point de distinction, par le moyen de la grande rouë à dents; alors vous aurez le plaisir d'observer à loisir le mouvement du sang à la lumiere du jour, ou à celle d'une chandelle.

Je ne devrois rien dire icy de la préparation du têtart; parce que j'en ay parlé dans l'usage du premier Microscope universel,

univerſel, ni de pluſieurs autres choſes qui ont été expliquées ailleurs; cependant je me ſens obligé de parler d'une nouvelle maniere de les ſaiſir avec beaucoup plus de facilité qu'on ne peut faire en ſuivant la méthode précedente. Elle conſiſte 1°. à prendre un tuyau de verre comme a b, qui ſoit un peu plus long que n'eſt le poiſſon qu'on y voudra faire entrer, pour tailler l'extrémité b, ainſi que cela ſe voit en la Fig. 6. de la 21. Planche.

2°. De faire un autre tuyau c d e, de carton ou de papier, qui puiſſe entrer par le bout a du premier tuyau, afin de ſervir à pouſſer l'animal qu'on y mettra juſqu'au point où il doit être, pour que ſa queuë réponde au milieu de la largeur du verre dont il a été parlé ci-devant, afin d'y obſerver le ſang en mouvement. Ces deux tuyaux doivent être ouverts d'un bout à l'autre; afin de donner moyen au poiſſon, qui ſera placé dans le premier a b, d'y pouvoir reſpirer facilement.

Pour l'arrêter dans ce tuyau de verre, on peut tres-utilement ſe ſervir d'un petit morceau de linge fin & moüillé, une partie duquel doit être dans le tuyau, l'autre partie s'y mettra auſſi aprés y avoir placé l'animal: enfin ce tuyau étant ainſi préparé, on le fait entrer, comme on l'a dit, dans la machine qui eſt au-deſſous de la Figure 4. Planche 21. Et s'il arrivoit encore qu'aprés avoir ainſi ſaiſi l'animal, il vint à ſeparer ſa queuë du verre ſur lequel on l'avoit ajuſtée, on l'y fixeroit une ſeconde fois mieux qu'elle n'étoit, en appliquant ſur ſa partie la plus épaiſſe une petite bande étroite de linge fin moüillé, afin qu'elle s'y attache, & qu'elle y faſſe demeurer ſtable cette partie du poiſſon, durant le tems des obſervations qui s'en feront.

Cette nouvelle méthode de fixer les lamproyes, les anguilles, les têtarts, &c. dont la groſſeur ne ſurpaſſe pas le diametre interieur des tuyaux de verre qu'on peut faire entrer dans la machine dont je viens de parler, eſt préferable à celle dont on s'eſt ſervi juſqu'à preſent, parce qu'elle évite des défauts conſiderables, qui naiſſent de l'impoſſibilité où l'on ſe trouve d'avoir des tuyaux de verre aſſez minces, aſſez

tranſparens, & qui ſoient d'ailleurs exempts des filets qu'on y voit étendus d'un bout à l'autre de leur longueur, ce qui empêche le bon effet des meilleurs Microſcopes.

Il ne reſte plus qu'à dire comment & ſurquoy il faut ſaiſir les poiſſons, dont la groſſeur ne permet pas de mettre en uſage la machine qui eſt repreſentée au-deſſous de la Figure 4. Planche 21. Pour cet effet, il n'y a qu'à préparer un porte-objet de laiton, dont la hauteur & la largeur égalent celles des poiſſons qu'on y doit appliquer : pour le faire, tirez ſur un carton fin, ou ſur du laiton qui ſoit environ de l'épaiſſeur de deux cartes à joüer, une ligne droite, longue de deux pouces huit lignes, à l'une des extrémitez de laquelle vous éleverez perpendiculairement une autre ligne droite d'un pouce, afin que par ce moyen vous puiſſiez achever un quarré long, duquel vous diviſerez le plus grand côté ſuperieur en deux parties égales, prenant enſuite de part & d'autre de ce milieu deux longueurs chacune de ſept lignes, & ſur leur extrémitez vous y éleverez deux perpendiculaires, chacune de deux pouces ſix lignes, pour terminer la hauteur des montans du porte-objet : après cela vous prendrez à droit & à gauche de ces montans une largeur de quatre lignes au plus, & par les points qui la termine vous tirerez deux autres lignes paralleles aux deux précedentes.

Diviſez enſuite en deux parties inégales toute la hauteur de l'eſpace qui ſe trouve entre ces deux montans, qu'il faudra vuider pour en ôter le ſuperflu, donnant un pouce à celle d'en-bas pour la hauteur d'un morceau de glace des plus tranſparens qu'on pourra trouver, lequel étant taillé en biſeaux à droit & à gauche, on le fera entrer à couliſſe dans deux rainures bien faites qui ſeront pratiquées dans l'épaiſſeur des montans de ce porte-objet ; & ſur ce verre on deſcendra encore à couliſſe une piece de laiton d'environ quatre pouces ſix lignes de longueur, dont la partie qui doit toucher le ſommet du morceau de glace, & ſe terminer aux extrémitez des montans, ſera plane, & le reſte un peu creux, & plus large que la partie qui eſt au-deſſous ; afin que le corps de chaque poiſſon qui eſt convexe, & qu'il y

faudra coucher de toute sa longueur, s'y puisse mieux ajuster qu'il ne feroit si cette piece étoit platte dans toute son étenduë.

En ôtant aprés cela le superflu qui se trouve à droit & à gauche de cette nouvelle machine, on aura le porte-objet, dont les montans seront plus fermes si l'on reserve assez de matiere par le bas pour les terminer par deux doucines, accompagnées de filets quarrez, qui leur serviront comme de bases, & d'un couronnement des plus gracieux qu'on puisse faire.

On voit bien que la hauteur & la largeur de toute cette machine, doivent être proportionnées à celles des poissons qu'on y veut saisir, & que moins ils auront d'âge, plus la queuë en sera mince & transparente, ce qui donnera lieu d'y observer plus agréablement la circulation du sang, que l'on ne feroit, si la queuë de ces poissons étoit plus épaisse, dont la raison est si évidente que chacun la peut appercevoir, pour peu d'attention qu'on y donne.

Cela supposé, lorsqu'il s'agira d'appliquer sur cette machine une tanche, une carpe, un brocheton, &c. vous n'aurez qu'à y coucher un de ces poissons tout de son long, en faisant répondre sa queuë sur le milieu du morceau de glace, jettant ensuite sur la longueur de tout son corps une petite bande de mousseline, moüillée ou non; puis arrêtant le tout avec un petit ruban étroit, vous transporterez le porte-objet ainsi chargé entre les deux ressorts d'acier qui se voyent au-dessous de V V, Figure premiere de la vingtiéme Planche, pour faire vos observations avec des lentilles qui leur conviennent.

Et parce que cette explication pourroit paroître trop difficile à comprendre, n'étant pas accompagnée d'un dessein qui represente la machine dont je parle; j'ay jugé à propos de la representer icy telle que je l'ay décrite, & d'ajoûter encore que A B C, est le porte-objet de laiton, Planche 22.

B C, les montans à rainures.

D, le morceau de glace taillé en biseaux, pour entrer à coulisse dans les rainures des montans.

F E, est une seule piece de laiton qui est plane depuis F

jufqu'en C, & concave depuis C jufqu'en E; & que c'eft tout le long de cette derniere piece que l'on applique les poiffons, en les y faififfant la tête vers E, & la queuë étenduë fur le milieu du verre marqué D.

Je crois devoir encore dire comment on pourra conferver durant plufieurs mois les poiffons dont je viens de parler, afin d'en avoir toujours de plufieurs fortes, foit en efté, foit en hyver, pour fervir à faire voir la maniere dont le fang circule dans les vaiffeaux des uns & dans ceux des autres.

Les jattes de bois un peu profondes feront tres-propres pour y conferver les tétarts, en leur donnant tous les jours de l'eau nouvelle, de riviere ou de fontaine. Et pour faciliter ce changement fans les toucher, on n'aura qu'à verfer tout ce qui fera dans la jatte, dans une paffoire de terre vernif-fée; afin que l'eau s'étant feparée des tétarts, on les puiffe remettre dans leur vaiffeau avec de l'eau nouvelle, & quelques petits morceaux de petit pain. J'en ay gardé ainfi dans mon Cabinet depuis le commencement de l'efté dernier jufqu'à prefent 12. Fevrier 1718. que j'avois fait pêcher dans les baffins des Thuilleries, & dans celuy du Jardin qui eft au Palais de Luxembourg.

Les lamproyes ne font pas fi communes que les tétarts, il les faut faire pêcher affez loin de cette Ville, & les conferver dans des vaiffeaux de terre ou de grais, où l'on met de l'eau commune & du fable de riviere, dans lequel elles s'enfoncent & s'y cachent pour quelque tems. Et quoy qu'on foit obligé de changer d'eau affez fouvent, parce qu'elles y trouvent leur nourriture, on ne l'eft pas d'en faire de même du fable, qu'il fuffira de laver une fois ou deux durant huit jours.

Les petites tanches, les carpes & les brochetons, fe peuvent conferver affez de tems, en les mettant dans un vaiffeau qui leur conviennent, avec autant d'eau de riviere & de pain qu'il en faudra pour les nourrir durant deux ou trois jours.

Fin de la premiere Partie.



Lucas sculpsit


Pl. 2
3
I
B
4
D
F
2
G
E
I
H
L
C
P
O
M
N
Lucas Sculpsit



Lucas Sculpsit.


Pl. 4
a
&
7
6
5
c
b
b
f
e
d
g
h
Lucas Sculpsit



Lucas Sculp.

Pl 6.



Lucas Sculp.


D
A
E
B
L
G
G
H.
I.
F
C
M
N
O
P
Q
R
S
R



Lucas Sculp.



Cl. Lucas Sculp.


R
P
Q
F
G
R
E
B
M
H
I
E
L
D
C
M
D
M
M
M
B
N
N
E
H
O
A
O
E
S
T


Fig. I
Pl II
A
B B
C C
G
F
D
H
B
E E
Fig. II
G
H
B H B
B
B
A
F
B B
F
C C
D
E E

Fig. I.



Fig. II.



Dessein d'un Porte Loupe.



Pl. 14




B
A
g
h
c
d
F
e
I
l
6 pou.
1 ong.
12 lig.
43 lig.
8 lig.

Nouveau Microscope Universel

Fig. 1.



Elevation geometrale

5. po. hauteur toute entiere du Microscope

Fig. II.



Profil

Desseins des pieces particulieres du Microscope universel Pl. 17



Autres desseins des pieces qui achevent le microscope universel



Profil d'un petit microscope a trois verres

Autre Nouveau Microscope Universel.

Fig. 2.



Fig. 1.



Vipheux F.

Troisieme Nouveau Microscope Universel. Pl. 20.




Fig. 3
A
Y
Y
M
R
I
I
Q
B
D
B
Y
Fig 4
2
2
Y
Z
Z
&
&
T
T
Fig. 5.
b
a
c
d
e
Fig. 6.


E
E
C
C
F
D
B
B
A

NOUVELLES OBSERVATIONS,

Faites avec de nouveaux Microſcopes, ſur une multitude innombrable d'inſectes, & d'autres animaux de diverſes eſpeces, qui naiſſent dans des liqueurs préparées, & dans celles qui ne le ſont point.

SECONDE PARTIE.

AVERTISSEMENT.

APRE'S avoir expliqué dans la premiere Partie de cet Ouvrage, la conſtruction, & quelques uſages de pluſieurs nouveaux Microſcopes à liqueurs, beaucoup plus parfaits & plus commodes qu'aucun de ceux qui ſont venus juſqu'à preſent à ma connoiſſance; il eſt neceſſaire de les mettre en uſage, pour faire l'Hiſtoire anatomique d'une multitude

presque infinie de tres-petits animaux aëriens, terrestres & aquatiques, qui ont été jusqu'à present inconnus, à cause de leur petitesse, & des grands défauts qui sont inséparables des Microscopes ordinaires.

CHAPITRE PREMIER.

Des Anguilles, Serpens, ou petits vers que l'on trouve dans le vinaigre.

CE n'est pas d'aujourd'huy qu'on est assuré que le vinaigre contient en esté beaucoup de petites anguilles; mais ce n'est que depuis l'invention du Microscope, que l'on s'est apperçû que ces serpens ont une queuë fort aiguë; & c'est ce qui a donné occasion à plusieurs personnes de croire que le vinaigre ne piquoit, que par l'impression que ces petits animaux faisoient sur la langue; mais les diverses experiences que nous avons faites sur ce sujet nous persuadent, que ce n'est point à ces animaux qu'il faut attribuer l'acidité qui se remarque dans cette liqueur; mais seulement à ses parties invisibles; puisque nous avons vû de bon vinaigre sans anguilles.

Au commencement du mois d'Avril de l'année 1680. nous n'apperçûmes aucun de ces insectes dans du vinaigre qui avoit été exposé au Soleil durant quelques heures.

Vers la fin du mois de Juin de la même année, & tout le reste de l'esté, il étoit difficile de trouver dans Paris du vinaigre dans lequel il n'y eût point d'anguilles: & cela fit que bien des gens qui les avoient vûës dans nos Microscopes discontinuerent de manger de la salade. J'avois beau leur dire qu'elles étoient environ cent mille fois plus petites qu'ils ne les voyoient par ces instrumens; que la chaleur de l'estomach les faisoit mourir en un instant; & que, puisqu'ils avoient mangé de la salade jusqu'à present sans en avoir ressenti aucune incommodité, ils pouvoient continuer sans danger l'usage d'une chose qui leur faisoit plaisir. Et quoy que toutes ces raisons leur parussent assez solides & assez convain-

convaincantes pour les tirer de l'erreur où ils étoient ; la plûpart ne pouvoient comprendre que des ſerpens qui leur avoient paru plus gros que le doigt, & plus longs que le bras, ne fiſſent quelque mauvaiſe impreſſion ſur les membranes interieures de l'eſtomach.

Ce qui nous engagea à faire quelques experiences pour ſeparer ces animaux d'avec le vinaigre, & le purger d'une choſe qu'on s'imaginoit capable de nuire à la ſanté.

La premiere experience que je fis fut de paſſer le vinaigre au travers d'un tamis aſſez fin ; mais je connus que les petites anguilles paſſoient auſſi avec la liqueur.

2°. Je fis chauffer du vinaigre ſur le feu ſans le faire boüillir ; toutes les anguilles perirent ſans que la force du vinaigre fut conſiderablement diminuée.

3°. J'expoſay encore de cette liqueur durant deux heures au Soleil, & la même choſe arriva, de maniere qu'au bout de quelque tems la plus grande partie de ces animaux furent précipitez au fond de la bouteille.

Enfin faiſant paſſer le vinaigre au travers d'un papier broüillard, ou d'une chauſſe, l'on aura tout d'un coup la liqueur comme on la veut.

Les animaux dont nous parlons ſe multiplient, & groſſiſſent en peu de tems juſqu'à un certain point ; & on remarque que l'air leur eſt ſi néceſſaire, qu'on les voit s'amaſſer en beaucoup plus grand nombre vers la ſuperficie de la liqueur, que par tout ailleurs ; & s'ils deſcendent quelquefois au fond du vaiſſeau, ils remontent bien-tôt aprés juſqu'au haut pour y reſpirer.

Si l'on prend deux bouteilles au commencement du mois de May, & qu'on les rempliſſe d'un vinaigre pur, bouchant l'une des deux bouteilles, & laiſſant l'autre ouverte, on verra dans la ſuite des anguilles dans celle-cy, & point dans l'autre, au moins pendant tout le tems qu'elle aura été bien bouchée.

Ceux qui croyent que toutes les generations ſe font par les œufs, diſent qu'au commencement des chaleurs certains petits animaux imperceptibles à nos yeux, qui volent ou nagent dans l'air, étant comme attirez par les parties ſpiritueu-

ſes qui s'exalent continuellement du vinaigre, laiſſent tomber des œufs dans cette liqueur, où recevant une chaleur moderée, & cauſée par une douce fermentation, ils y peuvent éclore, & fournir ainſi en peu de tems les petits animaux dont je parle.

Cette maniere de faire naître les anguilles du vinaigre, ne s'accorde pas avec ce que deux de mes amis ont obſervé dans quelques petites gouttes de vinaigre miſes dans un Microſcope; ni avec ce que j'ay vû dans deux ſemblables experiences, dont je parleray à la fin de cette ſeconde Partie, où je rapporte exactement les obſervations que j'ay faites ſur deux petites anguilles qui alloient & venoient dans les corps de leurs meres.

Cela ſuppoſé, il ne paroît pas qu'on puiſſe rapporter l'origine des anguilles du vinaigre à aucune corruption qu'on pourroit ſuppoſer y être ſurvenuë, puiſqu'on ne trouve en cette liqueur aucun changement ſenſible, ſoit avant ou aprés leur naiſſance.

Monſieur Amontons, de l'Academie Royale des Sciences, m'apporta un jour une petite bouteille de vinaigre diſtilé, qui étoit d'une force extraordinaire, & qui contenoit un nombre prodigieux de petites anguilles d'une tres-grande vivacité. Je conſervay cette liqueur durant quinze mois ou environ, ſans boucher la bouteille; de ſorte que s'étant évaporée, il ne reſta plus au fond de cette bouteille qu'un ſediment fort épais, & d'une odeur aſſez deſagréable.

Ces animaux meurent ſouvent d'une eſpece de paralyſie qui attaque d'abord une partie de leurs petits corps; ſouvent auſſi on voit qu'elles en guériſſent en peu de tems, particulierement durant les chaleurs de l'eſté, pourvû que la tête ne ſoit pas attaquée de cette maladie.

Il eſt aſſez rare de voir vivre ces anguilles durant une année entiere; ſoit parce qu'elles manquent de nourriture, ſoit parce qu'elles ne reſpirent pas un air aſſez chaud, où elles ſe conſervent bien mieux qu'elles ne font ailleurs.

En A, on voit deux de ces anguilles figurer enſemble, de
Planche 1. telle maniere qu'elles s'accordent à faire des ondulations pareilles; on en voit même quelquefois juſqu'à cinq ſe mouvoir ainſi.

En B, B, B, B, on en voit quatre autres courbées diverſement, & qui ſe débandent avec autant de vîteſſe que feroit un reſſort de pendule qu'on auroit plié de même qu'elles le ſont.

En C il s'en voit une dont la queuë eſt diviſée en deux parties ; ce qui eſt ſi rare, qu'en plus de 36. années d'obſervations, je n'en ay vû que deux à la queuë fourchuë.

Celle qui eſt marquée D, a la bouche toute ronde de même que les précedentes, quoy qu'elles ne ſoient pas repreſentées de même. On a jugé à propos d'en varier ainſi les deſſeins, pour ſatisfaire ceux qui ſe perſuadent que ce ſont veritablement des ſerpens. Comme ces anguilles ſont d'une vivacité extraordinaire, & qu'elles ſe mouvent avec beaucoup de vîteſſe, on eſt obligé d'attendre qu'une bonne partie de la liqueur que l'on met ſur le concave de verre ſoit évaporée ; afin que leur mouvement ſoit conſiderablement rallenti, pour appercevoir leur bouche, & pluſieurs autres circonſtances particulieres qu'on remarque en ces petits poiſſons.

Le peu d'étenduë qu'à cette Planche ne m'a pas permis de les repreſenter de la groſſeur ni de la longueur que je les ay vûës & fait voir à des perſonnes qui en ont été effrayées. Je ne la détermine point icy cette groſſeur ; car cela dépend du foyer de la lentille dont on ſe ſert pour les obſerver.

Quelque attention que j'aye pû donner à obſerver la tête de ces anguilles pour en découvrir les yeux, je n'ay jamais pû en venir à bout, ſoit à cauſe de leur petiteſſe, ou à cauſe que la liqueur venant à s'épaiſſir & à ſe deſſécher, elle les couvre & y forme un voile qui ne permet pas qu'on les apperçoive au travers : je ſuis cependant tres-aſſuré qu'elles en ont ; car les détours qu'on leur voit faire pour s'éviter les unes les autres, ne permettent pas d'en douter un moment.

Si l'on veut conſerver les anguilles du vinaigre durant plus d'un an, il faut avoir ſoin de remplir la bouteille où elles ſont, à meſure que l'évaporation s'en fait.

Il eſt tres-rare de voir dans le bon vinaigre d'autres animaux mêlez avec les anguilles ; mais on en trouve aſſez ſouvent dans les vinaigres corrompus ou gâtez, & même en

b ij

tres-grand nombre, particulierement si l'on y mêle beaucoup d'eau commune, & qu'on le garde débouché durant plusieurs semaines; & ce qu'il y a de particulier à observer est, que si l'on ajoûte une tres-petite goutte de vinaigre ordinaire avec celuy où il se trouve de ces animaux, ceux-cy perissent en un instant, & les premieres anguilles subsistent, & même elles paroissent avoir plus de vigueur qu'elles n'en avoient auparavant.

On verra dans la suite de cette seconde Partie beaucoup d'autres anguilles, qui ont pris naissance dans des infusions toutes differentes les unes des autres, & qui sont d'une autre nature que celles du vinaigre.

Enfin nous avons encore observé que les anguilles du vinaigre subsistoient dans une infusion de poivre en grain mis dans de l'eau commune; & que les animaux de cette infusion meurent tout subitement étant mêlez avec quelque peu de vinaigre.

CHAPITRE II.

Du vinaigre commun.

LEs Vinaigriers font un si grand mystere de la maniere de faire le vinaigre, qu'ils ne l'enseignent à leurs apprentifs qu'au bout de sept années. Peut-être sera-t'on surpris de ce qu'ils en usent ainsi, lorsqu'on sçaura le peu de précaution qu'il faut prendre pour faire de bon vinaigre; car il suffit d'échauder un baril neuf avec de l'eau commune toute boüillante, & de mettre en sa place, le plus vîte qu'il est possible, le meilleur vin qu'on puisse avoir, & quelque peu de sel; car c'est principalement de la bonté du vin que dépend celle du vinaigre.

Il faut observer que le vinaigre se perfectionne mieux & se fait plus promptement quand le vaisseau est dans un lieu chaud & débouché, que lorsqu'on le tient bouché & dans un lieu froid: on aura ainsi au bout d'un mois ou deux d'excel-

lent vinaigre ; & pour l'entretenir il faudra avoir ſoin de remplir de bon vin le même vaiſſeau, à meſure que l'évaporation ou la conſommation s'en fera.

Si l'on veut que le vin s'aigriſſe promptement, il faut mettre le baril dans un lieu chaud, & y mêler de tems en tems la partie la plus claire de la lie du vin, tirée par expreſſion.

Monſieur Hombert, de l'Academie Royale des Sciences, a propoſé une maniere nouvelle de faire du vinaigre avec du bon vin, la plus prompte de toutes : elle conſiſte à attacher une bouteille, ayant environ les deux tiers de ſa capacité pleine de vin, à un cliquet de moulin : les frequentes ſecouſſes que la liqueur y reçoit briſent tellement ſes principes, & ce qui luy donnoit de la douceur, qu'elle devient en peu d'heures un vinaigre tres-fort, qui ſe garde long-tems dans le même état.

CHAPITRE III.

Des vinaigres compoſez.

TOus les vinaigres compoſez ſe préparent, en y ajoûtant ſeulement des roſes, ou des fleurs de ſureau, de l'ail, ou de l'eſtragon, &c. avec quelques clous de gerofles, & un peu de poivre, ſi on l'aime.

Cette compoſition donne de l'agrément à ces vinaigres ; mais elle ne les rend pas exempts de la production des anguilles ; tout au contraire, j'en ay plus trouvé dans ces ſortes de liqueurs compoſées, que dans le vinaigre commun.

CHAPITRE IV.

Nouvelles obſervations ſur les anguilles du vinaigre, faites avec le Microſcope repreſenté en la Planche ſeptiéme.

LE 25. Septembre 1710, ſur les neuf heures du ſoir, je mis une petite goutte de vinaigre, qui contenoit des anguilles, ſur un petit concave de verre qui ſert de porte-objet au Microſcope; & je m'aviſay de couvrir d'un petit verre plan des deux côtez le deſſus de ce concave, afin d'empêcher l'évaporation ſubite de la goutte de vinaigre; ce qui me réüſſit parfaitement.

1°. Il ſe forma d'abord au milieu du concave un petit cercle d'air extrémement rond, qui n'occupoit qu'une partie du petit enfoncement, dans lequel il ne parut aucune anguille.

2°. Toute la liqueur ſe plaça dans une eſpece de zone, compriſe entre la circonference de cet air, & celle qui termine le concave de verre: tous les animaux qu'on avoit mis dans le concave, ſe trouverent rangez dans cette zone comme dans une priſon.

3°. On apperçût le lendemain, dans la même zone, un grand nombre de petites boules de diverſes groſſeurs, qui paroiſſoient ombrées & éclairées avec tant d'art, que plus on les conſideroit, plus on les admiroit.

4°. La rondeur de ces boules, qui ſemblent être de fer ou d'acier, paroît ſi exacte, & leurs ſurfaces ſi polies, qu'il ſeroit impoſſible au plus habile ouvrier d'atteindre à une ſi grande juſteſſe.

Parmy toutes ces boules d'air, on en remarque qui ont bien un pouce apparent de diametre, d'autres un demi pouce; & encore de ſi petites, que l'on a de la peine à les bien diſtinguer.

Quoyque ces boules n'ayent d'elles-mêmes aucune agitation, on ne laiſſe pas d'y remarquer deux mouvemens parti-

culiers; celuy que la liqueur leur communique, & celuy qui leur eſt cauſé par les allées & venuës des anguilles qui les pouſſent en les rencontrant; ce qui produit un ſpectacle aſſez agréable, pour récompenſer du tems que l'on employe à les obſerver.

Les raiſons de toutes ces choſes m'ont paru ſi faciles à trouver, que je n'ay pas crû les devoir rapporter. J'omet auſſi pluſieurs circonſtances dont je ne dis rien, afin de donner aux ſpectateurs la ſatisfaction de les découvrir.

Il y a cependant une remarque à faire, qui peut, ce me ſemble, ſervir à décider une queſtion; qui eſt de ſçavoir, ſi les objets que nous voyons dans tous les Microſcopes en general, ſont apperçûs ſimplement par une lumiere refléchie de deſſus ces objets; comme il arrive dans les Microſcopes où l'on regarde les objets de haut en bas: ou ſi on les apperçoit dans les Microſcopes à liqueurs, par les rayons qui les ont traverſez ſimplement, & qui paſſant enſuite au travers de la lentille, vont peindre leurs images ſur la retine; ou enfin ſi on voit ces objets par des rayons de lumiere, qui n'arrivent à l'œil qu'aprés avoir traverſé les objets, s'être refléchis à la rencontre des parties ſolides de la lentille, & de celles des corps qui les renvoyent à l'œil.

Pour réſoudre ſolidement toutes ces queſtions, nous joindrons les experiences de ce Chapitre qui les regardent avec pluſieurs autres que l'on verra à la fin de cet Ouvrage, dans une Diſſertation particuliere.

En couvrant, comme j'ay dit, la petite goutte de vinaigre qui ſe met ſur le concave, on pourra facilement tranſporter le Microſcope ainſi préparé, & faire voir les boules d'air & les anguilles quand on voudra.

Si pendant que l'on tient le Microſcope, & que l'on obſerve ce qui s'y paſſe, on vient à le tourner rondement avec les doigts & avec aſſez de vîteſſe, les boules d'air ſeront apperçûës s'y mouvoir d'un ſens tout oppoſé; ce qui doit néceſſairement arriver: car puiſque le volume d'air qui compoſe chaque boule, eſt plus leger qu'un égal volume de la liqueur où elle nage, il s'enſuit que ces boules d'air doivent être repouſſées vers le lieu d'où ce mouvement circulaire les éloignoit,

Le tranſport qui ſe fait du Microſcope, ſert à multiplier le nombre des boules, en diminuant leur groſſeur par l'agitation qu'on leur donne.

Quand la chaleur diminuë ſenſiblement, on apperçoit que le mouvement des anguilles diminuë auſſi ; de ſorte que le matin elles ſe remuent plus difficilement que vers le reſte du jour ; ce qui vient ſans doute de la réſiſtance des parties du liquide où elles nagent, qui ſe trouvent differemment agitées en differentes parties du jour, & du plus ou du moins de ſoupleſſe des organes deſtinées au mouvement de ces petits animaux.

Quand j'obſerve dans ce Microſcope les petits globules qu'une pierre à fuſil vient d'arracher d'un morceau d'acier par un mouvement tres-violent, ils me paroiſſent clairs & lumineux du côté qui ſe preſente à mon œil, en les regardant à la lumiere d'une chandelle, quoyqu'ils ſoient d'eux-mêmes tres-opaques : d'où je conclus, que c'eſt par refléxion qu'on les voit ainſi dans ce Microſcope à liqueurs, de même qu'on les verroit avec un Microſcope à deux ou à trois verres, s'ils y étoient regardez comme on y regarde ordinairement les objets.

Pour comprendre comment ſe forment les globules d'air qui s'obſervent dans la petite portion de vinaigre où ſe trouvent les anguilles ; il ſuffira de remarquer que le verre plan, & le verre concave qui en eſt couvert, ne ſe touchent pas ſi parfaitement, qu'il ne s'échape d'entr'eux peu à peu quelques particules de la liqueur qui déterminent une égale quantité d'air à s'inſinuer dans le lieu qu'elles abandonnent ; & cet air ſe trouvant là également preſſé de toutes parts, eſt contraint de prendre la figure d'une ſphere, tres-petite d'abord, mais qui groſſit en peu de tems, par l'addition de pluſieurs autres qui ſe joignent enſemble, par le mouvement continuel des anguilles de ce vinaigre qui les pouſſent l'une contre l'autre, & qui ſouvent eſt aſſez conſiderable pour diſſiper les plus gros de ces globules.

Nous n'avançons rien icy qu'on ne puiſſe obſerver avec attention ; mais il eſt à propos d'avertir que toutes ces circonſtances ne ſe manifeſtent pas en un moment, & que ce qui ne

ſe

ſe peut appercevoir dans un tems, ſe pourra remarquer dans un autre.

L'eſpace du concave terminé par la petite circonference de la zone, ne contient ordinairement que de l'air, dont la figure eſt ronde en un ſens, & platte en un autre. Cet air s'y enferme naturellement, en y laiſſant tomber le petit verre plan des deux côtez, qui ſert de couvercle au concave ; & il ne ſe trouve dans le milieu ni liqueur, ni anguilles, ni boules ; parce que cet air, par ſa compreſſion, les en a éloignez pour en occuper la place ; d'où il ſuit que le vinaigre qui l'environne doit comprimer ce peu d'air, & l'arrondir comme on le voit.

Le jour ſuivant, à huit heures du matin, j'apperçûs deux ou trois de ces anguilles dont le mouvement n'étoit pas bien libre ; leurs corps paroiſſoient roides, comme ſi elles euſſent été attaquées d'une eſpece de paralyſie : enſuite la chaleur de ma main ayant un peu échauffé l'air qui les environnoit, & la liqueur où elles nageoient ; la maladie ſe diſſipa, elles reprirent vigueur, & enfin on leur remarqua autant de force & de ſoupleſſe qu'aux autres.

J'obſervay auſſi en même tems que le nombre des globules d'air s'y étoit multiplié durant la nuit, & qu'une anguille ayant ébranlé la plus groſſe, l'avoit diſſipée en des particules inviſibles. Une heure après il ſe produiſit dans la liqueur une fort groſſe boule d'air, qui comprimoit celuy qui étoit au milieu du concave, en s'y enfonçant à proportion de ſa groſſeur.

Le lendemain, environ à pareille heure, j'obſervai les anguilles qui ſe tranſportoient aſſez librement dans cette liqueur, accompagnées d'une vingtaine de tres-belles boules d'air, dont le tiers me ſembloit avoir environ ſept à huit lignes de diametre, & les autres plus petites, ne paroiſſant avoir au plus qu'une demie ligne chacune.

Pendant que l'on obſerve toutes ces choſes à la lumiere d'une bougie, ſi l'on frappe du doigt la partie exterieure du Microſcope qui porte les objets, on s'apperçoit ſouvent qu'il vient du dehors de tres-petites boules d'air qui s'introduiſent dans la zone, en ſe gliſſant entre le porte-objet & le petit

verre qui ſert à le couvrir ; d'où l'on doit conclure qu'il ſort néceſſairement de cette zone tout autant de liqueur qu'il y entre d'air groſſier. Mais ſi l'on donne encore quelques petits coups à la piece du Microſcope dont je viens de parler, pour y faire entrer davantage d'air, il n'y en entrera pas ; parce qu'alors tout eſt plein, & qu'il faut donner le tems à quelque nouvelle portion de la liqueur de s'évaporer, pour faire place à de nouvel air.

Le premier & le ſecond Octobre je m'apperçûs que la liqueur s'étoit épaiſſie, que l'eſpace circulaire du milieu du concave s'étoit augmenté, & que les anguilles avoient plus de difficulté à s'y mouvoir. Le troiſiéme, de cinq anguilles qu'il y avoit encore en vie le ſecond, il ne s'y en trouva plus qu'une ſeule vivante, qui mourut le même jour troiſiéme à midy. Ainſi ces animaux ont demeuré en vie neuf jours durant enfermez dans cette zone.

J'ay réïteré pluſieurs fois ces mêmes experiences, & j'y ay toujours remarqué à peu près les mêmes choſes. Toute la difference la plus remarquable que j'aye obſervée dans une même quantité de vinaigre, a été l'inégalité de tems qu'elle a employée à s'évaporer entierement ; une de ces gouttes ayant été évaporée en neuf jours, une autre en douze, & une autre en quinze, ſelon le degré de la chaleur de l'air, de la ſaiſon, & du lieu où étoit le Microſcope durant ces experiences.

CHAPITRE V.

Obſervations faites ſur pluſieurs ſortes d'infuſions de poivre en grain, mis à froid dans de l'eau commune.

IL y a au moins trente-huit ans que Monſieur Hartſoeker apporta, de Hollande en France, un nouveau Microſcope à liqueurs, monté d'une ſeule lentille ſoufflée, avec lequel il nous fit remarquer qu'en mettant infuſer à froid des grains de poivre noir dans de l'eau commune, on y voyoit

au bout de quelques jours un nombre innombrable de petits animaux, qui nous ont donné occaſion d'obſerver pluſieurs choſes tres-ſingulieres que nous n'avions point encore vûës.

Premierement, par le moyen de cette lentille de verre, on a vû des animaux de couleur d'or pâle, à peu près de la grandeur & de la figure qu'on les voit repreſentez dans cette Planche, aux endroits marquez B, D, K, H, O, R, L, Planche 2. avec de petites taches plus tranſparentes que le reſte de leur corps.

2°. La figure ovale & réguliere ſous laquelle ces animaux paroiſſent ordinairement, & leur mouvement rapide, ne permettent pas de déterminer d'abord l'endroit de leur corps où eſt la tête; mais avec un peu de patience on le découvre bien-tôt, par la direction ſuivant laquelle ils continuent à ſe mouvoir. D'ailleurs, la liqueur où ils nagent s'épaiſſiſſant inſenſiblement par l'évaporation de ſes parties les plus ſubtiles & les plus agitées, fait diminuer peu à peu la vîteſſe de ces poiſſons; & c'eſt alors que l'on peut à loiſir obſerver pluſieurs choſes, qui donnent occaſion d'admirer la ſageſſe du Créateur juſques dans la moindre partie des petites créatures que nous entreprenons de décrire.

3°. On s'apperçoit que deux des animaux de cette infuſion avançant directement, l'un de A en B, & l'autre de C en D s'en retournant, le premier ſuivant la ligne ponctuée B E, & le ſecond de D en F.

4°. J'ay quelquefois obſervé que deux de ces poiſſons; après avoir parcouru l'un la ligne G H, & l'autre la ligne I K, laiſſent entr'eux un eſpace trop petit pour permettre à un troiſiéme marqué L, de le traverſer; celuy-cy pris & ſerré contre l'un & l'autre, s'allonge en ſe courbant pour ſe ſauver vers M.

5°. Il y en a qui après avoir parcouru une ligne droite; comme N O, tournent ſi vîte autour du point O, où eſt la tête, que leur figure ovale ſemble devenir circulaire, après quoy ils s'élancent vers p avec une promptitude extrême. Et l'on en remarque auſſi d'autres, qui après avoir parcouru une ligne droite, ſemblable à Q R, tournent ſur leur centre de grandeur & de peſanteur marqué R, traçant ainſi un grand

nombre de circonferences de cercles concentriques les unes aux autres ; puis s'élançant avec une vîtesse extraordinaire, on les voit parcourir une autre ligne droite marquée S T. Voilà ce que nous avons remarqué de plus considerable dans la premiere infusion, dans laquelle il ne paroissoit que des *Ovales* ; c'est ainsi que je nomme ces poissons : & voicy ce qui nous a paru dans une seconde, observée avec des lentilles travaillées à la main, & taillées au tour, qui est la maniere de les faire beaucoup plus parfaites que les précedentes.

La premiere figure represente un poisson, que je nomme la *Poule hupée*, dont la tête est garnie de poil au lieu de plumes : son mouvement le plus ordinaire étoit circulaire. Ce poisson est le seul que j'aye vû dans cette infusion, & je n'en ay jamais apperçû de pareil dans aucune de celles que j'ay préparées.

La seconde espece de poisson, representé à l'endroit marqué 2, sont des animaux que je nomme *Cornemuses* argentées, & dont je parleray dans la suite de cette Histoire.

La troisiéme, est une grosse araignée aquatique, dont la bouche s'ouvre assez grande pour engloutir les cornemuses précedentes.

La quatriéme figure represente deux de ces araignées accouplées, qui tournent ensemble sur leur centre commun de pesanteur.

La cinquiéme figure en represente deux autres aussi accouplées, mais dont le nager s'execute en ligne droite. Nous décrirons plus exactement ces grosses araignées aquatiques vers la fin de cette seconde Partie, en parlant des animaux que nous avons vûs dans une infusion d'un peu d'écorce de bois de chêne, qui porte le gland.

La sixiéme figure represente un autre poisson, dont le corps est à peu près semblable à la navette d'un Tisserand. Il a de grands poils au derriere qui luy servent de nageoires.

Enfin au-dessous de l'endroit marqué sept, on y a representé une fourmiliere de petits insectes de diverses figures & grosseurs qui viennent de naître, & qui servent ordinairement de nourriture aux plus gros.

Du poivre blanc.

LE poivre blanc en grain mis en infuſion, produira des poiſſons d'une grande beauté ; mais ce ne ſera peut-être pas en auſſi peu de jours que les précedens. Les groſſes cornemuſes de cette infuſion avancent & reculent preſque également pendant leur nager. Peu de tems avant que la liqueur où on les voit ſoit totalement deſſéchée, on s'apperçoit qu'elles deviennent plus groſſes qu'elles n'étoient auparavant ; & dans ce moment-là on a le plaiſir d'obſerver un bon nombre d'œufs dans leurs corps ; & de remarquer qu'un moment après qu'elle eſt deſſéchée, leurs corps changent tellement de forme, qu'ils ne paroiſſent plus que comme une maſſe confuſe, à cauſe de leur grande délicateſſe.

Du poivre long.

UNe infuſion de poivre long mis en entier dans de l'eau commune, ne donnera pas moins de ſatisfaction que les deux précedentes ; car dans les premiers mois cette infuſion eſt ſi nette, qu'elle facilite le moyen de découvrir juſqu'aux parties interieures des poiſſons que l'on y trouve en grande quantité : & ce qui merite quelque attention, eſt que cette infuſion, ni les deux précedentes, n'exalent aucune mauvaiſe odeur, quoy qu'elles ſoient conſervées en experience durant plus de quatorze mois. On trouve quelquefois dans cette infuſion, un peu vieillie, des animaux que nous avons nommez *Chenilles aquatiques* ; & de nouvelles anguilles, plus groſſes & plus courtes que celles qui ſe voyent ordinairement dans le vinaigre ; mais elles n'y vivent pas ſi long-tems à beaucoup prés.

En conſervant ces infuſions le plus de tems qu'il eſt poſſible, & en les réïterant dans des ſaiſons & dans des années differentes, on apperçoit des animaux differens de ceux qui ſont repreſentez dans cette Planche.

Nous finirons ce Chapitre, en avertiſſant que ces poiſſons ſoutiennent les rigueurs d'un hyver tres-rude & tres-long,

& qu'ils se conservent en vie au-dessous d'une glace d'environ deux lignes d'épaisseur ; car à mesure que la surface de l'eau du vaisseau se géle, les poissons s'y enfoncent davantage. Mais si vous faites fondre cette glace, & que vous gardiez cette infusion, vous y verrez ces poissons, au bout d'environ quinze jours d'un tems plus doux, en beaucoup plus grand nombre qu'ils n'y étoient avant que cette eau fut gelée.

CHAPITRE VI.

Observations faites durant une année entiere, de ce qui s'est trouvé dans une infusion à froid de sené.

ENviron le 15. Juillet de l'année 1710. je mis infuser à froid une bonne pincée de feüilles, de queuës & de branches de sené ; & je m'apperçûs qu'au bout d'environ huit jours il y avoit dans cette liqueur quantité de tres-petits corps longuets, separez les uns des autres sans se toucher ; & sans avoir d'autre mouvement que celuy qu'ils pouvoient avoir receu de la liqueur où ils étoient. Et par plusieurs observations que j'en ay faites à diverses reprises, je me suis persuadé que ces corpuscules, que vous voyez en A de la troisiéme Planche, n'étoient autre chose que de tres-petites parcelles de l'écorce des branches du sené, & non pas les parties des sels contenuës dans ces choses, comme le vouloit un Medecin à qui je les fis voir ; parce que les sels dissous dans autant d'eau qu'il y en avoit, ne s'y font point appercevoir, non plus que les parties de l'air qui sont éparses dans cette infusion.

Tous ces petits corps étant devenus les uns plus pesans ; par l'union de quelques autres ; les autres plus legers, par leur division ; ceux-là se précipiterent au fond de la caraffe, & ceux-cy monterent à la surface de l'eau, pour y composer une pellicule épaisse, molle & opaque, sur laquelle je vis paroître de petits vers blancs, assez sensibles aux yeux nuds.

Environ huit jours après ces vers difparurent, & je fus affez furpris d'en appercevoir de nouveaux, beaucoup plus petits que les premiers : ces petits vers vivoient dans la liqueur, & nageoient un peu au-deffous de fa furface; j'en mis un dans un petit Microfcope monté d'une feule lentille de deux lignes de foyer : fa longueur m'y parut d'environ neuf lignes : il étoit compofé en partie d'onze petits anneaux : fa tête étoit ronde à fon extrémité; & par l'autre bout fon corps fe terminoit quelquefois par un plan perpendiculaire à fa longueur ; & d'autres fois, par trois petites éminences arrondies ; de maniere que celle du milieu avoit quelque peu plus de faillie que les deux autres.

Il paroiffoit au-deffous de fa peau un filet tres-blanc, & ployé; de maniere que fes deux bouts finiffoient vers la queuë, d'où ils s'étendoient en droite ligne vers la tête, où ce fil étoit recourbé.

I M, reprefente le ver, dont la tête eft en I, & le derriere en M. Planche 3.

Le fil dont je viens de parler eft vû en N O; & l'on remarquoit qu'il s'allongeoit & fe raccourciffoit alternativement ; & par ces divers mouvemens il obligeoit les anneaux de ce ver à s'approcher, ou à s'éloigner un peu les uns des autres.

Une partie de la liqueur s'étant évaporée pendant plufieurs jours, j'augmentay le refte par l'addition d'une eau commune, ce qui détrempa tellement la pellicule qui s'étoit formée à la furface de l'infufion, qu'elle fe précipita quelque tems après au fond du vaiffeau, ce qui rendit l'infufion plus belle & plus tranfparente qu'elle n'étoit auparavant ; & me donna en même tems occafion d'obferver un nouveau fpectacle, dont je vais vous parler. Trois fortes de nouveaux poiffons fe faifoient appercevoir dans la moindre petite goutte que je mettois au Microfcope ; fçavoir de tres-petits, des moyens & des gros. D, E, F, en font les Figures. Les gros reffembloient affez à une Cornemufe, chacun d'eux ayant la tête recourbée, comme vous voyez en F; j'y remarquois auffi deux mouvemens differens, l'un droit & l'autre circulaire ; celuy-cy fe faifoit pour l'ordinaire de F par P &

Q. Ces deux mouvemens qui se succedoient l'un à l'autre étoient assez lents pour être facilement observez.

Dans la suite, je découvris une sixiéme sorte de poisson, mais en petite quantité, dont la figure se voit en G: ce poisson ayant assez de ressemblance à une carpe, peut être ainsi nommé. Son mouvement s'executoit en serpentant, décrivant une ligne courbe à peu près semblable à la ligne a b c d, pour arriver de a en r, où est la tête.

Après plusieurs jours, il parut un autre poisson assez semblable au corbillon d'un Oublieur; sans qu'on pût deviner de quel côté étoit la tête, sinon lorsqu'on le voyoit se mouvoir; parce que les extrémitez de sa longueur étoient en tout semblables en apparence.

J'ay vûs ces poissons sous les formes representées au-dessous des lettres K, L: le mouvement de ces animaux s'execute par ondulation, & assez lentement.

Tous ces animaux, excepté les vers, mouroient dés que j'enfonçois dans la goutte de liqueur qui les contenoit, le bout d'une plume trempé dans du vinaigre; & cette infusion de sené ne faisoit pas sur les anguilles du vinaigre le même effet que ce vinaigre faisoit sur celles de l'infusion.

Les animaux de forme ovale, & de moyenne grosseur, s'accouplent comme les hannetons, & étant ainsi attachez, le plus fort entraîne le plus foible d'une vîtesse surprenante.

Ces poissons ne s'éloignent pas du haut de ces liqueurs, parce qu'ils y respirent de tems en tems un air qui leur convient, & y trouvent plus de nourriture qu'en aucun autre endroit du vaisseau où ils sont; & s'ils descendent en bas, ils n'y restent pas long-tems. On ne peut pas douter de ce que j'avance à l'égard des anguilles du vinaigre; & on le peut tres-facilement observer dans la bouteille où elles sont, avec une loupe.

Les animaux des autres liqueurs étant trop petits pour être ainsi apperçûs; je me suis avisé d'y enfoncer un petit tuyau capillaire, ayant pris auparavant la précaution d'en boucher le haut avec le pouce, que j'en ôtois lorsque le bout inferieur étoit au fond du vaisseau; je retirois ensuite ce tuyau, aprés l'avoir rebouché, & je mettois sur le porte-objet

objet beaucoup plus de cette liqueur qu'à l'ordinaire, prise au fond du vaisseau qui la contenoit; cependant je ne voyois dans cette grosse goutte que quatre ou cinq animaux, au lieu que si j'eusse pris autant de la même liqueur au haut du vaisseau, j'en eusse trouvé peut-être cent fois davantage.

L'eau tiéde ne fait pas mourir en hyver les poissons dont nous parlons, au contraire ils semblent s'y mouvoir beaucoup plus librement qu'auparavant; mais lorsqu'elle est un peu plus chaude, ils y perissent tous. Il y a donc un certain degré de chaleur qui les fait vivre, & un autre un peu plus fort qui les tuë.

Le 30. Janvier 1711. j'observay une autre sorte de poissons, qui vinrent en assez grand nombre dans cette infusion de sené, dont le nager me parut singulier; car en avançant directement, ils se balançoient à droit & à gauche, de même que feroit un petit bateau conduit par le fil d'une eau courante, pendant qu'un homme debout au milieu de ce bateau, panchant tantôt d'un côté & tantôt d'un autre, le feroit balancer pour se divertir.

J'ajoûtay de l'eau commune pour la seiziéme fois, afin d'en augmenter le volume, & d'en diminuer l'épaississement, & fournir aussi en même tems quelque nouvelle substance aux animaux qui s'y trouvoient.

Je vis le lendemain que ces animaux s'y mouvoient beaucoup plus vîte qu'auparavant, & sans s'y balancer; dont la raison ne peut, ce me semble, être attribuée qu'au plus de facilité que ces poissons trouvoient à diviser ce liquide.

Ce même jour-là, & le premier Février, je remarquay d'autres insectes si petits, & se mouvans si vîte, que je n'en pûs découvrir la figure. Peu de jours après j'y découvris d'autres poissons semblables à celuy qu'on voit en H: la tête finissoit presque en pointe, & servoit de gouvernail à tout le reste de son corps, qui s'accordoit parfaitement avec elle, en avançant assez lentement, pour donner la facilité d'observer plusieurs choses qui seroient trop longues à décrire.

Enfin les grandes chaleurs qui survinrent sur la fin du mois de Juillet 1711, durant trois ou quatre jours, firent mourir presque tous les animaux de cette infusion, qui avoit été une

année entiere en experience ; & dans le tems que je la voulus ſupprimer, je m'aviſay d'en prendre encore une fois, & de la mettre ſur le porte-objet du Microſcope dont je m'étois ſervi, afin de voir s'il y auroit quelque nouveauté ; & j'y apperçûs un ver composé en partie de treize à quatorze anneaux, ſemblables chacun à un bourlet.

A B, eſt ſa longueur apparente. A, en eſt la bouche toute ronde, d'autour de laquelle partent trois filets qui s'étendent d'une extrémité à l'autre, & qui en s'enflant & ſe déſenflant font rentrer les anneaux les uns dans les autres, des extrémitez a & b, vers le milieu D ; & par cette méchanique rallongent & raccourciſſent ſucceſſivement le corps de cet inſecte. C, marque ſa longueur vûë aux yeux nuds.

CHAPITRE VII.

De l'eau qui ſe trouve dans les huiſtres à l'écaille, & de ce que l'on y apperçoit en peu de jours ou d'heures, après être ouvertes.

ON ſçait qu'il y a des huiſtres de diverſes eſpeces, tres-differentes les unes des autres, tant par le goût que par la grandeur, & la compoſition du corps de ces animaux.

L'huiſtre dont nous parlons icy eſt un poiſſon de mer qui ſe nourrit entre deux écailles ; il eſt fort eſtimé d'un grand nombre de perſonnes, & on le mange tout en vie.

Ces huiſtres jettent leur fray au mois de May, c'eſt-à-dire leurs œufs, d'où les petites huiſtres doivent ſortir. On a remarqué qu'au bout de vingt-quatre heures ces petites huiſtres avoient de l'écaille, & que les meres ſont malades aprés avoir bien frayé, n'étant bien guéries que vers la fin du mois d'Aouſt ſuivant.

Monſieur Mery fameux Anatomiſte, premier Chirurgien de l'Hôtel-Dieu de cette Ville, & Penſionnaire de l'Académie Royale des Sciences, lut en public un diſcours tres-curieux ſur les huiſtres des étangs ; mais il manque à ce diſcours

les curieuſes obſervations que nous avons faites ſur ces ſortes d'huiſtres ou moules des étangs, ou de celles qu'on trouve dans les canaux de Seaux & ailleurs.

Samedy 15. Novembre 1710. à midy, je fis ouvrir une demie douzaine d'huiſtres, j'en mis l'eau dans un petit verre à boire, & je l'y laiſſay repoſer environ deux heures : cette eau me parut trouble & d'une couleur de perle fine, ou tirant plutôt ſur la couleur du petit lait, & un peu plus épaiſſe, portant au nez une odeur de marée. J'en obſervay une tres-petite goutte avec differens Microſcopes à liqueurs, & je n'y apperçûs rien de particulier qui merite d'être dit.

Je n'y découvris rien le ſecond ni le troiſiéme jour ; mais le quatriéme au ſoir je commençay d'y voir une aſſez grande quantité de petites huiſtres, belles, tranſparentes, & dont quelques-unes n'avoient pas un mouvement trop rapide pour m'empêcher de voir la tête & le reſte du corps. Leur groſſeur me parut avoir fait un grand progrès en peu de tems, par rapport à celle des animaux que j'ay obſervez dans d'autres liqueurs. En voicy une repreſentée en a b c d, dont a eſt la tête, & b c d le reſte du corps, qui n'étoit pas également tranſparent. La forme de leur corps eſt changeante ; on les voit ſe plier & replier en differentes façons : leur mouvement eſt quelquefois direct, & d'autres fois circulaire : on les apperçoit ſouvent s'entre-choquer, & par-là interrompre leur courſe, tres-vîte en pluſieurs, & moins en d'autres. Planche 4. Figure 4.

Ces animaux étoient aſſez gros dés le quatriéme jour de leur naiſſance, pour ſe faire voir avec un Microſcope à trois verres d'environ quatre pouces de hauteur, dont la lentille objective n'avoit pas moins de cinq lignes de foyer.

Le cinquiéme & le ſixiéme jour, je vis pluſieurs de ces animaux parfaitement en repos, de ſorte que je les crus morts ; mais en continuant de les obſerver, je fus détrompé, les voyant nager avec beaucoup de vîteſſe, les uns allans d'un côté & les autres d'un autre, s'entre-frolant ſouvent, & s'arrêtant quelquefois pour un moment l'un contre l'autre ; puis étant écartez par d'autres qui faiſoient effort pour paſſer entr'eux, & changeoient de figure ſuivant leur maniere de ſe rencontrer, ou le retreciſſement du lieu qu'ils vouloient traverſer.

On s'apperçoit quelquefois qu'une de ces petites huiſtres paſſe ſur un groupe de pluſieurs autres ſans les ébranler ; ce qui marque qu'elles n'en ſont pas touchées , & qu'elles ſont environnées d'aſſez de liqueur pour faciliter le mouvement de celles qui nagent par-deſſus.

Ces animaux s'allongent & ſe raccourciſſent conſiderablement ; & même ils s'accouplent , comme on le peut voir en a & c : ils ſe mouvent ainſi accouplez d'a vers b, & de c vers d , long-tems avant qu'ils ſe ſeparent ; de ſorte que le plus fort entraîne le plus foible.

Ces petits animaux tournent beaucoup plus lentement que ne font ceux de l'infuſion du poivre en grains, ni même ceux du ſené.

Le mouvement circulaire des petites huiſtres s'execute en deux façons toutes differentes ; la premiere les fait voir tournant autour de leur centre ; & la ſeconde les fait paroître tourner comme ſur un point qui ſeroit vers l'extrémité de leur tête.

L'eau de ces poiſſons ſe trouve au bout de quelques jours d'une odeur inſupportable , mais dans la ſuite elle s'adoucit conſiderablement ; & parce qu'elle eſt ſalée naturellement , il y avoit lieu de croire qu'elle ſe conſerveroit long-tems ; ce qui n'eſt pas arrivé. L'experience nous a appris que la ſeule odeur du vinaigre eſt un poiſon qui tuë ces petites huiſtres.

Quoyqu'on ne puiſſe pas voir les yeux de ces animaux , on peut neanmoins aſſurer qu'ils apperçoivent les objets qui ſe preſentent à eux ; puiſqu'on remarque certainement qu'ils s'en écartent en ſe mouvant , & qu'ils font des détours tres-frequens pour les éviter.

Le 21. je mis une groſſe goutte de cette liqueur ſur le porte-objet du Microſcope , que je portay & rapportay de fort loin durant cinq heures au moins, qu'elle employa à s'évaporer entierement ; pendant ce tems-là les petites huiſtres qu'elle contenoit firent l'admiration de pluſieurs perſonnes à qui je les montray.

Le 22. au ſoir je trouvay cette eau plus tranſparente qu'elle n'avoit été cy-devant , quoy qu'elle fut devenuë plus épaiſſe , du moins elle ne s'étendoit pas ſi facilement ſur le

porte-objet, qu'elle faiſoit auparavant.

Je m'apperçûs d'ailleurs que la même eau avoit perduë cette odeur forte & deſagréable qui s'y faiſoit ſentir dés les premiers jours ; que les animaux s'y étoient conſiderablement multipliez ; qu'ils ſembloient être devenus un peu plus gros qu'ils n'étoient ; & enfin il ne m'en parut plus d'accouplez.

Le lendemain 23. j'obſervay encore les mêmes choſes, à quoy l'on peut ajoûter ces particularitez.

Que juſque icy je n'ay vû dans cette eau qu'une ſeule eſpece d'animaux, preſque tous d'une même figure, & d'une groſſeur aſſez uniforme, ſe mouvans tous d'une maniere aſſez égale.

Comme il eſt difficile de porter, avec le plus petit bout d'une plume à écrire, un peu de l'eau où nagent ces poiſſons, ſans enlever en même tems quelque petite portion d'une legere pellicule qui ſe forme dés le commencement ſur cette liqueur ; on eſt tout étonné de voir que cette parcelle, preſque inſenſible aux yeux nuds, paroît dans le Microſcope d'une étenduë extraordinaire ; en ſorte qu'elle reſſemble à une groſſe maſſe de rocher, chargée d'une multitude extraordinaire de petites creatures.

Ces animaux ſemblent ſe plaire davantage, & trouver ſous cette pellicule une nourriture plus propre à leur temperament que par tout ailleurs, vû le nombre prodigieux que nous y appercevons : ils y fourmillent les uns ſur les autres, de maniere que cet endroit-là devient beaucoup moins tranſparent que les autres.

Le Samedy 13. Decembre 1710. il étoit reſté tres-peu d'huiſtres vivantes, & même elles parurent diminuées de groſſeur. Le 16. je n'y en remarquay aucune ; ainſi mes premieres obſervations ſur ces ſortes d'animaux-là, finirent.

Mais ayant prévû ce qui devoit arriver, j'avois déja mis en experience de nouvelle eau ; deux jours aprés j'apperçûs de ces animaux tout naiſſans, qui paroiſſoient avoir environ deux lignes de longueur & une ligne de largeur.

Le 16. & le 17. j'apperçûs ces huiſtres en plus grand nombre, & j'en vis quelques-unes ſous la forme d'un huit de chiffre : c'étoient apparemment deux petites huiſtres accouplées,

L'augmentation du froid, l'épaississement survenu à cette eau par l'évaporation des parties les plus subtiles & les plus agitées, joint à cela le défaut de nourriture, les fit enfin perir environ le 30. Janvier 1711.

Dés ce même jour je recommençay pour la troisiéme fois une semblable experience; mais depuis ce jour-là jusqu'au 22. Février, je n'y apperçûs rien que je n'y eusse déja remarqué. En voyant dans la moindre goutte de cette eau un si grand nombre de ces poissons, qu'il y en avoit, je ne pûs distinguer les uns d'avec les autres, tant cette eau en étoit obscurcie; c'est pourquoy, afin de l'éclaircir, j'y ajoûtay un peu d'eau commune, & j'observay que ce mélange avoit fait diminuer subitement la longueur des huistres, en les rendant presque toutes rondes; mais dans la suite elles reprirent leur forme ovale & leur longueur ordinaire. Durant l'espace de deux heures consecutives, j'appliquois sept ou huit fois de l'eau fraîche sur le porte-objet, à mesure que la liqueur s'évaporoit; & j'aurois même pû continuer plus long-tems ce manége, si j'eusse voulu prolonger davantage la vie de ces animaux: ainsi cette eau commune, bien loin de leur nuire, les accommode fort. Il n'en est pas de même du mélange d'une tres-petite goutte d'eau de l'infusion du sené avec celle des huistres, qui les fait mourir en un instant.

On remarque encore que le mélange de l'eau commune avec celle des petites huistres, les fait devenir plus grosses & plus claires, pourvû qu'elle ne soit ni trop froide ni trop chaude, ce qui les tuëroit, ou du moins arrêteroit leur mouvement pour un tems.

Dans une semblable experience que je fis ensuite, j'apperçûs une chose singuliere que je n'avois pas encore observée; sçavoir, deux cornes mobiles à la tête de chacun de ces animaux, lesquelles formoient ensemble un croissant, comme on le voit en e, & ces cornes mobiles paroissoient aussi quelquefois comme on les voit en d; mais elles étoient si courtes en de certains tems, qu'on avoit de la peine à les voir.

Je m'avisay ensuite d'ajoûter à une goutte de l'eau des huistres une tres-petite goutte de vin avec le bout d'une

plume, & je vis expirer ces petits animaux preſque ſur le champ, & à meſure que le vin ſe mêloit avec cette eau, ou que les animaux paſſoient de l'eau dans le vin.

Le 19. Mars, dans un tems aſſez chaud, je remarquay que les petites huiſtres ſe manifeſtoient dans leur eau beaucoup plutôt qu'elles n'avoient fait dans les tems moins chauds; & que quelques heures auparavant on y avoit remarqué un grand nombre de petits corps ronds & tranſparens, qui peuvent paſſer pour les œufs de ces poiſſons.

Le 29. du même mois, il paroiſſoit dans cette eau tres-peu de petites huiſtres; & quoy qu'elles fuſſent devenuës bien maigres, elles ne laiſſoient pas de ſe mouvoir tres-vîte: ce fut pour lors que l'on ceſſa de vendre dans Paris des huiſtres à l'écaille, à cauſe qu'elles n'étoient plus bonnes à manger.

Le 15. Juillet 1711. à midy, je mis dans un vaiſſeau de verre de l'eau de ſix à ſept huiſtres; & le 16. à ſept heures du ſoir j'y obſervay une bonne quantité de petites huiſtres nageant dans cette eau, quoyque le vaiſſeau eût été bouché; ce qui ſemble donner occaſion de penſer que ces animaux ſont produits des œufs des huiſtres mêmes, & qu'ils ne viennent pas des autres animaux qui volent ou nagent dans l'air que nous reſpirons.

Le 22, je vis dans cette même eau de deux ſortes de nouveaux animaux, dont pluſieurs me parurent de la figure & groſſeur qu'il paroît en f, s'allongeant & ſe raccourciſſant alternativement d'un inſtant à l'autre. Ceux de la ſeconde eſpece, dont un ſeul eſt vû en g, ſe mouvoient aſſez lentement pour qu'on pût remarquer en eux les particularitez ſuivantes.

On apperçoit vers la tête & au derriere un mouvement d'ondulation, dans une matiere blanche, lumineuſe & tranſparente, laquelle étant bien conſiderée, on s'apperçoit qu'elle eſt cauſée par les pattes, tant du devant que du derriere de ces animaux. On les voit marcher ſur le porte-objet du Microſcope, ſans ſortir de l'eau où ils ont pris naiſſance; & l'on remarque que les pattes de derriere ſont plus longues que celles du devant. J'ay auſſi vû dans le même tems, &

dans la même goutte de cette liqueur, d'autres animaux un peu plus gros que les anguilles du vinaigre, ayant la partie du derriere de leur corps assez grosse & arrondie, & la tête un peu plus longue que celle de ces anguilles : leur corps étoit moins transparent & plus court de beaucoup que celuy des anguilles du vinaigre. Ces nouveaux poissons, dont on voit la figure en h, changent de figure à tout momens.

Leur nager s'execute assez lentement ; le mouvement de leur tête, qui est plus menuë de beaucoup que le reste de leur corps, approche assez de celuy que j'ay remarqué dans les vers de quelques autres liqueurs ; ils l'avancent & la retirent alternativement, ils la portent à droit & à gauche, s'arrêtant tres-souvent, comme s'ils avoient peur de quelque objet qui traverseroit leur route.

Le 22. Aoust je fus surpris de ne trouver plus d'huistres dans cette eau, ni même aucun des animaux de figure ovale ; & ce ne fut pas manque de nourriture, puisque les dernieres anguilles dont je viens de parler y vivoient. Enfin le 3. Septembre, à peine pouvoit-on voir deux animaux dans cette liqueur ; ce qui me la fit abandonner.

Le 21. Octobre 1711. nous vîmes dans de nouvelle eau d'huistres, jusqu'au 4. Novembre, les animaux representez en i, l, m, n, o, p, q.

La figure m represente un ver, dont la tête est en pointe, & le derriere rond. Celles qui sont en n & o, representent deux de ces vers qui se tiennent ensemble de deux façons differentes, le plus fort entraînant le plus foible.

En p, vous en voyez un plus gros d'un autre genre, & d'une autre figure. Enfin au-dessous de la lettre q, il y en a deux plus petits qui se tiennent par le bec, allant ainsi nageant de compagnie.

CHAP.

CHAPITRE VIII.

Des infusions d'œillets mis dans de l'eau commune, chaude & froide.

LE 14. Juillet je mis infuser à froid dans de l'eau commune des œillets qui n'étoient pas encore épanoüis ; & le 19. je commençay d'appercevoir de tres-petits animaux nageant dans l'eau, dont voicy à peu prés la grosseur & la figure apparente, marquée en B, Planche 4. Figure 2.

Quelques personnes prennent ordinairement les animaux de cette grosseur pour de petites mouches ; mais c'est une erreur qui provient ou de ce que l'extréme petitesse de ces insectes rend leur espece équivoque à nos yeux, ou de la mauvaise figure de la lentille du Microscope, défaut tres-commun aux lentilles soufflées ; ou de ce qu'elle est mal placée entre les diaphragmes ; ou enfin de ce que l'objet n'est pas placé au point de vûë où il faudroit qu'il fut.

Le 20. je commençay d'en appercevoir de tres-gros ; mais en petit nombre, ayant le corps bien transparent, & parsemé de petites taches, comme on le peut remarquer en A.

Le 22. les gros me parurent plus beaux & plus longs qu'auparavant ; ils se mouvoient aussi d'une maniere nouvelle.

Le 29. j'apperçûs sur la surface de la liqueur de petits vers blancs ; & un peu au-dessous de cette même surface, j'y vis un nombre extraordinaire de tres-petits animaux.

Le 11. Aoust, la masse composée d'une multitude presque infinie de ces animaux, étoit si épaisse & si fourmillante, qu'à peine y pouvoit-on discerner leur figure ; & l'on remarquoit parmy eux quelques gros vers sous la forme representée en C.

Le 20. du même mois j'apperçûs dans une goutte de cette infusion des especes d'anguilles, dont on voit la representation en E & en F, plus grosses & plus courtes que celles qu'on voit ordinairement dans le vinaigre ; ce que je n'avois point

encore vû dans aucune des infusions ou liqueurs préceden-tes : leur mouvement s'executoit à peu prés comme celuy des serpens du vinaigre. Ces nouvelles anguilles paroissent tres-blanches vers la tête & vers la queuë, qu'elles ont tres-courtes; tout le reste de leur corps étant d'une couleur d'ambre plus ou moins claire, selon le temps qu'elles avoient demeurées dans cette infusion.

Le 22. j'observay un petit ver blanc, que j'avois pris en la surface de cette eau, dont le corps étoit assez transparent pour me donner la facilité d'observer au dedans de son corps plusieurs filets blancs, dont les deux du milieu qui étoient un peu écartez l'un de l'autre, & paralleles entr'eux, se recourboient vers la tête pour s'unir là, & s'étendre jusqu'à l'extrémité posterieure du corps, au-delà de laquelle ils paroissoient avancer de plus d'une ligne.

De chacun de ces filets droit & gauche, partoient de distance en distance d'autres filets blancs qui descendoient de haut en bas, & du dos vers le ventre, où ils pouvoient se joindre.

Ces animaux ont aussi à la tête deux petits points noirs, qui sont de veritables yeux; puisqu'ils se détournent à la presence de quelques petits objets dont on se sert pour traverser leur chemin.

Au devant de la tête on remarque deux especes de crochets, dont ils se servent comme d'appuis pour avancer leur corps, par un mouvement semblable à celuy des vers que nous voyons ordinairement se traîner sur la terre; car ils n'ont point de pieds, leur corps étant distinguez par plusieurs anneaux, qui s'approchent & s'éloignent successivement les uns des autres, par la contraction des fibres dont nous avons parlé. Vous voyez la figure de cet insecte en D.

Le dernier Aoust 1711. je vis au moins une douzaine d'anguilles dans une tres-petite goutte de cette infusion, bien grosses & bien courtes, en comparaison de celles du vinaigre, dont le mêlange les fait mourir en moins de trois minutes. Et ce qu'il y a de particulier est, que la tête de ces nouvelles anguilles devient immobile, pendant que le reste de leur corps se meut encore.

L'effet de ce mêlange prouve, ce me ſemble aſſez, que ces dernieres anguilles ſont d'une eſpece differente de celles du vinaigre ; & ſi cela ne ſuffit pas, voicy dequoy convaincre parfaitement de ce que j'avance.

Prenez deux Microſcopes montez de lentilles d'un même foyer, afin de découvrir par la vûë les differences qui ſuivent.

1°. Les anguilles du vinaigre ſont beaucoup plus longues, plus dégagées, plus blanches, & plus également tranſparentes dans toute leur longueur, que celles qui ſe trouvent dans l'infuſion d'œillets.

2°. Celles du vinaigre figurent ſouvent pluſieurs enſemble, de maniere qu'elles accordent les mouvemens de leur corps avec tant de juſteſſe, que les convexitez & les concavitez des unes ſe trouvent répondre exactement à celles des autres ; ce qui n'arrive pas aux anguilles de l'infuſion dont je parle.

3°. La tête des anguilles du vinaigre n'eſt pas ſi groſſe que celle de l'infuſion d'œillets.

4°. Ces mêmes têtes different encore en autres choſes.

5°. Le mouvement de celles du vinaigre paroît plus libre & plus aiſé, que celuy des anguilles de l'infuſion d'œillets.

6°. Celles du vinaigre ne ſont jamais entierement en repos, qu'elles ne ſoient mortes ; & j'en ay vû des autres y demeurer comme immobiles durant plus d'un quart-d'heure, & ſe remettre enſuite dans un mouvement aſſez prompt, qui durera autant de tems que la goutte de liqueur où elles nageoient demeurera à ſe deſſécher.

7°. Ces anguilles ſont beaucoup plus ſenſibles au froid que celles du vinaigre ; car quand les matinées ſont fraîches on a de la peine d'en prendre ; & pour en trouver je fus obligé de mettre au Soleil le vaiſſeau qui contenoit l'infuſion où elles étoient, & de luy laiſſer environ un quart-d'heure ; aprés quoy j'en trouvay deux tout à la fois.

Enfin lorſque les anguilles du vinaigre ſont mortes depuis quelque tems, leur corps paroît d'ordinaire comme pluſieurs noyaux d'olives, enfilez à peu prés comme des grains de chapelets ; au lieu que le corps des autres anguilles m'a toujours paru en ſon entier.

Le 14. Juillet je mis infuser dans de l'eau boüillante une portion des mêmes œillets dont je viens de parler, dans laquelle je ne commençay à découvrir des animaux que le 25. du même mois ; ils étoient tres-petits & en fort grand nombre.

Le 29. je ne trouvay plus de petits insectes ; mais je vis des vers assez sensibles aux yeux nuds, rampans sur la surface de l'infusion, où il s'étoit formé une épaisseur d'une matiere molle, mais assez ferme pour les soutenir. La grande chaleur qu'il avoit fait durant quatre jours, fut la cause de la mort des premiers insectes, ce qui m'obligea à supprimer cette infusion, beaucoup plutôt que je n'aurois fait sans cela.

CHAPITRE IX.

D'une infusion à froid d'un bouquet composé de roses, d'œillets & de jassemin.

LE 11. May 1711. je mis infuser à froid, dans de l'eau commune, un bouquet de roses, d'œillets & de jassemin, coupé par morceaux, pour le faire entrer plus facilement dans un petit vaisseau, tenant environ demi-septier, mesure de Paris ; & je trouvay au bout de trois ou quatre jours un grand nombre de petits animaux parmi quelques gros : ils se multiplierent considerablement, & donnerent durant un mois un spectacle agréable à plusieurs personnes.

Je serois trop long si j'entreprenois de décrire la figure, la couleur & les mouvemens de ces animaux ; il vaut mieux vous laisser la satisfaction de remarquer toutes ces merveilles en les examinant comme j'ay fait.

Je ne juge pourtant pas à propos de passer sous silence une sorte de nouveaux animaux que je n'avois point encore vûs, & qui commencerent à se faire appercevoir dans cette même liqueur le second jour de Septembre : c'étoit une espece de limace que je vis, en me servant d'une lentille d'environ une ligne de foyer. Toute sa longueur, dans laquelle

Planche 5. Figure 1.

je diſtinguay trois parties conſiderables, me parut d'environ dix à douze lignes, & ſa plus grande largeur de ſix à ſept lignes ou environ.

La premiere partie marquée A en eſt la tête, qu'elle retire & avance par ſecouſſes lorſqu'elle va lentement; ce qu'elle ne fait pas lorſqu'elle nage aſſez vîte.

La ſeconde partie marquée B eſt le tronc, & C repreſente la partie du derriere, que cet animal retire ſouvent, & à l'extrémité de laquelle on apperçoit comme deux grands poils blancs marquez D, D, qui luy ſervent de nageoires. Tout ſon corps, qui eſt blanc & tranſparent, ſemble n'être qu'une maſſe charnuë compoſée de muſcles, & de filets preſque imperceptibles, qui s'allongent & ſe raccourciſſent ſi aiſément, que d'une forme ovale aſſez longue, cet animal ſe change promptement en boule.

Il cache ſouvent ſes nageoires D, D ſous luy, de maniere qu'on ne les apperçoit plus, ſans ceſſer néanmoins de nager. Son corps eſt mal terminé, de ſorte qu'on le voit ſouvent ſous une forme incertaine, à cauſe du changement qui s'y paſſe par les divers mouvemens de ſes muſcles; & même lorſque cette limace approche de ſa fin, ſa figure devient ſi inégale & ſi irréguliere, qu'on ne la peut autrement exprimer que par le deſſein marqué en E, demeurant quelque tems tranſparente, ainſi qu'un gros grain de ſable vû au Microſcope à liqueurs, ou dans un Microſcope à pluſieurs verres, en y regardant comme on fait dans une lunette d'approche pour obſerver les Aſtres.

CHAPITRE X.

De l'infuſion des barbeaux, ou petites fleurs bleuës qui viennent parmi les bleds.

LE ſecond Juin je mis infuſer à froid, dans de l'eau commune, les queuës d'un gros bouquet de barbeaux, avec quelques fleurs; & en même tems je jettay dans une

caraffe de verre des mêmes fleurs seules, sur lesquelles je répandis de l'eau en suffisante quantité. Environ douze heures aprés j'apperçûs dans ces infusions des animaux de la grosseur & de la figure qu'on les a representez en F, par le moyen d'un Microscope, où j'avois mis une lentille d'environ une ligne de foyer. Le lendemain au soir j'y vis de quatre sortes d'animaux bien transparens, de figure ovale, & d'inégale grosseur, se mouvans diversement.

Planche 5. Figure 2.

Le cinquiéme du même mois je me servis d'une autre lentille, qui n'a qu'un quart de ligne de foyer, & j'apperçûs les plus gros animaux comme en G; mais avec beaucoup plus de confusion que je ne les avois observez au travers de la lentille précedente; ce qui arrive nécessairement, quand on se sert des lentilles dont le foyer est tres-proche de l'objet, & par consequent fort court.

Ces gros animaux changent de figure, & même de mouvement en un instant, s'allongeant & se raccourcissant de maniere qu'on les méconnoît d'un moment à l'autre; ce qui fait qu'on prend souvent en divers tems le même animal pour un autre.

Le 6. j'apperçûs une nouvelle espece d'animaux, dont vous voyez icy toute la grosseur & la figure en H, qui s'allongeoit & se raccourcissoit en nageant dans une tres-petite goutte d'eau, sans que j'aye pû remarquer de difference entre la tête & la queuë de ce poisson, que je nomme insecte des barbeaux ou chabot: mais parce qu'il doit y avoir une partie constante où se trouve la tête de cet animal; je la juge à l'extrémité qui précede ou devance toujours l'autre dans le transport de tout son corps.

Le septiéme, j'observay une chose tres-curieuse en quelques-uns des plus gros; ils avoient une figure ovale terminée assez irrégulierement, traînant après eux une longue queuë d'environ deux pouces, d'une substance beaucoup plus blanche & plus transparente que n'est leur corps, depuis lequel elle s'étend directement en diminuant de grosseur, & finissant comme en pointe, ainsi qu'on le peut voir representé en H. Le bout de cette queuë, qui est souvent cinq ou six fois plus longue que le corps, est ordinairement attachée à une

masse de la matiere grossiere de l'infusion, qui se colle au concave de verre où la goutte de liqueur est en observation; & alors il y a du plaisir à voir l'animal tirer cette molecule, sans la pouvoir entraîner, comme en I; ce qui l'oblige à s'en rapprocher de tems en tems à reculons, en repliant sa queuë, comme en L, qu'il redresse en s'en écartant avec beaucoup moins de vîtesse qu'il ne s'en étoit rapproché, allant d'un mouvement assez égal; d'autres fois on voit cinq ou six de ces insectes attachez autour d'une grosse masse qui tient fermement attachée au porte-objet, dont ils se rapprochent & se retirent tour à tour, comme nous venons de dire.

On observe que durant cet exercice, il change & reprend alternativement sa premiere figure, & que cette queuë naturellement droite, comme en I, reprend sa direction, à mesure qu'il fait des efforts pour s'écarter en droite ligne de la masse qui l'enchaîne au concave de verre, & qu'il entraîne quelquefois après luy allant directement.

J'ay remarqué que l'excessive chaleur de l'air en fit perir une tres-grande quantité, & que cinq ou six jours après il en revint d'autres.

Il ne m'est pas permis de douter, après ce que j'ay vû de ces derniers animaux, qu'ils n'ayent des yeux, & qu'ils ne voyent; car on en remarque souvent deux qui figurent ensemble l'un proche de l'autre sans se toucher, tournant tous deux d'une vîtesse si grande autour d'un même centre, que les deux, quoy qu'ovales, ne paroissoient que comme un seul, & tout rond.

On voit au-dessous de M un petit poisson, dont les extrémitez sont terminées par deux surfaces planes, tellement paralleles entr'elles, qu'on n'y apperçoit rien de distinct qui puisse faire juger du lieu où est sa tête: pour le connoître, il faut observer son mouvement, qui s'execute en courbant differemment tout son corps, qui va en avant, formant des ondulations tres-lentes; de sorte qu'il fait peu de chemin en beaucoup de tems.

CHAPITRE XI.

Du Thé mis en infusion.

LE 15. Juillet 1711. après avoir mis dans une théhere autant de thé & d'eau boüillante qu'il en falloit pour six grandes prises ; j'en mis dans une caraffe de verre, d'environ demi-septier, les feüilles qui resterent aprés l'infusion chaude ; & ayant rempli d'eau de fontaine le vaisseau, je laissay reposer cette seconde infusion qui s'en faisoit à froid : dix jours aprés j'apperçûs dans la moindre goutte que je pusse prendre de cette liqueur, une fourmilliere de tres-petits animaux de figure ronde, & dont le mouvement étoit tres-lent.

Planche 5. Figure 3.

Quelques jours ensuite, ces petits animaux y parurent en moindre quantité, mais beaucoup plus gros, plus clairs & plus distincts qu'auparavant : leur figure étoit ovale, & comme on en voit un seul representé au-dessous de N. Le contour apparent de leur corps paroissoit noir, & le reste tres-blanc & transparent ; on les voyoit nager d'une vîtesse surprenante.

Le corps de ces insectes étoit d'une consistance si délicate, qu'ils n'ont conservé leur figure naturelle que deux ou trois minutes aprés leur mort.

Le 23. Septembre j'apperçûs dans la même liqueur de trois sortes d'animaux, sçavoir de tres-petits, & en grand nombre ; de moyens, en moindre quantité ; & de gros encore en plus petite ; mais ils nageoient beaucoup plus vîte que les autres. Aujourd'huy 8. Decembre il s'y en trouve encore de tres-beaux ; & j'ay vû par hazard une grosse anguille dans une tres-petite goutte de cette infusion ; on la voit icy representée toute entiere : elle differe des anguilles du vinaigre, en ce que son corps est plus court & plus gros, & que son nager est de beaucoup plus lent.

L'infusion qu'on fait des feüilles de thé, tel qu'il vient des Indes, étant mises à froid dans de l'eau commune, n'a rien fait voir d'extraordinaire.

CHAPITRE XII.

Des infusions de queuës de framboises, mises à froid dans de l'eau commune.

L'Infusion des queuës de framboises, dans de l'eau commune, est une de celles qui n'acquiert aucune mauvaise odeur, depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est-à-dire durant deux mois ; cependant elle produisit en moins de vingt-quatre heures les plus beaux animaux que l'on puisse voir dans les liqueurs, & en tres-grand nombre ; vous en verrez icy les Figures representées en O. Ces poissons paroissent tres-blancs & transparens dans le commencement de leur naissance, avec de petites marques sur le corps ; plus diaphanes en des endroits qu'en d'autres : cette grande blancheur se change dans la suite en une couleur jaunâtre, & toujours assez transparente. Planche 5. Figure 4.

On les voit s'allonger & se raccourcir, devenant ovales ou ronds, selon qu'il leur convient, par rapport aux obstacles qu'ils trouvent dans leur route. J'en ay vû souvent deux se tenir ensemble comme par le bec, ainsi que font ordinairement deux tourterelles, ou deux pigeons mâle & femelle qui se caressent ; & on voyoit ces animaux se mouvoir assez vîte, sans quitter cette attitude representée en P, dans laquelle on les voit même jusqu'aprés leur mort.

Le premier Septembre de l'année 1711. j'en vis un groupe de huit d'une belle couleur d'ambre, & d'une grosseur remarquable, figurant ensemble comme feroient plusieurs danseurs qui prendroient plaisir à divertir une compagnie : dans de certains momens ils nageoient, & marchoient assez lentement pour se faire observer à loisir : je n'ay pû cependant jusqu'icy parvenir à découvrir leurs nageoires ou leurs pattes ; mais le 8. Septembre suivant, je vis dans cette infusion quantité de gros animaux sans aucun petit ; & parmi eux j'en apperçûs deux ronds qui ne se quittoient point ; l'un des deux

avançoit ſur l'autre, comme font deux jettons ſans être couverts totalement; d'autres fois ils ſe touchoient ſeulement par leurs circonferences, tournant ainſi enſemble comme s'ils n'en faiſoient qu'un ſeul, tantôt en un ſens & tantôt en un autre. Enfin le 27. du même mois j'apperçûs dans cette infuſion, pour la premiere fois, des animaux ſemblables à celuy qui eſt repreſenté par Q, ayant une matiere tranſparente & agitée aſſez regulierement, dont je ne pûs diſcerner la figure à cauſe de la vîteſſe de ſon mouvement. Cette matiere eſt ſituée entre le milieu du corps de l'animal, & ſa tête, qui eſt immédiatement ſous la lettre Q. Peut-être que c'eſt le cœur de ce poiſſon, & que les agitations qu'on y apperçoit en ſont le ſyſtole & le diaſtole: ces mouvemens ne peuvent être remarquez que dans le tems que l'animal ſe meut tout entier & tres-lentement.

CHAPITRE XIII.

Des infuſions de fenoüil, de ſauge, de melon, de verjus, de tiges de ſoucy avec les fleurs.

LE 11. Aouſt 1711. je mis infuſer à froid, dans de l'eau commune, du fenoüil avec ſes tiges, groſſes & menues; & le 13. enſuivant j'obſervay que dans la moindre goutte que l'on puiſſe prendre de cette liqueur, on découvroit une fourmiliere compoſée d'un nombre preſque innombrable de pe-
Planche 5. tits animaux, que nous avons repreſentez en R, parmi leſ-
Figure 5. quels il y en avoit d'autres de figure ronde, & environ cinq ou ſix fois plus gros.

Le 22. Aouſt 1711. je mis infuſer à froid des feüilles de ſauge, qui ont conſervé leur odeur naturelle durant tout le tems de leur infuſion: dans l'intervalle de douze jours ou environ, je n'ay vû dans cette liqueur que quelques petits animaux de la groſſeur d'un grain de millet, & une infinité de plus petits, qui ne paroiſſoient que comme des points marquez ſur du papier, avec une plume à écrire taillée des

plus fine ; & un peu au-dessous de la surface de la liqueur, j'y apperçûs de tres-petits vers blancs.

Le 28. Septembre je vis dans une goutte de cette même eau deux sortes de petits poissons representez en S, & comme ils paroissoient vûs avec une lentille d'une ligne de foyer. La goutte de liqueur venant à se dessécher, on voit mourir les gros avant les petits, qui prennent autour des gros des arrangemens semblables à celuy qui se voit icy.

Le 22. Aoust je mis infuser à froid des bayes ou fruits d'épine-vinette, & au bout de vingt-quatre heures j'apperçûs des animaux de la grosseur & figure representée en T, dont le corps étoit blanc & transparent ; mais ils n'ont vécu que tres-peu de tems. Figure 6.

Le 25. du même mois, au soir, je mis infuser à froid de petits morceaux de la côte d'un melon, avec un peu de la chair & de sa graine ; le lendemain au matin j'apperçus quelques animaux assez beaux & transparens, dont on voit la figure en V.

Le 30. au matin je ne vis plus dans cette infusion que de petits corps longuets, blancs & transparens ; comme on les peut voir representez en X, dans une goutte de la liqueur mise au Microscope, parmi lesquels on apperçoit d'autres petits corps moindres que celuy qu'on voit marqué T, sans aucun mouvement sensible ; ce qui me fit supprimer cette infusion.

Ayant mis infuser le 14. Aoust des grains de verjus en grappe, dans de l'eau commune & froide, j'y apperçûs le 20. un grand nombre de si petits poissons, que je n'en pus distinguer la figure.

Le 25. du même mois j'y découvris de deux sortes de poissons ; les uns de la figure & grosseur representée en Y, & les autres si petits, que je n'en pus voir la forme. Figure 7.

Le 4. Septembre je trouvay les petits animaux de ce verjus considerablement multipliez ; & les gros augmentez de volume : j'en vis de ronds qui paroissoient avoir une bonne ligne de diametre, & qui étoient joints ensemble, en formant comme un 8 de chiffre, se mouvant ainsi tantôt circulairement, & tantôt en ligne droite.

Le 8. Septembre j'apperçûs quantité de petits vers ſur une croute formée en la ſurface de cette infuſion, & des anguilles en aſſez grande quantité dans une ſeule petite goutte de la liqueur.

Enfin le 5. Decembre j'apperçûs encore dans cette infuſion de trois ou quatre ſortes de petits poiſſons, de diverſes groſſeurs, de differentes figures, ſe mouvans tres-lentement, à cauſe de l'épaiſſiſſement de la liqueur, & de l'augmentation du froid.

Le 25. Aouſt 1711. je mis infuſer à froid, dans de l'eau commune, des tiges & des fleurs de ſoucy, & huit jours après j'y vis de trois ſortes d'animaux, dont les plus petits ſe voyent repreſentez en Z Z, les ſeconds en &, & les derniers, qui n'ont pû trouver de place icy, étoient de groſſes anguilles, differentes en eſpeces de celles du vinaigre, & differentes auſſi de celles que j'ay vûës dans l'infuſion d'œillets.

Figure 8.

Enfin le 8. Septembre je ne trouvay plus dans cette infuſion qu'une ſeule eſpece de poiſſon; les anguilles même étoient devenuës inviſibles, & l'infuſion avoit acquis en peu de jours une odeur d'urine ſi forte & ſi déſagréable, que je fus obligé de la ſupprimer.

CHAPITRE XIV.

D'une infuſion de foin nouveau, mis à froid dans de l'eau commune, le 4. Juin 1711.

CEtte infuſion de foin nouveau n'eſt pas vingt-quatre heures en experience, ſans donner des marques avantageuſes de ce qu'on peut voir en elle: En effet, au bout de cinq ou ſix jours on découvre dans une tres-petite goutte de cette eau, juſqu'à cinq ou ſix ſortes d'animaux vivans, differens en couleur, en groſſeur, en figure & en mouvement.

L'extrême délicateſſe du corps de ces poiſſons les fait méconnoître, dès qu'ils ſont morts, ſur le porte-objet du Microſcope.

L'odeur de cette infuſion, durant les grandes chaleurs, eſt tres-forte dans les premiers jours; & j'ay remarqué qu'elle avoit un ſi grand rapport avec celle des crotins du cheval, que ſans voir cette infuſion, on aſſureroit que ce ſont des crotins qui la cauſent; mais elle diminuë en vieilliſſant; de ſorte qu'elle devient dans la ſuite tres-ſupportable.

Dans la plûpart des liqueurs que j'ay vûës, je n'y ay guéres trouvé de plus gros animaux, de plus tranſparens & de plus nets, ni qui durent plus long-tems que ceux-ci; puis qu'au mois d'Octobre j'y en apperçûs encore une aſſez grande quantité de gros & de petits.

CHAPITRE XV.

Seconde infuſion de foin nouveau.

LE 4. Octobre 1711. je mis infuſer à froid, dans de l'eau commune, un peu de foin nouveau, dans deux differens vaiſſeaux; j'en bouchay un le mieux que je pus avec du velin bien moüillé, & je laiſſay l'autre ouvert. Deux jours après j'apperçûs dans l'une & dans l'autre infuſion de trois ſortes d'animaux, & en aſſez grand nombre: cette experience ſemble tres-propre pour perſuader que ces animaux étoient produits des œufs que d'autres animaux avoient dépoſez ſur ce foin, & non de ceux qui étoient répandus dans l'air.

Le 10. du même mois je trouvay plus d'animaux dans une goutte de l'infuſion qui avoit été bouchée, que je n'en vis dans une pareille quantité de celle qui ne l'étoit pas. On peut penſer que la fermentation & l'évaporation de la liqueur débouchée, y étant devenuës plus grandes qu'en celle de l'autre, elles furent les cauſes occaſionnelles du plus grand nombre de poiſſons qui s'y ſont trouvez.

Troisiéme experience faite sur de semblable foin.

LE 13. Octobre je fis boüillir de semblable foin nouveau dans de l'eau commune, durant plus d'un quart-d'heure; j'en mis ensuite une égale quantité dans deux vaisseaux, à peu près de même grandeur; j'en bouchay un sur le champ, & même avant que le tout fut refroidi : je laissay l'autre découvert, & j'y apperçus des animaux au bout de quelques jours, & pas un dans l'infusion qui avoit été bouchée; & après l'avoir gardée ainsi fermée un tems considerable pour y trouver quelque insecte vivant, s'il y en eût dû venir; mais n'y ayant rien trouvé, je la laissay enfin débouchée, & au bout de quelques jours j'y en remarquay : ce qui fait comprendre que ces animaux avoient pris naissance des œufs répandus dans l'air; puisque ceux qui s'étoient pû rencontrer sur ce foin avoient été ruinez totalement dans l'eau boüillante.

CHAPITRE XVI.

Composition de plusieurs infusions mises ensemble dans un seul vaisseau.

MEslez ensemble des parties à peu prés égales de l'infusion de sené, de l'infusion de queuës de framboiboises, de l'infusion de foin, &c. & demie heure après prenez à l'ordinaire une seule petite goutte de ce mêlange, pour la mettre sur le porte-objet du Microscope, afin de l'y observer, & vous aurez le plaisir de voir dans cette goutte de liqueur des animaux de toutes les infusions, dont vous aurez fait le mêlange. A l'occasion de cecy, il est à propos de remarquer que tous ces petits poissons ne subsisteront pas ainsi dans ce mêlange si long-tems, à beaucoup prés qu'ils auroient fait, s'ils fussent demeurez chacun dans sa premiere infusion. Je croy encore devoir avertir que toutes sortes

d'infuſions ne ſont pas propres à donner le plaiſir de ce ſpectacle, vû qu'elles doivent avoir un certain rapport pour y faire ſubſiſter les animaux en vie ; & c'eſt ce que nous avons fait voir dans pluſieurs des Chapitres de cette ſeconde Partie.

CHAPITRE XVII.

On prouve dans ce Chapitre qu'il y a de tres-petits animaux qui en devorent de plus gros.

Qu'il y en a de ſi petits qu'ils échappent aux meilleurs yeux armez de Microſcopes.

Qu'au bout d'un certain tems en eſté on découvre des petits poiſſons dans l'eau de riviere, ou dans celle de fontaine, ſans s'être corrompuë.

Qu'au bout de quatre heures, & même en moins de tems, on trouve pluſieurs eſpeces de poiſſons dans l'eau que l'on a donné à boire à des oiſeaux.

Et enfin comment les graines & les plantes doivent être miſes en infuſion, pour produire de bons effets, par rapport aux experiences dont nous parlons.

QUoyque notre vûë ſoit à preſent portée par les Microſcopes auſſi loin qu'elle peut aller ; & que nous ayons comme forcé la nature à nous découvrir une grande partie de ce qu'elle avoit de plus caché dans les infuſions dont nous parlons dans cette ſeconde Partie ; je ne doute pas neanmoins qu'une infinité d'eſpeces d'inſectes, & d'autres animaux, ne demeurent toujours inviſibles, ſoit par le défaut des inſtrumens, ſoit par la foibleſſe de nos organes, ſoit par le manque d'application à ſuivre & à épier ce qui ſe paſſe dans une infuſion ; ſoit enfin parce qu'il eſt difficile, & même impoſſible de prendre avec le plus menu bout d'une plume à écrire, ou autre ſemblable corps, de toutes les differentes eſpeces des petits animaux qui ſe peuvent rencontrer dans une infuſion. Je ſuis perſuadé, par ma propre experience, qu'il y en a qui échapent aux plus attentifs ; puiſ-

qu'il m'eſt arrivé pluſieurs fois de n'en trouver qu'un d'une ſeule eſpece, dans quelque infuſion particuliere.

L'on découvre, mais rarement, de tres-petits animaux ſur le poux & ſur la puce ; & je ne doute pas qu'il ne s'en puiſſe voir encore de bien plus petits ſur le corps de ces derniers, qui les incommodent, & qui les devorent enfin ; comme je l'ay ſouvent obſervé, en examinant de certaines mouches qui étoient mangées par des animaux environ deux mille fois plus petits qu'elles.

Les infuſions d'œillets, de queuës de framboiſes, de ſené, de tabac de toutes les ſortes, font éclore les œufs d'une multitude viſible d'inſectes, qui dans les premiers jours ſont ſi menus que l'on a de la peine à les appercevoir, quoy qu'on ſe ſerve d'une lentille qui groſſiſſe conſiderablement : & cela nous fait penſer, qu'il peut y en avoir de ſi petits dans les liqueurs, que nous manquons de Microſcopes pour nous les faire appercevoir ; ou plutôt, que le peu de lumiere que ces petits animaux ſont capables de reflêchir dans nos yeux, n'eſt pas ſuffiſante pour cauſer un ébranlement capable de les faire ſentir.

L'eau commune expoſée à l'air durant une quinzaine de jours, d'un tems aſſez temperé, nous preſente aux yeux armez d'un Microſcope quantité de petits poiſſons, de groſſeur, de figure & de mouvemens differens, qui ne ſubſiſtent que tres-peu de tems, en comparaiſon de la plûpart de ceux qui s'obſervent dans les infuſions des plantes, ou dans celles des drogues telles qu'elles puiſſent être, à cauſe du peu de nourriture qu'ils y trouvent.

La même eau dont je viens de parler étant donnée à boire aux ſerins de Canarie, ou à d'autres oiſeaux, nous en preſente d'un jour à l'autre : il s'y en voit ſouvent de quatre à cinq eſpeces tres-differentes les uns des autres, & tres-propres à divertir agréablement le ſpectateur ; parce qu'en un moment il y obſervera des anguilles à peu près ſemblables à celles du vinaigre, mais plus courtes : Des limaſſes qui s'étendent & ſe raccourciſſent conſiderablement, en ſe traînant & s'appuyant tantôt ſur la tête, & tantôt ſur le derriere, où l'on voit deux pointes faites en forme d'un foſſet, avançant aſſez

aſſez lentement ; ce qui fournit le moyen d'obſerver pluſieurs choſes aſſez curieuſes. D'autres fois on voit ces animaux nager tres-vîte, & alors ils paroiſſent avoir deux têtes ; qui s'écartent & ſe rapprochent alternativement l'une de l'autre : leur couleur reſſemble à celle de l'ambre jaune. Le contour du corps de ce poiſſon ſe voit mal terminé ; il reſſemble à la maſſuë d'un Géant, particulierement quand il étend quelque peu ſon corps du côté de la tête ſeulement.

On voit auſſi dans cette même eau de petits vers longuets, d'une apparence d'environ quatre à cinq lignes de longueur, qui changent de figure en nageant ; & d'autres animaux aſſez ſemblables à une Cornemuſe : enfin j'y en ay vû encore de figure ovale, à la reſerve de l'endroit où eſt la tête, qui eſt un peu applatie ; traînant aprés eux une longue queuë blanche & tranſparente, qui ſe termine en une pointe tres-aiguë.

Nous avons toujours mis les tiges des plantes, leurs feüilles, leurs fleurs, & les fruits en infuſion, ſans les réduire en poudre, & ſans les macerer ; parce qu'étant autrement préparées & miſes en infuſion, elles rendroient la liqueur opaque & trop épaiſſe, & l'on n'y pourroit rien voir de diſtinct.

L'écorce des arbres ſe met en infuſion par petits morceaux, de même que le bois des gros arbres, & les gros fruits. Les pepins de ces fruits, les grains de poivre, & autres choſes ſemblables s'y mettent tout entier.

La ſuie de nos cheminées, le tabac grainé, le râpé, & celuy qu'on paſſe au tamis, produiſent de petits animaux ; mais on les voit ſi confondus avec les menuës parcelles de tous ces corps, qu'on n'a aucune ſatisfaction des obſervations que l'on fait ſur ces poudres.

Et à l'égard des ſucs, tant des fruits que des plantes, on en ſeparera la partie la plus groſſiere pour mettre le reſte en infuſion dans de l'eau commune, qui les éclaircira ſuffiſamment pour y faire appercevoir ſucceſſivement toutes les productions dont ces ſucs ſeront capables.

Les experiences précedentes me paroiſſent en aſſez grand nombre, pour oſer entreprendre de jetter les fondemens d'une nouvelle hypothéſe, qui puiſſe ſervir à rendre raiſon

de tous les Phénomenes qui regardent les inſectes, & les autres animaux contenus dans les infuſions précedentes; & même dans toutes celles que nous examinerons cy-aprés.

CHAPITRE XVIII.

Hypothéſe pour ſervir à rendre raiſon de la naiſſance, du progrès, & de la mort des animaux que l'on obſerve dans les liqueurs préparées, & dans celles qui ne le ſont point.

ON a crû autrefois que tous les inſectes, & d'autres petits animaux s'engendroient de corruption; mais depuis que pluſieurs celebres Philoſophes ont donnez ſur cette matiere les obſervations qu'ils ont faites avec beaucoup de ſoin & d'exactitude, on eſt revenu de cette erreur: Ils ont prouvé par un grand nombre d'experiences, & par des raiſonnemens inconteſtables, que tous les animaux, de quelque nature qu'ils ſoient, viennent des œufs. En effet, comment peut-on comprendre que l'alteration & la pourriture, qui naiſſent de la diviſion & de la ſeparation des parties d'un corps en d'autres parties plus petites, puiſſent jamais s'ajancer les unes auprès des autres, & s'unir comme il le faudroit, pour compoſer des corps vivans, qui devinſſent capables de chercher de quoy ſe nourrir en marchant, en rampant & en nageant, & même de produire leur ſemblable, comme l'on voit que font ceux qu'on trouve dans les infuſions des plantes? C'eſt ce que je ne penſe pas qu'un homme capable de refléxion puiſſe s'imaginer, quelque effort qu'il faſſe pour en venir à bout.

Mais afin d'avoir de quoy combattre ce préjugé ſi dangereux à la Religion, en attribuant au hazard, c'eſt-à-dire, à une cauſe qui n'eſt ni apparente ni néceſſaire, ce qui eſt aſſurément l'ouvrage le plus parfait d'une puiſſance infinie; il n'y a qu'à faire attention aux experiences contenuës dans cette Hiſtoire, & aux raiſonnemens qui ſuivent.

La corruption n'eſt pas la cauſe de la generation des pe-

tits animaux qui se voyent, avec le Microscope, dans l'eau des moules, dans celle des huistres à l'écaille; puisqu'on les y découvre avant que ces mêmes eaux soient corrompuës.

Elle n'est pas non plus la cause de la generation d'une infinité de tres-petits poissons que nous avons vûs dans differentes infusions; puisque les matieres de toutes ces infusions n'étoient point encore alterées ni corrompuës, lorsqu'on a commencé à les y voir.

Si la pourriture étoit la cause de la naissance des insectes que nous appercevons dans une seule infusion, on les y devroit voir tous, dés que la matiere infusée seroit pourrie; ce qui n'arrive pas, puisqu'on les y voit se succeder les uns aux autres durant plus de treize à quatorze mois.

Si la pourriture contribuoit à la generation des insectes dont nous parlons; plus un corps seroit pourri, plus on y devroit voir d'animaux; cependant on voit arriver tout le contraire dans l'urine que l'on garde plusieurs jours. Dans une infusion de poreaux mis dans de l'eau commune, les champignons, une coque d'œuf remplie d'eau, &c. sont des choses que l'on est obligé de supprimer en peu de jours durant les grandes chaleurs; parce qu'elles choquent l'odorat d'une maniere insupportable.

Le sang humain, sans aucun mêlange, ayant été exposé à l'air durant prés d'un mois, & dans un tems assez chaud, n'a fait sentir qu'une odeur insupportable; & quoyque j'aye mis de l'eau commune dans le même vaisseau où il étoit, & examiné ce mêlange assez de tems, je n'y ay rien vû qui m'ait paru avoir aucune apparence de vie.

On peut encore ajoûter, qu'il y a des corps qui ne changent que peu ou point d'odeur; qui fournissent des animaux differens les uns des autres, durant tout le tems qu'on les garde en infusion.

Voilà ce me semble des experiences en suffisante quantité, pour montrer que ni l'alteration, ni la corruption, ni la mauvaise odeur, ne sont point la cause de la generation des animaux, tels qu'ils puissent être: cela supposé, passons à l'établissement d'une hypothése, pour expliquer ce qui se voit de plus surprenant dans les infusions des plantes. Je suppo-

ſeray qu'il vole ou nage dans l'air voiſin de la terre, un nombre innombrable de tres-petits animaux de diverſes eſpeces, qui s'appliquant ſur les plantes qui leur conviennent, s'y repoſent, y prennent quelque nourriture, & y mettent au jour leurs petits, pendant que d'autres y dépoſent des œufs, où de nouveaux inſectes ſont renfermez.

Et enfin que ces mêmes animaux laiſſent auſſi tomber dans l'air qu'ils parcourent, des petits & des œufs, particulierement dans les lieux où ils ſont arrêtez par des corpuſcules ſpiritueux qui s'échapent continuellement des plantes, & generalement de tous les autres corps, dont les parties ont entr'elles quelque mouvement capable de les ſubtiliſer aſſez pour en faire l'évaporation.

De plus, il eſt à propos de remarquer qu'une même plante peut être la favorite de diverſes eſpeces d'animaux, & par-là devenir en même tems la dépoſitaire des œufs & des petits tout vivans de pluſieurs eſpeces d'inſectes; d'où il ſuit que ſon infuſion ſera ſuffiſante pour faciliter la naiſſance, & fournir tout ce qui ſera néceſſaire à l'accroiſſement de tous les differens animaux que nous y appercevrons ſucceſſivement, pendant tout le tems que durera cette infuſion.

CHAPITRE XIX.

Continuation des experiences ſur les Liqueurs.

D'un ver de terre trouvé parmi des herbes potageres.

J'Ay mis dans un vaiſſeau de verre, de figure cilindrique, d'environ trois pouces de diametre, de l'eau commune, & un ver qui s'étoit rencontré parmi des herbes potageres; long d'environ deux pouces & demi, & d'une ligne de diametre: je le changeay de vaiſſeau, & je luy donnay de nouvelle eau commune. Au bout de trois ſemaines ou environ, il y fit de nouveaux excremens, ce qui me fit juger qu'il avoit trouvé dans cette eau quelque nourriture propre à le

faire vivre durant tout ce tems-là. Je pris alors une tres-petite goutte de cette eau; je la mis ſur le porte-objet de mon Microſcope à liqueur, & j'y vis de deux ſortes de poiſſons qui nageoient dans ce peu d'eau; les uns brillans, & de figure ovale, n'ayant au plus qu'une demie ligne de longueur apparente, & les autres un peu plus gros, faits comme de petites cornemuſes blanches & tranſparentes. Tous ces petits poiſſons diſparurent au bout de quatre ou cinq jours; peut-être que cela vint de ce que le ver les avoit mangez, ou de ce qu'ils étoient morts faute d'avoir trouvé dans cette eau de quoy ſe nourrir plus long-tems. Six ſemaines aprés je jettay l'eau de ce vaiſſeau pour y en mettre d'autre; trois jours aprés j'y apperçûs de deux ſortes de petits poiſſons: enfin au bout de trois mois ce ver me parut comme lié ou tors en un ſeul endroit de tout ſon corps, ce qui le fit mourir aprés s'être bien tourmenté durant un jour.

Cette experience, & une ſeconde toute ſemblable, que je fis long-tems aprés, ſur un autre ver de terre de même nature, ſemblent ſuffire pour prouver qu'il y a des animaux qui ne laiſſent pas de vivre dans l'eau, quoy qu'ils ayent pris naiſſance ſur la terre, où ils ſubſiſtent ordinairement.

Voicy encore une belle experience qui prouve la même choſe. Ayant mis de la poudre, que l'on trouve ſur de certains fromages, parmy laquelle il y avoit beaucoup de mittes vivantes dans de l'eau commune, je m'apperçus qu'elles y vêcurent depuis le 20. Février juſqu'au 15. Mars ſuivant, durant lequel tems il s'y forma de trois ſortes de poiſſons, qui ne meritent pas d'être décrits.

CHAPITRE XX.

D'une infuſion de Rhubarbe.

LA Rhubarbe eſt une des drogues purgatives qui demeure le plus de tems en infuſion dans de l'eau commune, ſans qu'on y apperçoive aucun poiſſon, ny qu'elle

rende aucune odeur désagréable : je l'ay observée durant un mois sans y avoir vû aucune chose de considerable. Enfin au bout de cinq semaines je commençay d'y remarquer une seule sorte d'animaux, qui ne merite pas que j'en fasse une description particuliere ; nous dirons seulement que le mêlange d'une goutte de cette infusion, avec autant de celle du séné, ne fait pas perir les poissons de l'une ny de l'autre espece ; & qu'au bout de quinze jours, les animaux de l'infusion de la Rhubarbe se sont trouvez morts.

CHAPITRE XXI.

De l'infusion d'un champignon, mis à froid dans de l'eau commune.

L'Infusion à froid d'un gros champignon, produisit d'un jour à l'autre une multitude étonnante de tres-petits animaux de figure ronde, de la grosseur d'un grain de navette, vûs au Microscope, qui multiplie environ vingt-cinq mille fois l'apparence ordinaire de ce grain.

Le troisiéme jour de cette infusion, j'y en découvris qui étoient plus gros, & dont la tête un peu courbée se terminoit en pointe, & dont tout le corps étoit assez approchant d'une larme de verre.

Une troisiéme espece parut bien-tôt parmy les deux précedentes, s'y tremoussant extraordinairement sans pourtant y parcourir plus de deux lignes apparentes de chemin ; ils étoient de figure ovale, dont le grand diametre n'avoit au plus que deux lignes de longueur : & une quatriéme sorte se presenta à mes yeux, n'ayant au plus que la douziéme partie d'un pouce de diametre, formant un contour parfaitement rond en apparence.

Cette infusion devint au bout de cinq ou six jours d'une odeur tres-forte, & difficile à supporter : ce fut alors qu'on apperçut de petits moucherons s'amasser & voltiger au-dessus de sa surface, où ils demeuroient assez de tems pour y

déposer un grand nombre de tres-petits vermisseaux, qui se nourrissoient dans la pellicule qui s'y étoit formée.

Cette mauvaise odeur se dissipa peu à peu : les morceaux de champignon se précipiterent au fond du vaisseau ; la pellicule épaisse qui s'étoit formée à sa surface y tomba aussi, & les vers n'y parurent plus. Mais l'on continua de voir dans une tres-petite goutte de cette infusion, de petits animaux de figure ovale, les uns presque en repos, & les autres en grand mouvement.

J'examinay ce champignon avant que de le mettre en infusion ; je le trouvay beau, vermeil, & frais ceüilly ; j'y apperçûs avec une loupe d'un pouce de foyer, deux petits animaux blancs, ayant chacun pour ornement deux belles cornes au-devant de la tête, plus longues que n'étoit le reste de son corps. Chacun de ces petits animaux paroissoit avoir au plus la grosseur d'un ciron ; ce qui me semble prouver qu'il y a des animaux qui déposent leurs petits sur des végétaux ; & confirmer en même tems une partie de ce que nous avons avancé dans notre hypothése.

CHAPITRE XXII.

Des petites fleurs colorées diversement, qui se trouvent dans les prez.

SI vous mettez infuser à froid, dans de l'eau commune, de ces menues fleurs diversement colorées & ceüillies dans un pré, lorsqu'elles sont nouvellement épanoüies ; vous aurez dans l'infusion, au bout de quelques jours, une espece singuliere de poisson qu'on peut nommer femelles, à cause de la ressemblance qu'il y a. On en voit un represénté au haut de cette Planche, placé entre les lettres A B C ; dont le nager m'a paru assez lent, & s'executer en dandidant. Cette lenteur qui se remarque en luy, nous donne occasion de conjecturer que ces poissons sont tournez en forme d'une gourde allongée ; parce que l'apparence de leur largeur B C

eſt toujours égale à elle-même, dans le tems que la partie C s'abaiſſe, & que B s'éleve.

Sa tête eſt immédiatement au-deſſous de la lettre A; elle s'incline vers B & vers C : elle s'allonge auſſi & ſe raccourcit. On voit quelquefois tout ſon corps devenir rond comme une boule, dont la ſuperficie paroît inégale & raboteuſe. Le dedans de leur corps eſt marqueté de taches longuettes, en chacune deſquelles on a remarqué un mouvement periſtaltique.

On voit ſouvent ces animaux ſe frôler les uns contre les autres, en ſe mouvant aſſez lentement; & on les apperçoit rarement ſe choquer par la tête, qu'ils dirigent durant le nager d'une maniere tres-agréable, en s'évitant les uns les autres, comme feroient des danſeurs figurant enſemble, dans une entrée de balet. Leur corps eſt ſi tranſparent qu'on y diſtingue toutes les parties interieures qui ſont plaiſir à voir, par le changement de figure & de couleur qu'on apperçoit dans ces viſceres, qui brillent lorſqu'ils ſe mouvent d'une certaine maniere. Et lorſque la goutte de liqueur, miſe ſur le porte-objet du Microſcope, vient à s'épaiſſir par l'évaporation qui s'en fait, on apperçoit des agitations ſurprenantes, qui les écartent & qui les rapprochent les uns des autres.

Ces gros animaux paroîſſent tout ſeuls dans le commencement de l'infuſion; & ce n'eſt qu'au bout d'environ quinze jours que l'on commence d'y en appercevoir un aſſez bon nombre repreſentez en 2; ce qui eſt tout le contraire de ce que j'ay obſervé dans la plûpart des autres infuſions, où les petits paroiſſent avant les gros.

Au bout d'un mois ou environ tous ces gros poiſſons periſſent dans l'infuſion, où l'on continuë d'obſerver les petits autant de tems, aprés quoy on n'y voit plus rien qui ait vie. Or il eſt à propos que j'avertiſſe que cette infuſion avoit été ſeparée des fleurs, & comme tirée au clair, pour la mettre dans un autre vaiſſeau, afin de la pouvoir plus facilement tranſporter en divers endroits de cette Ville.

CHAPITRE XXIII.

Du petit basilic qui a une odeur de citron.

NOus avons observé quelques jours aprés l'infusion à froid de ce basilic, trois sortes de poissons ; les premiers sont vûs au-dessous du chiffre 1 ; les seconds au-dessous du chiffre 2 ; & ceux de la troisiéme espece sont vûs à peu prés comme celuy que l'on a representé au-dessous du chiffre 3. Planche 6.

Le nager de ce dernier poisson s'execute en serpentant ; pliant & repliant son corps diversement, & en tout sens. L'odeur de cette infusion a quelque agrément, qui diminuë de force de jour en jour ; & cette liqueur ne conserve ses animaux qu'environ quinze jours ou trois semaines.

Nous avons representé dans cette Planche les poissons marquez quatre & cinq, qui se sont trouvez dans une infusion de foin nouveau. La couleur des uns & leur figure m'obligent de les nommer Cornemuses dorées ; & celles des autres, Cornemuses argentées. Le poisson marqué cinq, sera nommé Massuë, dont la tête est en D.

Ces animaux s'allongent & se raccourcissent : ils se plient & replient diversement en nageant.

CHAPITRE XXIV.

D'un sediment de vinaigre détrempé d'eau commune.

SI l'on met dans le sediment du vinaigre, qui sera resté dans un vaisseau après l'évaporation presque entiere de cette liqueur, environ dix fois autant d'eau commune que de matiere sedimenteuse ; l'on y trouvera au bout de trois ou quatre jours des anguilles, & une infinité d'animaux trespetits, dont la figure m'a paru incertaine, & difficile à dé-

Planche 6. terminer. La lettre A, du groupe marqué 6, en est la tête: les autres figures du même groupe sont des especes de Cornemuses, découvertes dés le lendemain de cette experience.

Les anguilles de ce vinaigre d'eau m'ont paru plus grosses que celles du vinaigre ordinaire, vûës l'une & l'autre avec la même lentille.

Remarques importantes.

S'Il arrive qu'on mette infuser, par exemple, du foin dans un vaisseau où il y avoit eu quelque tems auparavant une infusion d'une plante, ou de quelques drogues aromatiques tres-fortes en odeur, & que ce vaisseau n'ait pas été bien lavé aprés cette premiere infusion, la seconde ne réüssira pas bien; car cette seconde pourroit ne pas convenir avec la premiere.

D'ailleurs, l'eau qu'on tire d'une fontaine de cuivre mal étamée, ne convient pas pour bien entretenir la vie de la plûpart des animaux de nos infusions; parce que cette eau acquiert par le séjour qu'elle fait dans ce vaisseau, une qualité particuliere qui les empoisonne. J'ay même autrefois oüy dire à Monsieur l'Abbé Bourdelot, Medecin de Monseigneur le Prince de Condé, que les eauës qui séjournoient dans ces fontaines de cuivre mal étamées, étant bûës toutes pures, causoient des cours de ventre.

CHAPITRE XXV.

De l'infusion des Barbeaux.

LE 6. Octobre 1712. je vis pour la premiere fois un nouveau poisson dans une infusion de barbeaux, dont la figure marquée 7, represente le premier. A, marque la tête de ce poisson, B la queuë, C D la largeur de son corps, qui paroissoit divisé suivant sa longueur par une ligne courbe tirée de B vers A.

Planche 6.

La partie du corps de cet animal qui se voit du côté marqué C, sembloit être remplie de plusieurs petits globules, moins transparente en cet endroit que du côté marqué D. Le col de ce poisson qui est fort long, se raccourcit de tems en tems, de même que le derriere marqué B : son nager est d'une lenteur extraordinaire, ce qui me faisoit douter dans le commencement que ce fut quelque chose de vivant. Ce poisson ne dura pas plus de cinq à six minutes en vie ; & quoy qu'il fut difficile d'en rencontrer dans cette infusion où il y en avoit tres-peu ; puisqu'en cinq ou six coups de filets, je n'en pus découvrir que deux, & je m'apperçus que le second marqué 8. n'y dura en vie qu'environ autant de tems que le premier : ce dernier me parut un peu different du premier ; car son corps BC, garni de petits globules, le rendoit moins transparent qu'il n'étoit en AB, & en CD. Figure 6.

CHAPITRE XXVI.

D'une infusion de foin vieux.

LE 16. Octobre 1712, ayant jetté un coup de filet dans l'infusion d'un foin vieux, qui avoit été mis en experience le 20. Aoust précedent ; j'y trouvay des animaux de plusieurs especes, parmi lesquels il s'en trouva de deux sortes qui meritent une explication particuliere, dont les moindres en longueur & en grosseur paroissoient au Microscope, monté d'une lentille d'une ligne & demie de foyer, comme il est representé à côté du chiffre 9.

A, est le côté où l'on apperçoit la tête, & B la queuë, qui se termine par deux pointes, formant une espece de fourche blanche & transparente, & dont les pointes luy servent d'appuy pour le faire avancer plus facilement, en rampant sur le porte-objet du Microscope où on le met. Ces animaux ont encore une autre allure qui s'execute en nageant tres-vîte, sans qu'on puisse s'appercevoir d'aucun raccourcissement, ni d'aucun allongement sensible de leur corps.

Les ſeconds ſont des animaux des plus ſurprenans & des plus extraordinaires que j'aye encore vûs dans les infuſions des plantes, tant pour leur groſſeur que pour les autres circonſtances qui les accompagnent: en voicy deux que j'ay repreſentez en 10, 10, ſous deux diverſes formes marquées A C D B, & A C E E B. L'endroit qui répond au-deſſous de A en déſigne la tête, B la queuë qui eſt fourchuë, C le cœur qu'on voit mouvoir régulierement, & D les inteſtins de cet animal, que j'appelleray Chenille aquatique, à cauſe de quelques petits rapports de reſſemblance qu'elles paroiſſent avoir avec nos chenilles terreſtres. Il y en a de deux differentes couleurs, les unes ſont blanches & tranſparentes; les autres ſont d'un jaune pâle; celles-cy paroiſſent d'ordinaire un peu plus groſſes que les autres.

Leur allure s'execute en appuyant les pointes B ſur le porte-objet du Microſcope, pour s'étendre en avant tant qu'elles peuvent; puis en appuyant l'extrémité anterieure de leur corps ſur un autre endroit, elles en rapprochent le derriere, & continuent ainſi de ſe mouvoir en rampant. On les voit ſouvent s'arrêter ſur un endroit du porte-objet, où fixant les pointes B, elles allongent & raccourciſſent tout le corps à diverſes repriſes, ſans changer ſenſiblement le lieu où elles appliquent ces pointes. On voit auſſi quelquefois tout leur corps ſe tourner à l'entour du point B, comme un de nos ſauteurs fait tourner tout le ſien ſur ſa tête, en faiſant mouvoir ſes pieds comme ſur une circonference de cercle, dont le centre eſt à l'endroit où eſt ſa tête.

Cette ſorte d'allure n'eſt pas la ſeule qu'on apperçoit en ces chenilles; elles s'élancent quelquefois avec tant de force, qu'elles parcourent en un inſtant une étenduë conſiderable & apparente du porte-objet, où elles nagent ſans ſe raccourcir ni s'allonger davantage qu'elles ont fait dans le moment de la premiere ſecouſſe.

Quand ces chenilles s'arrêtent, on apperçoit pour l'ordinaire qu'elles ouvrent une grande bouche marquée A dans la plus groſſe des deux, dont on voit les lévres garnies de poils qui paroiſſent noirs, & mûs avec beaucoup de vîteſſe; ce qui fait voir avec étonnement que les petits poiſſons, &

les autres corps qui ſe trouvent n'être éloignez de l'ouverture de leur bouche, que d'environ un pouce apparent, ſemblent s'y précipiter.

Dans les premieres obſervations que je fis de ces chenilles, j'apperçûs un petit corps marqué C, qui ſe mouvoit aſſez vîte & régulierement ; je crûs d'abord que c'étoit un petit poiſſon encore vivant qui s'étoit jetté dans ſon eſtomac ; mais en continuant mes obſervations, je fus obligé de croire que c'étoit le cœur de la chenille, dont le mouvement égal executoit ce qu'on nomme ſiſtole & diaſtole.

J'apperçus auſſi en même tems les inteſtins de cet inſecte marquez D, qui formoient une maſſe de matiere qui étoit dans un mouvement aſſez irrégulier. Quand ces chenilles s'arrondiſſent, ce qu'elles font aſſez rarement, & qu'elles demeurent ainſi quelque tems en repos, on voit briller le dedans de leur corps, qui paroît ſouvent d'une couleur dorée tres-belle. Il y en a d'autres qui paroiſſent toutes blanches & tranſparentes, ſans qu'on puiſſe diſtinguer les parties interieures, comme on les diſtingue dans celles dont je viens de parler, qui apparemment ſont les mâles, & celles-cy les femelles.

Dans de certains momens on les voit avoir le derriere tout heriſſé de poils, couchez de E E en B. On les voit auſſi avoir le corps mal terminé, & comme s'il étoit façonné en dents de ſcie. Et en examinant bien ce contour, on apperçoit que ce ſont des anneaux qu'on voit rentrer les uns dans les autres, & ſortir enſuite avec une promptitude merveilleuſe. On apperçoit encore dans de certains momens des filets de nerfs preſque imperceptibles, qui s'étendent de la tête à la queuë de ces chenilles, qui s'enflent & qui ſe déſenflent alternativement dans le tems qu'elles rampent ; & font ainſi le jeu, curieux à voir, des anneaux qui compoſent en partie le corps de ces inſectes.

Enfin nous avons encore obſervé que le mêlange des infuſions de foin & du celery, dont je parleray bien-tôt, ne faiſoient point perir les animaux de ces deux liqueurs, & que ce compoſé donne lieu à un ſpectacle tres-réjoüiſſant ; puiſque dans la moindre goutte de ce compoſé le Spectateur y

peut découvrir en un inſtant une douzaine de poiſſons differens les uns des autres, & ſi curieux à voir & à obſerver, que je ne penſe pas que le divertiſſement de la Comédie, celuy de l'Opera avec toute ſa magnificence, ceux des Danſeurs de cordes, des Sauteurs, & des combats d'animaux, que nous voyons dans cette ſuperbe Ville, doivent leur être préferez.

Et il eſt certain que l'étude de ce que nous remarquons dans ces infuſions durant une année, remplit davantage la capacité de l'eſprit, que ne font tous les grands appareils d'un feſtin des plus magnifiques.

Voicy le deſſein d'une autre eſpece de chenille aquatique, qui a été pêchée dans une infuſion à froid de la queuë d'un bouquet, composé d'œillets, de jaſſemin, de tubereuſes, & de quelques autres fleurs; qui n'ayant pû trouver place dans la ſixiéme Planche, a été deſſinée & gravée de toute ſa longueur apparente dans la cinquiéme. Celle-ci differe de la précedente; 1°. En ce qu'elle eſt beaucoup plus longue: 2°. Que ſa queuë marquée 1 eſt composée de trois pointes, au lieu de deux. 3°. Que l'on obſerve deux petits bras à côté du cœur marqué 3, qui luy ſervent d'appuis pour ramper, & pour s'élancer quand elle veut nager; ce que je n'ay pû remarquer dans l'autre. 4°. Que ſes inteſtins marquez 4 ne forment qu'une maſſe, ſans aucune diviſion ou ſeparation qui ſoit apparente.

Enfin l'on n'y découvre ni anneaux, ny filets de nerfs, ny dents de ſcie, ny poils dans la longueur de ſa queuë. Tout le reſte eſt icy de même que dans la chenille précedente.

CHAPITRE XXVII.

De l'infuſion des fleurs d'un Citronier.

LE 14. Aouſt 1713. un de mes Amis ayant mis infuſer à froid des fleurs d'un Citronier, dans de l'eau commune, il y apperçut de trois ſortes de poiſſons en peu de jours, qui ne meritoient pas d'être repreſentez par des figures : mais en continuant ſes obſervations, il en vit d'autres qu'on peut appeller Tortuës. En voicy une repreſentée en 11, comme il l'a vûë. Planche 6. Sa tête, que l'on voit aſſez large, eſt bien courte ; elle eſt ornée de deux cornes, à peu près ſemblables au bois d'un cerf, & comme emboêtée dans l'une des extrémitez de ſon corps, qui paroiſſoit comme couvert d'écailles.

Sa queuë eſt tres-longue, & compoſée de pluſieurs pieces emmanchées l'une dans l'autre ; & quoy qu'on n'ait pû découvrir de pieds ou de nageoires autour du corps de cette tortuë, neanmoins les divers mouvemens que l'on a obſervez dans ſes démarches, font aſſez juger qu'elle en étoit munie.

CHAPITRE XXVIII.

D'une infuſion d'anémone, ſurnommée la Royale.

LA nature qui ſe plaît à diverſifier ſes productions, & qui ſe fait admirer dans tous ſes ouvrages, continuë à nous en donner des preuves dans cette infuſion d'anémone, Planche 6. préparée à l'ordinaire avec de l'eau commune ; puiſqu'au bout d'environ huit jours on apperçut dans une goutte de cette infuſion un animal nouveau, de la groſſeur & de la figure qu'on l'a repreſenté à l'endroit de cette Planche marqué 12.

Tout le deſſus de ſon corps eſt couvert d'un beau maſque

bien formé, de figure humaine, parfaitement bien fait; comme on en peut juger par ce deſſein, où l'on voit ſix pattes & une queuë, ſortant de deſſous ce maſque, qui eſt couronné d'une coëffure ſinguliere.

On voit enfin dans cette Planche, & à côté du nombre 13, une anguille d'une conſtruction particuliere, que je péchay un jour dans l'eau commune qu'on avoit donné à boire depuis quatre heures à un de mes ſerins de Canarie. Cette anguille paroiſſoit blanche & bien tranſparente, n'ayant rien dans l'étenduë de tout ſon corps qui fut capable d'empêcher ſa parfaite diaphaneïté. Elle me parut plus groſſe & plus courte que celles du vinaigre, & d'une compoſition bien differente; puiſque ſa longueur ſembloit être couverte d'une membrane tres-déliée, tournée en ſpirale, formant des anneaux qui rentroient les uns dans les autres, & qui en ſortoient avec une facilité merveilleuſe.

CHAPITRE XXIX.

Des infuſions de trois differentes portions d'une tige de celeri, miſes à part dans divers vaiſſeaux de verre.

LE premier Novembre 1712, je pris une plante de celeri que je mis infuſer à froid dans trois vaiſſeaux de verre, ainſi que nous l'allons dire: Je mis dans le premier vaiſſeau une partie de la tige rompuë en petits morceaux, pour y être mieux rangez; je verſay par-deſſus de l'eau commune, dont j'achevay de remplir le vaiſſeau: je ne mis que de l'eau commune dans le ſecond vaiſſeau, par-deſſus des feüilles vertes de cette plante; & dans le troiſiéme vaiſſeau je mis quelques morceaux de la tige de cette plante, avec des feüilles & de l'eau. (Planche 7.)

Le ſeptiéme jour de ces préparations, j'apperçûs pour la premiere fois des poiſſons dans chacune de ces liqueurs; j'en vis de deux ſortes dans le premier vaiſſeau, & d'une ſeule eſpece dans les deux autres.

Mais

Mais un mois aprés, en examinant exactement chacune de ces liqueurs, je remarquay que ces trois infusions contenoient environ dix sortes d'animaux de diverses grosseurs, de diverses figures, & de differens mouvemens, dont je vais donner une explication particuliere; car il en est de cecy comme d'un Tableau d'histoire qu'un Peintre celebre vient d'achever, & qu'il fait voir à ses amis, qui selon le plus ou le moins de connoissance qu'ils ont de la Peinture, y découvrent plus ou moins de beauté.

Ceux qui sont marquez 1 & 2, sont les plus petits; mais ils surpassent en nombre ceux de toute autre espece qui se trouvent dans les trois vaisseaux. Je les represente icy de la figure & de la grosseur que je les ay vûs avec la lentille d'une ligne & demie de foyer: les plus petits ressemblent à un 8 de chiffre, quand ils sont accouplez, & le plus fort des deux entraîne, en nageant, le plus foible. Planche 7.

Ceux qui sont representez en 2, que je nomme Cornemuses, s'accouplent par le bec, qu'elles ont un peu courbé & assez aigu; on voit que nonobstant cet accouplement, elles ne laissent pas de nager tres-vîte: leur allure est assez agréable à voir; elles voyagent dans la goutte de liqueur en s'enfonçant & se relevant alternativement, & se tenant ainsi, elles s'écartent & se rapprochent l'une de l'autre, sans s'arrêter un seul moment.

Toutes ces Cornemuses ne sont pas entierement semblables; il en est de cela comme des animaux d'un même genre, qui a sous luy differentes especes.

Les unes nagent seules avec une rapidité extraordinaire; pendant que d'autres avancent d'une vîtesse mediocre, & qu'on en voit qui vont tres-lentement: quelques autres demeurent assez long-tems en repos; mais la plûpart sont dans une agitation perpetuelle. Il y en a de longues & de courtes, de blanches argentées, de jaunes dorées, & de brunes.

Une curiosité des plus singulieres, c'est d'observer ce qui se passe au-dedans, & tout autour d'une masse de matiere formée d'une tres-petite pellicule, que les meilleurs yeux ne peuvent découvrir sans Microscope, & qui se prend au hazard à la surface de l'infusion, s'attachant au bout de la tige

la plus menuë d'une plume à écrire, pour les mettre ſur le porte-objet du Microſcope ; car on y voit fourmiller tous les animaux dont nous parlons : ils y ſont en ſi grand nombre, & ils s'y remuent avec tant de vîteſſe, qu'on a de la peine à détourner ſa vûë d'un ſpectacle ſi nouveau & ſi ſurprenant : auſſi croit-on difficilement ce que j'en dis, ſi je n'étois prêt de faire obſerver toutes ces choſes à ceux qui en voudroient douter. Il s'en voit dans de certains endroits quelques-uns d'accouplez differemment ; ailleurs il y en a qui s'arrêtent faiſant le guet comme des ſentinelles, qui ſemblent appréhender d'être ſurpriſes, tandis que d'autres pour aller à la découverte, s'éloignent de la maſſe, puis s'en rapprochent, comme s'ils avoient quelque choſe à faire entendre à ceux qui demeurent aux environs.

On voit ſouvent dans une autre goutte de la même infuſion, priſe dans un autre endroit du même vaiſſeau, un ſpectacle tout nouveau, qui donne beaucoup plus de plaiſir que l'on n'en a eu auparavant. On y découvre, par exemple, des eſpeces de poiſſons longs & plats, que j'appelle des ſolles : les voicy repreſentées dans les endroits marquez 3, 3, comme nous les avons vûës. L'endroit de ce poiſſon le plus aigu, eſt la tête ; le reſte de ſon corps eſt tranſparent, à la reſerve de quelques petites taches brunes que l'on y voit en dedans. Les changemens de poſtures, & la varieté des mouvemens que l'on remarque en ces inſectes, font beaucoup plus de plaiſir à voir, & donnent plus de ſatisfaction, que ne feroit tout ce que l'on en pourroit lire dans une deſcription particuliere.

Dans le vaiſſeau où il n'y a que des feüilles en infuſion, on y découvre entr'autres animaux, des poiſſons ſemblables à ceux qui ſont exprimez dans les endroits marquez 6. On voit immédiatement au-deſſous, au-deſſus, & à côté de ce chiffre, une ouverture aſſez conſiderable qui paroît tantôt ronde & tantôt ovale, ſelon qu'elle ſe preſente à nous. Cette grande ouverture eſt la bouche de ce poiſſon, qui diminuë ſi fort dans de certains momens, qu'on ne la peut plus appercevoir. Le nager de ce poiſſon s'execute en dandinant, de ſorte qu'on le voit balancer, tantôt à droit, puis à gau-

che, ſe conduiſant en apparence par des mouvemens circulaires qu'il fait de ſa tête. L'on s'apperçoit encore qu'il change de figure en ſe pliant & repliant, en s'arrondiſſant tout à coup en forme de boule, puis s'allongeant tres-vîte pour ſe remettre dans ſon état naturel. On voit par ces deſſeins qu'il va en diminuant de groſſeur depuis la tête juſqu'à la queuë, qui le plus ſouvent n'eſt pas terminée en pointe; car il reſſemble à un pain de ſucre coupé vers le ſommet par un plan parallele à ſa baſe.

Ce poiſſon meurt le premier de tous ceux qui ſe trouvent dans la petite goutte de la liqueur, miſe en experience ſur le porte-objet du Microſcope; & un peu avant que d'expirer, on le voit ſe mettre en un petit peloton, dont la ſuperficie paroît raboteuſe & inégale.

Les animaux dont je viens de parler ſont ſi délicats, qu'ils perdent entierement leur conſiſtance, dés que la goutte de liqueur où ils nageoient ſe trouve évaporée.

Et quoy que tous ces poiſſons nagent tres-vîte dans une étenduë qui n'a pas plus d'une ligne de diametre, & qu'ils y ſoient en tres-grand nombre, neanmoins les uns & les autres s'évitent avec tant d'adreſſe, qu'on n'en voit point s'entre-choquer; ce qui marque qu'ils ont des yeux.

Il n'en eſt pas de même d'une autre eſpece de poiſſons, qui ſe découvrent parmy ceux dont j'ay déja parlé, & dont la plûpart ſemblent n'avoir ny tête ny yeux : nous les avons repreſentez aux endroits marquez 4, 4, 4; on voit leur corps ſe terminer par une longue queuë blanche & tranſparente. Nous ſommes portez à croire que ces animaux n'ont point d'yeux; parce que faiſant route ils n'évitent aucun des corps qui ſe trouvent dans leur chemin : on s'apperçoit qu'ils reculent dés le moment qu'ils ont touché à ces obſtacles; auſſi remarque-t-on qu'ils avancent ſouvent tres-lentement, ainſi que font les aveugles des Quinze-vingts, lorſqu'ils marchent dans les ruës de cette Ville, où il y a d'ordinaire beaucoup d'embarras.

Au bout de la queuë de ces ſortes de poiſſons, on y voit ſouvent une petite portion de la pellicule qui ſe forme ſur la ſurface de l'infuſion d'où on les a tirez : ils la traînent aprés

eux quand elle ne tient point au porte-objet où l'on met la liqueur ; mais lorſqu'elle y tient de maniere que ne pouvant l'en détacher, ils reculent vers elle tout à coup, & s'en éloignent de nouveau tres-lentement.

Dans la moindre goutte de liqueur que j'aye pû prendre dans le troiſiéme vaiſſeau où ſont mêlées les feüilles, la tige & la racine ; j'y ay trouvé une ſi grande multitude de petits animaux marquez 1, que ceux dont on a parlé cy-devant avoient de la peine à les traverſer en nageant entr'eux. Et voilà ce que j'ay pû obſerver depuis le commencement de ces infuſions, juſqu'au troiſiéme Decembre 1712.

Trois jours aprés l'examen des experiences précedentes ; je remarquay que tous ceux à qui j'avois fait voir une partie des choſes que nous venons de décrire, prenoient un plaiſir ſi grand à les conſiderer, qu'ils avoient peine à quitter le Microſcope préparé d'une ſeule goutte de l'une ou de l'autre des infuſions du celeri, dont je viens de parler ; en ſorte que pour examiner ce qu'ils appercevoient dans ces trois differentes infuſions, il auroit ſuffi d'un ſeul Spectateur pour m'occuper durant une heure, & quelquefois plus, à préparer le Microſcope, & à répondre aux difficultez qu'il m'auroit fait l'honneur de me propoſer ſur ce qu'il voyoit, ce qui m'obligea de penſer à une experience que voicy ; en ſorte que s'il arrivoit qu'elle pût réüſſir, elle ſeroit tres-commode pour diminuer des deux tiers le tems qu'il falloit employer pour obſerver les infuſions qui étoient dans les trois vaiſſeaux de verre que je faiſois voir l'une aprés l'autre ; & même pour tranſporter dans un ſeul vaiſſeau une liqueur où il y auroit dans la moindre goutte qu'on en puiſſe prendre, de toutes les diverſes eſpeces d'animaux qui ſeroient dans les trois infuſions de celeri.

Pour voir ſi cela réüſſiroit, comme je me l'étois imaginé ; je pris avec une petite cuëilliere à caffé, une portion de l'eau de chaque infuſion, que je verſay ſur un linge fin mis au-deſſus d'un petit verre pour l'y recevoir, aprés avoir traverſé les pores de ce linge ; & immédiatement aprés je mis une petite goutte de cette eau ſur le porte-objet de mon Microſcope, & j'y apperçûs des animaux d'une beauté à faire plaiſir, &

de toutes les especes que j'avois vûës dans les trois infusions examinées séparément, à la reserve de ceux en qui j'avois observé une longue queuë, & que j'ay nommez Aveugles; dont je ne fus pas surpris; car cette queuë & la pellicule qui s'y attache tres-communément, suffisoient pour faire obstacle à leur passage, au travers des pores tres-petits du linge dans lequel je les mettois comme dans un tamis.

Le plaisir que m'avoit d'abord causé la réüssite de cette experience ne dura pas long-tems, puisqu'environ trois heures aprés je m'apperçûs par une seconde épreuve que presque tous les poissons de deux especes étoient déja morts, & qu'il y en étoit resté tres-peu des autres à proportion de ce qu'il y en devoit avoir. Enfin le lendemain en examinant cette même liqueur, je la trouvay encore dénüée d'une partie de ceux qui y étoient restez le jour précedent.

Je ne suis pourtant pas fâché d'avoir imaginé ce mêlange; car quoy qu'on ne puisse pas conserver tous les animaux qui s'y remarquent d'abord, on ne laisse pas d'avoir bien du plaisir à observer le spectacle qu'elle nous presente; & l'on peut dire qu'il en est de cela comme d'une Piece d'anatomie qui paroît tres-belle, & tres-propre à faire admirer l'adresse de l'anatomiste, pour nous faire voir tout d'un coup des beautez surprenantes, qui ne subsistent souvent qu'autant de tems qu'il en a employé dans sa préparation.

On voit encore de gros poissons ovales, comme en 5, dont on ne peut distinguer l'endroit où est la tête, que par leur divers mouvemens, à cause de l'égalité de figure & de grosseur qui se remarquent aux extrémitez du plus grand diametre du profil de ces poissons.

Dans une seconde infusion des feüilles du celeri j'y ay vû un nouveau poisson, dont on voit la figure & la grosseur apparente au-dessous du chiffre 7: la tête répond au chiffre 8, où l'on découvre comme des poils mouvans de tems en tems. Son allure est tres-lente, & sa figure inconstante, paroissant tantôt sous la forme d'une Cornemuse, & tantôt sous celle d'un Croissant.

On apperçoit aussi souvent des mittes dans l'infusion de la tige du celeri, mise sur le porte-objet du Microscope, où

on les voit marcher d'une grande vîteſſe.

Dans une troiſiéme infuſion de celeri je n'ay point apperçû tant de ſortes d'animaux, qu'il y en avoit dans les deux premieres, à cauſe que les deux vaiſſeaux où je mis infuſer ce dernier celeri, avoient ſervi à mettre en infuſion de l'oignon dans l'un des deux, & un poreau dans l'autre ; quoyque ces deux vaiſſeaux euſſent été bien lavez auparavant d'y mettre le celeri.

Les poiſſons, que je nomme Aveugles, ouvrent ſouvent de grandes bouches, & alors on apperçoit que tous les petits corps, qui n'en ſont qu'à un pouce de diſtance apparente, ſemblent s'y précipiter ; enſuite on voit qu'ils s'en écartent par les côtez, comme ſi cet animal les repouſſoit avec vîteſſe.

On voit auſſi aſſez ſouvent qu'en quelques-uns de ces derniers poiſſons, une partie de leur queuë eſt tournée comme un tire-boure.

Entre 9 & 10, on voit un autre poiſſon de figure ſphéroïde ; il prend auſſi de tems en tems celle qui eſt au-deſſous du chiffre 11, & d'autres fois celle que l'on voit au-deſſous de 12 ; & c'eſt dans cette derniere qu'on le voit commencer à ſe mouvoir d'une vîteſſe ſi extraordinaire & ſi ſurprenante, qu'il n'eſt pas poſſible de la pouvoir exprimer ; & de tems en tems on leur voit faire des culbutes qui ont du rapport avec quelques-unes de celles que font nos Sauteurs, qui mettent leur têtes entre leurs genoüils, pour tourner en roulant ſur une ſuperficie plane, ou ſur un chemin uni pratiqué ſur le penchant d'une montagne.

Nous fîmes enſuite diverſes autres infuſions de celeri ; dans leſquelles nous apperçûmes quelques autres poiſſons differens des précedens : on en voit un au-deſſous du chiffre 13, qui reſſemble aſſez à une bouteille.

A l'endroit marqué 14, on y voit trois cornemuſes aſſez groſſes, deux deſquelles paroiſſent accouplées d'une autre façon que celles qui ſont en 2.

Enfin au-deſſous du chiffre 15, on y voit un poiſſon des plus extraordinaire que l'on en puiſſe voir : il eſt preſque tout rond, & ſon corps eſt tout couvert de poils : ſon mouvement

est à peu prés semblable à celuy d'une piroüette qui tourne sans guéres changer de lieu.

J'ay remarqué que l'infusion du celery se gêle plus difficilement que celles du foin, du poivre, des écorces de plusieurs sortes de bois infusées séparément, &c. d'où l'on peut conjecturer que le mouvement particulier des parties de cette eau de celery, est plus grand que n'est celuy de celles des infusions dont je viens de parler.

CHAPITRE XXX.

De plusieurs infusions de paille & d'épis de bled.

AU commencement du mois de Mars de l'année 1714, je mis infuser à froid de la paille de bled & deux épis, dans de l'eau de fontaine; & dés le second jour de cette infusion, j'y apperçûs des poissons representez sous le chiffre 1, que je nomme Cornemuses.

Il s'y en trouva aussi plusieurs autres semblables à celuy qui est marqué 2, que je nomme Urinal, dont la bouche est au-dessous de la lettre A: le dedans de leurs corps étoit rempli de quantité de petits corpuscules, les uns blancs & transparens, & les autres bruns. Parmi ces deux sortes de poissons, j'y en apperçûs d'une troisiéme espece, que j'ay nommez Rognons argentez: on les voit representez au nombre de quatre, formant un groupe autour du chiffre 3, & tournant chacun suivant l'ordre des lettres A C B. Ils se mouvent aussi d'un mouvement direct & assez lentement. Planche 8.

Le corps de ce poisson est de couleur d'argent mat; & quoyqu'il soit parsemé de petits corps bruns en des endroits, & tout-à-fait opaques en d'autres, il ne laisse pas d'être assez transparent: la tête se voit en A, le derriere en B, & son dos en C.

Une autre espece de petit poisson se fit voir sous une forme ovale, de la longueur d'une ligne ou environ. Peu de jours aprés j'y en apperçûs d'une quatriéme espece, que j'ay

nommé Bouteille dorée, à cauſe de ſa figure la plus conſtante, & de ſa couleur.

La bouche A de ce poiſſon s'applique quelquefois ſur un corps rond qui s'y attache fortement, de maniere qu'ils paroiſſent enſuite ne compoſer qu'une maſſe, qui reſſemble à une gourde figurée en 6. Et ce qu'il y a de plus ſurprenant, eſt de voir ce poiſſon continuer ſon nager avec ſa proye.

Une cinquiéme eſpece de poiſſon que j'ay nommé Solles dorées, à cauſe de ſa figure & de ſa couleur, eſt vûë icy dans toute ſa longueur, qui eſt tres-conſiderable; puiſque depuis ſa tête qui eſt en A, juſqu'à ſon autre extrémité B, il y a environ vingt lignes : ſa forme n'eſt pas conſtante, puiſqu'on le voit ſe raccourcir & s'allonger de moment en moment pendant ſon nager, qui s'execute tres-vîte, & en diverſes façons.

On juge facilement que ce poiſſon eſt plat, à peu prés comme une ſolle; parce que durant ſon nager on voit ſenſiblement augmenter & diminuer la largeur de ſon corps.

Voicy une ſeptiéme eſpece d'inſecte que nous avons nommé Aveugle, mais qui differe en quelque choſe des précedens. L'endroit A déſigne leur bouche, qui eſt quelquefois ſi grande, qu'elle ſurpaſſe la largeur de leur corps. B C eſt la queuë de ces poiſſons, au bout de laquelle on voit une pellicule qu'ils traînent aprés eux.

On découvre encore de petits poiſſons de figure ovale; qui ſont de diverſes groſſeurs, parmi leſquels il y en a qui ſont en tres-grand mouvement, pendant que d'autres ſemblent être dans un repos ſi grand, qu'on n'auroit pas de peine à croire qu'ils ſont morts, ſi on ne les voyoit pas, comme on fait, prendre tout à coup l'eſſort : vous les voyez repréſentez entre les queuës de deux aveugles.

Des Sygnes.

JE donne le nom de Sygnes à de certains poiſſons que j'ay vûs dans cette même infuſion de paille; parce que j'y trouve quelque reſſemblance exterieure : en voicy trois à côté des chiffres 8, 8, 8. L'endroit A marque l'extrémité de leur

leur tête ; B, l'extrémité de la queuë ; & C, un gros ventre. Il s'en voit souvent de deux especes dans une même petite goutte de cette infusion ; les uns étant tres-transparens, & les autres assez bruns au-dedans du corps, où l'on voit leur visceres en mouvement. Leur nager s'execute assez lentement, & d'une maniere grave, soit en avançant, soit en reculant, ou en tournant.

Ils retirent souvent la tête vers l'endroit marqué 8, comme s'ils avoient peur de ce qu'ils apperçoivent, en tournant leur tête d'un côté & d'autre : j'en ay vû un dont le milieu du corps sembloit être resserré ou diminué de largeur.

Les poissons 9, 9, sont ceux que j'ay nommez Araignées aquatiques, ou Goulus, & dont je dois parler assez au long dans le Chapitre XXXII. de cette seconde Partie.

A l'égard de celuy qui est marqué 10, il est le seul de son espece que j'aye vû dans l'infusion de paille de bled ; sa figure approche assez de celle d'une bourse, ou d'un pot au lait que nos laitieres portent sur leur tête : sa bouche qui est fort grande, & qui se voit ouverte, se ferme totalement lors qu'il s'allonge pour nager, de maniere qu'on perd de vûë ses deux cornes, que l'on voit courbées en dedans.

Au-dessous du chiffre 11, on voit un poisson qu'on peut nommer la petite Solle.

12 & 14, sont deux poissons de couleur d'eau, dont le mouvement étoit des plus lents & des plus difficiles à voir, à cause de leur petitesse, qui est environ mille fois au-dessous de celle d'un cheveu.

Enfin 13 est un poisson, ou plutôt un ver composé d'un grand nombre de tres-petits anneaux tournez spiralement ; & dont les extrémitez sont terminées en pointes tres-longues & tres-fines. Le corps de ce ver est presque immobile, c'est pourquoy il est besoin d'une grande attention pour le suivre dans son allure ; & l'on a besoin d'un Microscope aussi parfait que l'est celuy dont je me sers pour cela.

Voilà tout ce qui est contenu dans cette huitiéme Planche. Et voicy maintenant l'explication de ce qui se voit representé dans la neuviéme.

Des Grenades aquatiques, couronnées & barbuës.

J'Ay donné le nom de Grenades aquatiques, couronnées & barbuës, aux poiſſons que nous avons repreſentez dans cette Planche; parce qu'ils m'ont paru avoir quelque reſſemblance exterieure à ce fruit. Je commençay à les appercevoir le matin du premier Juillet, dans une tres-petite goutte de l'infuſion de paille de bled, en me ſervant d'une lentille d'une ligne & demie de foyer.

Planche 9.

Ces animaux me parurent d'une belle couleur d'ambre, claire & tranſparente; ce qui me donnoit le moyen d'obſerver toutes les parties interieures de ce poiſſon, que j'appercevois des plus brillantes que j'aye encore vûës. La diverſité des formes ſous leſquelles ce poiſſon s'eſt fait voir, m'oblige de dire quelque choſe de chacune en particulier. Dans la premiere figure on voit quatre petites éminences au-deſſous des lettres ABCD, garnies de poils, qui ne reſtent pas long-tems dans cette ſituation: celle qui répond immédiatement au-deſſous de B, ſe joint à celle qui eſt marquée par A; & celle qui eſt au-deſſous de C ſe joint à D, & ſi intimement, que le tout paroît alors, ainſi que cela eſt vû en la deuxiéme figure au-deſſous des lettres AD. Ces éminences groſſies, forment les lévres écartées de la bouche de ce poiſſon, dont le jeu des poils, que l'on voit mouvoir d'une maniere aſſez uniforme, oblige tous les petits corps, qui ſont à peu de diſtance de ces lévres, d'entrer dans ſa bouche, & d'où la plûpart ſont repouſſez avec autant de vîteſſe, qu'ils en avoient eu pour y entrer.

Toutes les éminences marquées ABCD, de la premiere figure, ou les deux de la ſeconde, ſe retirant quelque peu vers E, découvrent une eſpece de couronne à quatre pointes, ſemblable à ce qui paroît au-deſſous du chiffre 3; mais cette couronne ſe voit bien-tôt recouverte des mêmes éminences ABCD, qui ſont tres-mobiles.

On apperçoit un corps en E, dans chacune de ces figures, que je crois être le cœur du poiſſon; parce qu'il paroît toujours dans un mouvement égal, & qu'on y remarque,

comme au nôtre, un ſyſtole & un diaſtole. Ce cœur a une liaiſon tres-étroite avec le corps marqué F, qui eſt plus gros que luy, & qui peuvent paſſer pour les inteſtins de cet inſecte, qui ſont toujours dans un mouvement qui me paroît aſſez régulier : & il faut obſerver que cette mutuelle correſpondance qui eſt entre le cœur & le viſcere F, vient de ce qu'il y a deux filets de nefs, ou deux petits ligamens en G, qui vont de l'un à l'autre, comme on le peut remarquer avec un peu d'attention.

Le cœur ſemble être diviſé en deux lobes, que l'on apperçoit s'écarter & ſe rapprocher l'un de l'autre, en de certains tems ; ce qui pourroit bien donner occaſion de penſer que ce ſont les poulmons de ce poiſſon qui environnent ſon cœur ; & c'eſt ce que je laiſſe à deviner aux fameux Medecins, & à nos plus illuſtres Anatomiſtes.

Le derriere de ce poiſſon paroît rond & fermé en de certains momens, & ouvert en d'autres ; & alors on apperçoit deux petites éminences pointuës, comme on voit en H de la premiere figure.

J'en ay vû un ſeul, repréſenté en la quatriéme Figure, qui avoit quatre de ces petites éminences aiguës, placées deux d'un côté de l'anus, & deux de l'autre.

C'eſt par cette ouverture que l'on voit ſortir & rentrer, avec beaucoup de vîteſſe, une longue queuë i l, qui eſt beaucoup plus groſſe vers la racine i, qu'elle n'eſt ailleurs. L'extrémité L de la queuë de quelques-uns de ces poiſſons, paroît fourchuë : cette queuë eſt ſi blanche & ſi tranſparente, qu'on en peut tres-facilement découvrir la méchanique, & expliquer tous les mouvemens qu'on y remarque, avec autant de facilité qu'un bon Anatomiſte en a pour expliquer tous ceux que nous faiſons faire volontairement à la plûpart des parties qui compoſent notre corps. Cette queuë qui eſt tres-mobile rentre totalement dans le corps de ce poiſſon ; de maniere qu'y étant, les inteſtins qui ſont en F la cachent entierement ; d'ailleurs les petits anneaux qui la compoſent rentrant les uns dans les autres, ne permettent pas un libre paſſage à la lumiere ; ce qui fait qu'elle n'eſt plus viſible.

On voit de gros œufs attachez au derriere de cet animal,

par le moyen de quelques filets presque imperceptibles : il y a de ces femelles qui n'en portent qu'un, il y en a qui en portent deux, & quelques-unes jusqu'à six, ce qui est assez rare; & lorsqu'on y en voit tant, ils sont plus petits que quand il y en a moins.

La queuë de ce poisson frotte ces œufs à l'entrée & à la sortie de son corps, tournant de côté & d'autre avec beaucoup de souplesse : ces œufs paroissent tres-réguliers, & bien brillans pendant qu'ils sont pleins ; mais dés qu'ils sont vuides, on les voit tout plats & sans rides, sous une forme ovale, plus transparens qu'ils ne l'étoient étant pleins; & quoyque vuides, les meres les portent presque toujours attachez en croupe, & en nageant, comme elles les portoient auparavant : j'en ay vû un seul separé du corps de ce poisson, flotant dans la petite goutte d'eau mise en experience sur le porte-objet du Microscope : cet œuf paroissoit immobile de même que tout ce qui étoit au-dedans. J'ay aussi vû deux de ces œufs dans le corps d'un de ces poissons, qui paroissoient comme on les voit au-dessous des lettres G G, Fig. 6.

Ces poissons sont tres-réjoüissans à voir, particulierement quand ils font des culbutes, parce qu'ils les executent avec beaucoup d'adresse. Il s'en voit quelques-uns qui tournent circulairement, tantôt d'un côté & tantôt d'un autre, à l'entour du point F, qui est le centre de pesanteur de l'animal.

Dés que la liqueur est mise sur le porte-objet du Microscope, on les voit nager tres-librement en avant; quelques-uns s'arrêtent ensuite, & c'est dans ce moment qu'ils donnent le tems de bien observer toutes les circonstances dont nous parlons.

Ils se frottent quelquefois l'un contre l'autre; ils se détournent sans se choquer, & on les voit éviter tout ce qui s'oppose à leur chemin d'une maniere si adroite, que bien qu'on ne voye pas leurs yeux, on ne peut pas douter qu'ils n'en soient munis, & de tres-bons.

De tems en tems ils appuyent le bout de leur queuë sur le porte-objet du Microscope, & dés ce moment-là on voit qu'ils avancent tout le corps au-delà de ce point; qu'ils l'en approchent ensuite & l'en éloignent; puis ils reprennent leur

allure ordinaire en nageant, ſans qu'on puiſſe remarquer aucune patte ni aucune nageoire autour de leur corps.

Le 22. Juillet j'apperçus, dans une goutte de l'infuſion dont je viens de parler, une chenille aquatique ; & j'ay remarqué que les Grenades aquatiques dont je finis icy l'hiſtoire, ſoutiennent mieux les grandes chaleurs qu'aucun des plus gros poiſſons que j'aye cy-devant obſervé dans les infuſions précedentes ; puiſque pour l'ordinaire les gros meurent dans ce tems-là plutôt que les petits, ce qui n'eſt point encore arrivé à ceux de cette infuſion, où je viens d'en voir juſqu'à quatre dans une tres-petite goutte, quoyque la chaleur ſoit fort grande ce jour 28. Juillet.

CHAPITRE XXXI.

De la paille d'orge, de celle du ſégle, de celle d'avoine, & du bled de Turquie ; chacune de ces choſes miſe ſéparément en infuſion dans de l'eau commune.

JE n'ay pas rapporté dans le Chapitre précedent tout ce que j'ay vû dans les differentes infuſions que j'ay faites de la paille de bled ; je me ſuis contenté de dire ce que j'y ay découvert de plus remarquable, m'étant reſervé d'avertir dans celuy-cy, que l'air contient dans une ſaiſon ce qu'il ne contient pas dans une autre ; & que les animaux qui régnent dans un même lieu durant une année entiere, ſont ſouvent differens de ceux qui s'y voyent dans un autre. Ce ſont ces varietez qui occupent agréablement les perſonnes qui ſe donnent la peine de continuer leurs obſervations, & même d'en faire en differens lieux, conſiderablement éloignez l'un de l'autre. Par ces diverſes experiences on s'éclaircira de pluſieurs faits, & l'on ne ſera pas ſurpris ſi l'on ne découvre pas toujours les mêmes choſes dont je parle, ni pourquoy on en découvrira d'autres dans une ſemblable infuſion dont je n'ay rien dit ; parce que les nouveaux inſectes qu'on y aura apperçûs me ſeront échapez, ou peut-être à cauſe que durant la

ſaiſon que j'avois priſe pour faire cette experience, il ne s'y en trouva point de la même eſpece.

J'ay remarqué, par exemple, dans toute l'année 1714, & dans une partie de 1715, un grand nombre de groſſes araignées & de chenilles aquatiques, dans ſept ou huit infuſions differentes; ce qui ne m'étoit pas encore arrivé.

Les differentes infuſions à froid de paille d'orge, d'avoine, de ſégle, & d'eau commune, faites ſéparément dans des vaiſſeaux bien nets, nous ont fournies de tres-beaux poiſſons; de même que deux autres infuſions de bled de Turquie faites en divers tems.

CHAPITRE XXXII.

De l'écorce de bois de chêne qui porte le gland, miſe en infuſion dans de l'eau commune.

ENviron le quinze Decembre de l'année 1714, je mis infuſer à froid de l'écorce de bois de chêne dans de l'eau commune, dont je remplis un grand verre à boire, & durant l'eſpace de plus d'un an j'y apperçûs ſucceſſivement tous Planche 10. les poiſſons repreſentez dans cette Planche, à chacun deſquels j'ay donné un nom particulier; de ſorte que j'ay jugé à propos de nommer le premier, la Tortuë, ou le poiſſon à la queuë umbilicale: cet inſecte s'allonge & ſe raccourcit tres-facilement; il prend de tems en tems une figure ronde qu'il ne conſerve qu'un moment: on luy voit quelquefois ouvrir la bouche d'une grandeur ſurprenante, par rapport à la groſſeur de ſon corps; & ſes lévres, qui forment à peu prés la circonference d'un cercle, ſont garnies de petits poils, dont le jeu fait plaiſir à voir, à cauſe que ce mouvement particulier oblige une partie des petits corps, qui ſe trouvent correſpondre vis-à-vis de luy, d'aller ſe précipiter dans ſon eſtomac, où vray-ſemblablement la partie qui doit ſervir à le nourrir, demeure; tandis que le reſte eſt vû s'en éloigner avec vîteſſe. Son allure eſt des plus ſinguliere que l'on puiſſe

voir ; vous en jugerez vous-même par ce que j'en vais dire : ſa queuë que l'on voit attachée à ſon corps, à peu prés comme le cordon l'eſt au nombril d'un enfant qui vient de naître, luy ſert comme d'un gouvernail pour luy procurer preſque tous les mouvemens qu'on luy voit faire. Cette queuë eſt fort groſſe vers ſa racine, & bien aiguë par ſon autre extrémité, où elle ſe diviſe en deux parties encore plus aiguës, qui ſe joignent ſi exactement, qu'il ſemble aprés cela ne faire plus qu'un tout ſans aucune ſéparation.

Il arrive quelquefois que ce poiſſon attache les bouts écartez de cette queuë ſur le porte-objet du Microſcope ; & ſur ce lieu-là il tourne tout ſon corps, en preſentant aux yeux du Spectateur tantôt ſon dos qui eſt convexe, comme le deſſus de l'écaille d'une tortuë, & tantôt ſon ventre qui paroît concave, comme le deſſous de la même écaille.

Et il faut remarquer que l'extrémité d'en-bas de ce poiſſon eſt ſi tranſparente, que ſa queuë eſt également vûë, comme ſortant de ſa partie convexe ou de la concave.

La ſeconde figure eſt un autre poiſſon à la queuë umbilicale, qui ne differe du premier qu'en ce qu'il a la bouche fermée, & que ſa queuë paroît n'avoir aucune ſéparation.

Et la troiſiéme repreſente encore un autre poiſſon de la même eſpece que le précedent, quoyque ſous une forme un peu differente. Ce poiſſon paroît ainſi à cauſe qu'il retire en arriere la partie ſuperieure de ſa tête qui eſt double, & dont les deux avances, en forme de cornes, étoient entierement couvertes.

Le quatriéme poiſſon ſera nommé le rat d'eau, à cauſe de quelque reſſemblance qu'il a avec cet animal : ſa tête paroît fort bien marquée, & ſes lévres garnies de longs poils, dont le mouvement produit le même effet que pluſieurs autres, dont on a parlé plus haut.

Le cinquiéme poiſſon ſera nommé la patte d'écreviſſe, à cauſe des deux becs recourbez qu'on luy voit, dont le mouvement eſt tres-lent, de même que l'eſt celuy de tout ſon corps, qui fait tres-peu de chemin en bien du temps ; ce qui facilite le moyen de l'obſerver exactement, & de remarquer dans preſque toute la longueur de ſon corps un aſſez

bon nombre de petits globules dorez & brillans.

Le ſixiéme poiſſon ayant à peu prés la figure d'une maſſuë, ſera ainſi nommé : ſa tête eſt fort groſſe par rapport au reſte de ſon corps qui ſe termine en pointe : le dedans de ſon corps eſt ſemé de petits grains tranſparens & opaques, qui ſe font voir diverſement ſelon la maniere dont ils renvoyent la lumiere qu'ils ont reçûë.

Je nommeray celuy qui eſt marqué 7, la féve de vers à ſoye ; parce que le corps de ce poiſſon eſt compoſé de pluſieurs anneaux, & de pluſieurs fibres longitudinales, qui ſervent à le faire allonger & à le raccourcir avec beaucoup de facilité. La figure de ſa tête paroît peu differente de celle de ſa queuë, & on ne la diſtingue guére que par ſon nager.

Le huitiéme poiſſon ſera nommé Spheroïde, à cauſe qu'il reſſemble exterieurement à un œuf, dont les bouts ſont égaux & bien arrondis.

Sa tête eſt vûë en haut, & un peu au-deſſous on y voit un petit corps qui ſe meut tres-régulierement, ce qui me fait penſer que ce pourroit bien être le cœur de ce poiſſon ; & plus bas on apperçoit pluſieurs petits corps ronds & de diverſes groſſeurs, qui ſont peut-être des œufs, que l'on voit agitez par les divers mouvemens du poiſſon, qui s'allonge & ſe raccourcit, qui ſe plie & déplie diverſement en nageant.

Lorſqu'on donne quelque attention à conſiderer le grand nombre d'œufs que l'on voit dans le corps de ces poiſſons, l'on n'eſt pas ſurpris d'un autre nombre prodigieux de ces animaux, qui ſe voit dans la moindre goutte que l'on puiſſe prendre de cette infuſion, & l'on ceſſe par-là d'admirer cette multitude étonnante qui paroît & qui diſparoît en peu de tems ; puiſque l'on ceſſe d'en voir de cette nature au bout d'environ huit jours, & qu'en leur place il s'en preſente de nouveaux aux yeux des ſpectateurs attentifs, qui n'en ſont pas moins touchez qu'ils l'ont été des précedens.

En voicy de pluſieurs ſortes qu'on peut nommer anguilles, qui different entr'elles, & qui different encore de celles du vinaigre ; en ſorte que l'on pourra inferer de-là que ce ſont des poiſſons d'un même genre, & de differentes eſpeces.

Celle qui ſe voit repreſentée au-deſſous du chiffre 9, m'a

paru

paru blanche & tranſparente, quoyque preſque toute la longueur de ſon corps fut parſemée d'un grand nombre de petits grains brillans.

Sa groſſeur étoit bien conſiderable, par rapport à ſa longueur, qui paroiſſoit n'avoir au plus que deux pouces ; & la grande vîteſſe de ſon mouvement, qui ne luy faiſoit parcourir que tres-peu d'eſpace en aſſez de tems, marque bien en quoy celle-cy differe des autres.

J'en ay vû deux d'une même eſpece dans la ſeconde infuſion que j'ay faite d'une ſemblable écorce, qui appuyoient de tems en tems l'extrémité de leurs queuës ſur le porte-objet du Microſcope, & qui faiſoient autour de ces points fixes pluſieurs mouvemens aſſez agréables à obſerver. La longueur apparente de chacune de ces anguilles étoit d'environ deux pouces, & la groſſeur à peu prés comme celle du tuyau d'une plume de corbeau.

Au-deſſous du chiffre 10. il s'en voit une autre, dont la longueur apparente étoit d'environ cent lignes, & ſa groſſeur dans l'endroit le plus épais de tout ſon corps, pouvoit être de quatre lignes de diametre.

Sa bouche, qu'elle ouvroit de tems en tems, paroiſſoit ronde, & toute la longueur de ſon corps étoit munie d'un bon nombre de filets tres-menus qui ne ſe faiſoient pas voir à tous momens ; & au lieu de ces filets on découvroit dans d'autres tems une ligne ſpirale qui occupoit une étenduë conſiderable de la longueur de ſon corps ; ce qui ſuffit pour expliquer le mouvement de cette groſſe anguille, qui étoit aſſez lent pour donner le tems de l'obſerver agréablement à la lumiere d'une chandelle, & de voir une belle varieté de couleurs dans l'étenduë d'une partie de la longueur de ſon corps, & particulierement un rouge tres-vif tirant ſur le pourpre : mais lorſque cet animal venoit à ſe raccourcir, en rapprochant l'un de l'autre tous les contours ſpiraux du filet dont je viens de parler ; toute cette varieté admirable de couleurs s'effaçoit, & dans ce moment le tout devenoit brun.

Au-deſſous du nombre 11, on y voit une autre anguille d'une grande vivacité, qui plie, déplie & replie tout ſon corps en arc, ſe débandant d'un ſens tout contraire au pre-

mier, pour reprendre ſubitement la courbure qu'elle avoit auparavant, continuant ainſi ce manége ſans changer que tres-peu de place, n'en occupant qu'autant qu'il luy en falloit pour executer ſes courbures.

Le nombre 12. repreſente une groſſe anguille morte depuis peu de tems; je l'obſervay le 9. Mars 1715. à la lumiere d'une chandelle : ſa longueur me parut d'environ ſix pouces, & ſa plus grande épaiſſeur étoit d'environ trois lignes. Ce fut comme par hazard que je découvris vers ſa queuë une petite anguille d'environ deux pouces apparens de longueur, qui ſe tremouſſoit beaucoup pour ſortir du ventre de ſa mere; mais n'en pouvant venir à bout, elle y mourut enfin. Cette obſervation ſemble ſuffire, pour nous aſſûrer que les œufs de ces anguilles ſont couvez au-dedans du corps des meres, & qu'il n'eſt pas facile de parvenir à de ſemblables découvertes, à cauſe de la vîteſſe du nager de ces poiſſons; cependant voicy un moyen ſûr pour y arriver; car il n'y a pour cela qu'à attendre que la petite goutte de vinaigre ſoit preſque toute évaporée, afin que la lenteur du mouvement des anguilles facilite la découverte de ce qu'elles contiennent.

Ces obſervations étant faites à la lumiere d'une chandelle, la diſtinction de l'objet en ſera plus belle qu'elle ne ſeroit à celle du jour; parce que pouvant s'appuyer ſur une table, le Microſcope en ſera tenu plus ferme; & d'ailleurs on reçoit moins de faux rayons de lumiere, que ſi l'on obſervoit ces mêmes choſes à celle du jour.

Par ce moyen nous eûmes le plaiſir d'obſerver dans la ſuite deux anguilles, durant prés de deux heures, parcourant une étenduë interieure du corps d'une même mere, où elles alloient de la queuë vers la tête, puis revenant de-là vers la queuë.

Le 13^e^. poiſſon ayant quelque reſſemblance avec la navette d'un Tiſſerand, on luy pourra donner ce nom : ſon nager s'execute également, ſoit en avançant ſoit en reculant : lors qu'il s'eſt allongé on le juge avoir à peu prés deux pouces de longueur, & environ quatre lignes de groſſeur, priſes vers le milieu de ſon corps, où l'on voit d'autres petits corpuſcules qui ſemblent être des œufs,

Les extrémitez de ce poiſſon ſe courbent differemment, de ſorte qu'elles ſemblent luy ſervir de gouvernail, & en même tems de nageoires.

Le 14^{e}. poiſſon peut être nommé le bec de Corbin, par rapport à la courbure de ſa tête, qui ſe termine en pointe : l'autre extrémité de ſon corps eſt groſſe & arrondie en forme d'une larme : on voit de longs poils ſous la gorge de ce poiſſon qui luy ſervent de nageoires, en ſorte qu'en les remuant la réſiſtance du liquide où il nage le fait tourner du côté de ſon dos.

Le 15^{e} poiſſon ſera nommé la petite Araignée aquatique : la figure de ce poiſſon eſt ſemblable à un ſphéroïde, ſur lequel on remarque pluſieurs lignes brunes & paralleles entr'elles, qui s'étendent du ſens du plus grand diametre de ce poiſſon ; & entre ces lignes paralleles on y voit pluſieurs corpuſcules plus bruns que le reſte de ſon corps.

J'ay auſſi remarqué que les pattes du devant de ſa tête étoient plus longues que celles qui ſont au bout oppoſé, & que celles du milieu de l'une & l'autre extrémité de tout ſon corps ſont plus longues que celles qui ſont à côté.

Le 16^{e} reſſemblant à une larme, ſera nommé de ce nom : ſon corps eſt uniforme & tranſparent, de maniere qu'on n'y remarque aucune inégalité ſenſible : ſon col eſt long & un peu courbé ; & ſa tête qui va diminuant de groſſeur, ſe termine par une petite rondeur.

Le 17^{e} poiſſon ſera nommé Limas : ſa tête eſt ronde, & ſa queuë aiguë : le reſte de ſon corps eſt aſſez gros par rapport à ſa longueur, qui devient plus courte dans ſon allure qui paroît aſſez réguliere.

Le 18^{e} poiſſon a été nommé Chenille aquatique : il s'en trouve de diverſes eſpeces dans pluſieurs infuſions de plantes toutes differentes ; & j'ay remarqué en quelques-unes que les poils que nous avons dit ailleurs être comme plantez aux deux lévres de cette chenille, ſemblent tourner dans de certains momens, comme une molette d'éperon tourneroit en luy donnant un coup de doigt ; & c'eſt ce mouvement qui détermine une partie des corps qui ſont d'une certaine groſſeur à ſe précipiter dans ſa bouche, d'où ils ſont enſuite chaſſez en partie, avec autant de vîteſſe qu'ils en avoient eu pour y arriver.

J'ay de plus obſervé deux petits corps cilindriques, longs d'environ une ligne chacun, & d'un peu moins de groſſeur, placez l'un à droit & l'autre à gauche du corps de cette chenille, & immédiatement à côté de ſon cœur : ces corps ſervent d'appuy à la partie anterieure de l'animal, pour luy donner la facilité d'avancer dans le tems qu'il rampe ſur le porte-objet du Microſcope.

On a bien de la peine à découvrir ces ſortes de petites pattes, à cauſe qu'elles ſont tres-courtes, & qu'elles ſont preſque toujours ſous le corps de cette chenille, ne les en écartant que tres-rarement.

Le 19^e^ poiſſon ſera nommé la groſſe Araignée aquatique : ſa figure approche de celle d'un ovale ; & ſa bouche un peu enfoncée ſemble quelquefois fenduë juſque vers le milieu de ſon corps. Ses lévres ſont garnies de petits poils en mouvement, dont la vîteſſe ſemble ſe communiquer interieurement à un petit corps qui eſt peut-être le cœur, & les poulmons de ce poiſſon qui l'environnent.

Le derriere eſt auſſi garni de poils, qui ſemblent former une eſpece de queuë ; & l'on voit immédiatement au-deſſus de l'anus, un amas brun de matiere que je crois être les excremens de ce poiſſon, qui ſe nourrit d'autres plus petits poiſſons, que nous avons appellez Cornemuſes, & qui paroiſſent ſe mouvoir dans leurs corps durant quelque tems.

Le reſte du corps de ces araignées eſt d'ordinaire rempli de pluſieurs petits corpuſcules aſſez irréguliers, qui peuvent paſſer pour des œufs.

On découvre auſſi de ces eſpeces de poiſſons dans les infuſions que l'on prépare avec de la paille de froment, de celle d'orge mêlée de quelques épis ; dans celle que l'on fait avec du bled de Turquie ; dans la canne d'Inde ; dans celle du bois & de l'écorce d'acacias ; dans celle du poivre en grains, &c. Toutes ces araignées, qui different les unes des autres en quelque choſe, ont du poil tout autour de leurs corps, couché un peu obliquement de la tête vers la queuë ; ce qu'on peut facilement obſerver avec une lentille de Microſcope d'une ligne ou environ de foyer.

Le 20^e^ poiſſon ſera nommé, le poiſſon à la grande queu-

le ; parce que ſa bouche occupe environ la moitié de toute la longueur de ſon corps : ſa lévre ſuperieure ſurpaſſe de beaucoup en longueur celle de l'inferieure ; l'une & l'autre ſont garnies de petits poils, & tout le dedans de ſon corps eſt rempli de petits corpuſcules d'inégale tranſparence : enfin le derriere de ce poiſſon eſt terminé par une queuë aſſez ſinguliere, & dont le mouvement eſt peu ſenſible.

Le 21[e] poiſſon ſera nommé l'Antonnoir, parce que ſa figure la plus conſtante luy reſſemble : on le voit paroître icy ſous trois formes differentes ; dans celle du milieu on apperçoit ſa bouche ouverte & ronde ; ſes lévres ſont interieurement garnies de petits poils qui ſe mouvent tres-vîte : ſon corps eſt ſemé au-dedans de pluſieurs petits corps tres-irréguliers : ſa queuë, qui eſt fort longue, traîne ſouvent aprés elle une petite pellicule attachée à ſon extrémité : on en voit un ſecond à gauche qui a la bouche fermée ; & un troiſiéme du côté droit dont le corps eſt plus rond : ſa queuë forme dans de certains tems une eſpece de tire-boure, qui ne demeure pas long-tems dans cet état ; car la tête de ce poiſſon s'éloignant de ſon extrémité, les ſpires qui paroiſſent au milieu ſe redreſſent.

Le 22[e] poiſſon, qui a la tête faite en trefle, & la queuë fourchuë, ſera nommé le Poiſſon à la tête treflée, & au derriere fourchu : ſa bouche eſt tres-petite & bien ronde : la moitié de ſon corps, qui eſt du côté de la tête, ſemble donner le mouvement à tout le reſte qui paroît immobile : cette partie qui eſt du côté de la tête eſt plus tranſparente que l'autre, & on l'a vû ſe plier tres-facilement en tous ſens.

Le 23[e] poiſſon repreſenté en A B, ſera nommé Chauſſon, parce qu'il en a la figure, & que la courbure A C, peut paſſer pour l'entrée du chauſſon : le dedans du corps de ce poiſſon eſt muni de pluſieurs corpuſcules tres-tranſparens, que l'on croit être des œufs.

Dans le tems que je me propoſois de ſupprimer totalement cette infuſion, je m'aviſay d'en mettre une tres-petite goutte ſur le porte-objet de mon Microſcope, croyant que ce ſeroit la derniere fois que j'examinerois cette liqueur ; mais en l'y regardant je fus tout étonné d'y voir un prodige Planche 11.

des plus ſingulier que j'aye obſervé dans toutes les infuſions précedentes.

C'étoit une eſpece particuliere de chenille aquatique, & des plus rares, n'en ayant pû voir que ſept ou huit en diverſes repriſes, durant trois jours ſeulement; ce qui a ſuffi pour en faire des deſſeins qui occupent une Planche entiere, dans laquelle Monſieur de Vigneux l'a repreſentée en huit formes, differentes en quelque choſe l'une de l'autre, ainſi que nous l'avons vûë.

A B, eſt l'une des repreſentations de cette eſpece de chenille aquatique, où l'on voit que ſon corps eſt compoſé de pluſieurs anneaux en forme de bourlets, qui rentrent les uns dans les autres, en s'approchant du milieu marqué C. Planche 11.

Ce qu'il y a de plus ſingulier dans ce nouveau poiſſon, eſt qu'on voit ſortir de ſa bouche une eſpece de trompe, compoſée de pluſieurs pieces engaînées l'une dans l'autre, qui ſe découvent en A, D, H, N, R, Y, et &.

L'extrémité de cette trompe ſe voit percée en D, en H, en N, en Y, et en &, où elle eſt toute ronde: elle eſt refenduë en deux parties en R, & en trois en A, où elles forment deux ou trois petites éminences: en L L, on apperçoit deux lévres garnies de poils tres-mobiles; & en T T, on n'y voit aucun poil apparent.

Pendant que nous obſervions toutes ces choſes, nous apperçûmes tout d'un coup ſortir du milieu de la poitrine de cet animal une eſpece de corne, repreſentée en F & en P, dont la longueur nous parut compoſée de trois eſpeces de falanges d'inégales groſſeur, qui rentroient l'une dans l'autre, comme font les tuyaux d'une lunette d'approche que l'on veut raccourcir; & cette corne mouvante décrivoit par l'une de ſes extrémitez F, P, un arc de cercle, en paſſant tantôt de droit à gauche, & tantôt de gauche à droit; aprés quoy elle diſparoiſſoit entierement.

Nous vîmes au derriere de ce poiſſon deux pointes tres-aiguës, comme on les a marquées en B, en E, en O, en S, en Z, & en †. Et lorſque cet animal donne à ſa queuë une certaine ſituation particuliere, il en découvre juſqu'à trois, ainſi qu'on les peut voir repreſentées en I.

Entre RS, on apperçoit cette chenille de toute sa longueur; & en V, Y et &, elle y est vûë plus ou moins raccourcie.

CHAPITRE XXXIII.

Suite des Observations faites sur la même écorce de bois de chêne, qui étoit venu flottant sur l'eau depuis Montargis jusqu'à Paris.

EN supprimant l'infusion précedente, je conservay une partie de l'écorce, que je fis bien sécher au feu; & l'ayant remise en infusion dans un vaisseau de fayence bien net, avec de l'eau de la Seine, j'apperçûs en diverses fois, & durant l'espace d'environ deux mois, les nouveaux poissons marquez 1, 2 & 3. Planche 11.

J'ay nommé Gland cornu, le premier de ces poissons, à cause que sa figure approche assez de celle de ce fruit: sa tête que l'on voit en haut est ornée de deux especes de cornes, longues, roides, blanches & transparentes, aussi-bien que le reste de son corps, dans lequel on n'apperçoit aucun viscere, ni aucune tache, le tout étant parfaitement égal, & l'animal dans un mouvement tres-lent.

Le second, que je nommeray le Piroüetteur concave & convexe, a son mouvement circulaire: toute sa partie convexe est garnie d'une seule rangée de poils, plus longs vers la queuë qu'ils ne sont ailleurs: le mouvement de ces poils est si rapide & si particulier, qu'il fait tourner circulairement ce poisson, avec tant de vîtesse, que les autres n'en sçauroient approcher durant son piroüettement, qui dure assez long-tems.

Enfin le troisiéme poisson sera nommé Volute, à cause qu'il est tourné spiralement, de même que le ressort qui est renfermé dans le barillet d'une montre de poche: tout son corps est attaché à une membrane tres-fine, blanche & transparente, se terminant en pointe du côté de la tête, & se

mouvant circulairement avec assez de lenteur, dont la raison est assez évidente pour n'avoir pas besoin d'être expliquée.

CHAPITRE XXXIV.

Des nouveaux poissons trouvez dans une infusion d'écorce de bois de chêne neuf.

ENviron le 25. Decembre de l'année 1716, je mis infuser à froid, dans de l'eau de riviere, plusieurs petits morceaux d'une écorce tres-épaisse d'une grosse bûche de bois de chêne neuf; environ deux heures aprés j'y apperçûs de petits poissons, que j'ay nommez Cornemuses argentées: & le 15. Janvier 1717. je commençay à voir dans une tres-petite goutte de cette eau cinq ou six nouveaux poissons d'un même genre, qui me parurent assez considerables pour meriter une place dans cette Histoire, tant à cause de leur couleur, de leur grosseur, figures & mouvemens differens; qu'à cause qu'ils sont les seuls de cette nature, que j'aye apperçûs durant tout le cours de mes observations.

Pour écrire l'histoire anatomique de ce poisson, j'ay fait ce que j'ay pû pour trouver un nom qui luy convint; mais ni moy ni ceux à qui je l'ay fait voir, n'ont pû y réüssir; la raison en est, que cet insecte ne conserve pas durant une minute la même figure sous laquelle il paroissoit un peu auparavant; de sorte qu'en tres-peu de tems on le voit sous toutes les diverses formes representées en cette Planche: Planche 12. cependant le desir d'être, pour ainsi dire, le parrein d'un petit animal aussi rare que l'est celuy-cy, & aussi curieux à voir pendant son nager, a fait que plusieurs personnes se sont efforcées de le nommer; mais parce que les uns l'ont apperçûs d'une forme particuliere, les autres d'une autre, cela luy a fait donner le nom de Chenille; celuy de Chausse ou de Chaussette, de Guêtre, ou d'Elegant: de Nasse; de poisson à deux têtes: de Cornet à bouquin; & enfin de Rognon.

Ceux

Ceux qui l'ont vû sous la forme representée en A, l'ont appellé Chenille dorée, à cause de la ressemblance qu'il peut avoir avec cet animal, & de sa couleur d'ambre jaune. On voit dans son corps des fibres longitudinales qui s'étendent d'un bout à l'autre, entre lesquelles on apperçoit de petits corpuscules assez irréguliers, & d'inégale grosseur, qui sont peut-être les œufs de cette chenille aquatique.

On en voit une autre en B, qui a été nommée Chaussette ou Guêtre, dans l'une des extrémitez de laquelle j'avois bien de la peine à déterminer l'endroit où pouvoit être la tête : cependant comme ce poisson faisoit souvent voir en C, une grande ouverture qui changeoit à tout moment de forme ; je crus devoir prendre cette partie-là pour la bouche de ce poisson, dont les lévres étoient quelquefois si étenduës & si mobiles, qu'elles pouvoient luy servir comme d'un gouvernail pour se conduire en partie dans sa progression ; je dis en partie, parce que comme il paroît avancer & reculer également bien, & se tourner & retourner en se pliant & repliant de toutes les manieres imaginables ; cet insecte doit avoir en luy de quoy satisfaire à tous ces divers mouvemens.

On remarque à l'entour de son corps de tres-petits poils, des plus déliez qu'on puisse voir, & dont le mouvement m'a paru peu sensible, à cause de leur grande délicatesse, qui ne permettoit pas d'en bien faire voir le jeu.

Un autre qui se voit en D, assez raccourci, gonflé, plié & replié, a été nommé Cornet-à-bouquin, à cause de la forme particuliere qu'il a pris pour un moment.

Celuy qui est representé en E, s'est fait voir sous la forme d'une Nasse, qui est un instrument fait d'ozier, dont on se sert pour prendre des poissons.

F G H, est un autre poisson, dont la partie G H ressemble à une jambe mal faite : le milieu de son corps paroît comme s'il étoit noüé d'une ligature invisible.

Au-dessous de la lettre I, il y en a un autre qui paroît d'une grandeur extraordinaire, par rapport aux précedens : on y apperçoit la forme d'un pied, d'une jambe & d'une cuisse cassée : je l'ay nommé Bouffon, à cause qu'il semble se plaire dans ses divers changemens, qui s'executent avec tant de

vîteſſe, qu'on a eu de la peine d'en fixer une ſeule attitude.

Celuy qui ſe voit au-deſſous de la lettre K, peut être appellé la Maſſuë; parce que ſa bouche qui eſt en bas eſt totalement fermée, & que ſon corps eſt aſſez étendu & gonflé dans ſon milieu pour recevoir ce nom. On voit ſes œufs que l'on y a repreſentez par quelques petits globules un peu irréguliers.

Au-deſſous de l'endroit marqué L, il s'en voit un autre, tellement courbé, que reſſemblant à une ſauciſſe pliée en deux, on luy a donné ce nom.

Au-deſſous des lettres M, M, on y voit deux de ces poiſſons morts ſubitement, y paroiſſant ſous une forme qui approche aſſez de celle d'un Rognon, & qui ne ſont vûs ainſi, qu'à cauſe qu'ils ont été ſaiſis dans cet état au moment de l'évaporation totale de la liqueur où on les avoit vûs ſe traîner un peu avant leur mort.

Dans l'inſtant que ces ſortes d'animaux ceſſent de vivre, on les voit devenir blancs & tranſparens, de jaune pâle qu'ils étoient auparavant: la raiſon en eſt évidente, puis qu'elle eſt la même que celle des liqueurs qui paroiſſent colorées, étant en gros volume, & qui ceſſent de le paroître lorſqu'elles ſe trouvent en petite quantité dans des vaiſſeaux de verre de peu d'épaiſſeur.

N, eſt encore un poiſſon de même genre, qui pour la reſſemblance qu'il a avec une racine appellée Carotte, ſera nommé de ce nom.

Il s'en voit un autre en O, que j'ay nommé l'Elegant, à cauſe qu'il m'a paru nager avec tant de grace, & ſe tranſporter d'une maniere ſi grave & ſi majeſtueuſe durant ſes divers changemens, que je n'ay pû luy refuſer ce nom.

P, Q, R, S, T, V, et X, ſont encore des poiſſons de même nature, vûs immédiatement aprés leur mort, ſous toutes les diverſes formes exprimées au-deſſous de ces mêmes lettres.

Enfin ſous la lettre Y, on y voit un poiſſon d'un autre genre, dont la forme approche aſſez d'une eſpece de bouteille, pour luy donner ce nom, & qui en nageant parmi les précedens, comme parmi un grand nombre d'autres, dont

je ne diray rien, faisoit rentrer pour un moment l'extrémité de son col en dedans.

Le froid s'étant augmenté considerablement, peu de jours aprés la naissance de ces gros insectes, & le vent du Nord s'étant fait sentir de plus en plus dans l'endroit où je demeure, le nombre de ces poissons est diminué peu à peu; de sorte qu'au bout d'environ quinze jours j'ay cessé d'en tirer de cette infusion.

CHAPITRE XXXV.

Dissertation sur la maniere dont on apperçoit les objets qui sont vûs au travers des Microscopes, & des Lunettes d'approche.

LEs sentimens des Philosophes se trouvant partagez sur la maniere dont nous appercevons les objets quand nous les regardons au travers des Microscopes & des Lunettes d'approche; j'ay crû qu'étant muni d'un nombre suffisant de ces machines, je pourrois par diverses experiences parvenir à connoître assez exactement la matiere en contestation, & donner par-là les moyens de décider en faveur des uns ou des autres.

Pour nous conduire avec quelque ordre dans la recherche que nous voulons faire, il est, ce me semble, nécessaire de bien faire comprendre de quoy il s'agit : pour cet effet, je diray premierement qu'en discourant un jour avec M[r] *** sur la differente maniere de voir les objets differemment posez dans les Microscopes; il remarquoit que dans ceux qui sont montez d'une seule lentille d'un court foyer, l'objet étoit toujours placé entre la lumiere & l'œil; & que dans les autres Microscopes montez de deux ou de trois verres, l'objet y étoit ordinairement situé un peu au-delà, ou au-dessous de la lumiere qu'il recevoit pour être renvoyée à l'œil du Spectateur.

Ces observations étant supposées, nous convînmes encore

que les objets opaques étoient vûs par refléxion dans les Microſcopes à deux & à trois verres, en les y regardant de haut en bas. Mais on ne peut pas accorder à Monſieur *** que dans les Microſcopes à liqueurs on y apperçoive les objets tranſparens par les rayons de lumiere qui paſſent des pores de ces corps ſur la retine, où faiſant diverſes impreſſions ils donnent occaſion à l'ame de les appercevoir.

Il faut avoüer que cette maniere d'expliquer l'apparence des objets tranſparens, qui ſont vûs dans les Microſcopes à liqueurs, eſt tres-ſimple ; cependant il n'eſt pas difficile d'en démontrer la fauſſeté, en prouvant que la lumiere agit dans ce dernier Microſcope de même que dans le premier ; c'eſt-à-dire, qu'elle y fait encore voir les objets par refléxion ; mais d'une maniere un peu plus compoſée : & que quand nous recevons des rayons qui viennent à nos yeux ſans s'être refléchis, aprés avoir traverſé les pores des corps tranſparens, & des rayons refléchis tout enſemble, le corps d'où ils étoient partis nous en paroiſſoit à la verité plus clair ; mais toujours avec moins de diſtinction qu'il n'auroit paru, ſi nous n'euſſions point receu de rayons, qui n'auroient ſimplement fait que traverſer les pores des corps tranſparens. Et pour ne pas confondre les idées differentes que j'avois à l'occaſion des mots de clair & de diſtinct, je les définis en cette ſorte, afin d'éviter les conteſtations qui pourroient naître, en les employant cy-aprés dans mes preuves, ſans avoir pris cette précaution.

Je dis donc qu'un objet paroît ſeulement clair, lorſqu'il envoye beaucoup de lumiere dans nos yeux. Qu'un objet paroît diſtinct, lorſque tous ſes points exterieurs envoyent une quantité ſuffiſante de rayons, qui s'aſſemblent ſéparément en autant de divers points de la retine, qu'il y en a dans l'objet.

Et qu'un objet paroît en même tems clair & diſtinct, lors que chaque point de ſa ſuperficie refléchit dans l'œil le plus de rayons de lumiere qu'il eſt poſſible ; & que les rayons qui partent de tous ces points de l'objet, ſe réüniſſent en autant de divers points de la retine qui leur répondent.

Cela ſuppoſé, je paſſay aux preuves & aux experiences

qui ſuivent, en faiſant premierement comprendre que les rayons de lumiere qui ont ſimplement traverſé les pores des corps tranſparens, ne ſont pas ceux qui nous font appercevoir ces corps; puiſque de tels rayons ne peuvent nous faire ſentir que ce qu'ils rencontrent en leur chemin, & que ne rencontrant que la matiere ſubtile contenuë dans ces pores, laquelle ne nous eſt nullement ſenſible, il s'enſuit qu'ils ne nous ſçauroient faire appercevoir aucune partie de ces corps.

2°. Quand par la fenêtre d'une chambre nous regardons les objets de dehors au travers d'une glace de miroir qui ſert de vître, nous ceſſons de voir cette glace dés le moment que nous nous appliquons à bien conſiderer ces objets, & nous les apperçevons preſque auſſi beaux & auſſi diſtinctement qu'ils nous paroîtroient ſi cette glace n'étoit pas poſée entr'eux & nous; d'où il ſuit que la glace, ſi elle eſt bien nette, n'interrompt que tres-foiblement les rayons de lumiere qui viennent des objets exterieurs; puiſqu'elle ne change rien dans l'apparence de ces objets, ſi ce n'eſt qu'elle les fait paroître en des lieux où ils ne ſont pas, & quelque peu plus bruns qu'ils ne paroîtroient, ſans l'interpoſition de cette vître.

3°. Si au lieu de porter notre attention au-delà de ce verre, nous nous bornons uniquement à le conſiderer; il eſt certain qu'en l'obſervant avec application, nous pourrons découvrir s'il a été bien adouci, s'il eſt bien poli, s'il n'y a point de rayes, s'il ne s'y trouve ni bules d'air, ni points, ni ondes, &c. en un mot, nous y remarquerons juſques aux moindres particularitez ſenſibles.

Il s'agit donc maintenant de ſçavoir comment nous parvenons à la connoiſſance de toutes ces choſes; ſi c'eſt par le moyen des rayons de lumiere qui nous viennent immédiatement des objets de dehors; ou ſi ce ſont d'autres rayons de lumiere que la glace a reçûs du dedans de la chambre, & qu'elle nous renvoye enſuite, pour nous faire diſtinguer toutes ces particularitez; ou enfin ſi c'eſt tout enſemble de l'une & de l'autre maniere que nous les obſervons.

1°. Ce n'eſt pas par la lumiere immédiatement envoyée des objets exterieurs que j'apperçois tout ce que je remarque,

puiſqu'en les regardant attentivement, je ceſſe d'appercevoir la glace, & tout ce qu'elle contient.

2°. Ce ne ſont point non plus les rayons de lumiere qui venant du Ciel, vers lequel je porte ma vûë, qui me la font appercevoir avec ſes défauts de tranſparence, puiſque je ne vois que le Ciel par cette façon de regarder.

Il en faut donc premierement conclure, que j'apperçois cette glace par les ſeuls rayons de lumiere qu'elle a reçûs du dedans de la chambre, & qu'elle refléchit enſuite dans mes yeux, avec les modifications néceſſaires pour me faire ſentir tout ce que j'y diſtingue.

D'ailleurs, ſi pendant que je vois ainſi la glace par des rayons refléchis du dedans de la chambre, il arrive que j'en reçoive encore d'autres qui viennent immédiatement du Ciel ou de quelque autre objet, ces derniers rayons ne font qu'interrompre l'action des rayons refléchis, & m'empêchent d'obſerver ce verre auſſi exactement que je le ferois. Et je ſuis d'ailleurs perſuadé, que s'il étoit poſſible de tapiſſer d'un noir parfait toute la chambre où eſt cette glace, on ne pourroit voir du dedans de cette chambre, que les objets qui ſeroient au-delà, & non la glace : car ſi vous arrêtez à l'extrémité d'un tuyau d'environ trois pouces de longueur, & d'un pouce de diametre, dont le dedans ſoit le plus noir qu'il eſt poſſible, un morceau de glace bien tranſparente, pendant que votre œil ſera appliqué à l'autre extrémité du même tuyau, regardant par un trou qui occupe le centre de cette extrémité, & qui ſoit plus petit que l'ouverture de la prunelle ; en ſorte qu'aucun rayon, s'il eſt poſſible, ne puiſſe ſe refléchir de l'interieur de ce tuyau ; vous ne diſtinguerez rien de ce verre, & votre vûë ſe terminera entierement à l'objet exterieur où vous la dirigez.

Après ces obſervations, il ne ſera pas difficile d'expliquer comment nous voyons les objets par le moyen des Microſcopes à un ou à pluſieurs verres, ni de prouver que tous les objets n'y ſont bien vûs, que par la ſeule lumiere réfléchie.

1°. Quand au travers d'une ſeule lentille d'environ trois lignes de foyer, montée dans le Microſcope, dont voicy le

deſſein, nous regardons de haut en bas de petits objets, comme des grains de ſable répandus ſur un corps noir, qui ſert de portes-objets; il eſt indubitable que nous les appercevons par la lumiere que leur ſurface renvoye à l'œil; & que s'il étoit poſſible d'empêcher que les rayons qui pourroient les avoir penetrez, ne vînſſent ſe mêler ſur la retine avec les rayons refléchis dont je parle, nous en diſtinguerions incomparablement mieux cette ſuperficie tournée de notre côté. Et comme ces objets regardez de cette même maniere avec un Microſcope à pluſieurs verres, ne ſont point apperçûs autrement, on en doit conclure, qu'ils ſont toujours vûs dans de pareilles experiences, par des rayons refléchis; ainſi que nous les verrions de nos yeux nuds, & nullement par des rayons qui ſe rompent ailleurs, que dans les verres de ces ſortes d'inſtrumens.

Planche 7. de la premiere Partie.

Il reſte maintenant à montrer que la même choſe arrive quand nous regardons des objets au travers des Microſcopes à liqueurs, tenus dans une direction ſemblable à celle que nous donnons à une Lunette d'approche, pour obſerver ce qui ſe paſſe dans le Ciel.

Pour cet effet, il faut ſe ſouvenir de ce que nous avons dit touchant la glace de miroir appliquée à la fenêtre d'une chambre; ſçavoir, que nous ne l'appercevons point par les rayons qui nous viennent immédiatement des objets du dehors, en la traverſant ſimplement; mais par ceux qui, ayant penetré les pores de ce verre, ſont retournez de la ſurface interieure de la chambre ſur les endroits ſolides de la glace, pour entrer dans nos yeux aprés une ſeconde refléxion; ainſi les objets ou les parties de ces objets ne ſont point apperçûës dans ce Microſcope, par les rayons de lumiere qui viennent d'abord du dehors, paſſant au travers des endroits tout tranſparens de ces corps; mais par ceux qui ayant paſſez par ces mêmes endroits, reviennent du fond du Microſcope; c'eſt-à-dire, de la partie de la lentille, que l'ouverture du diaphragme laiſſe découverte ſur leur ſurface tournée de notre côté, & s'en refléchiſſent enſuite juſqu'au fond de l'œil, où ils peignent l'image de ces objets.

Tout cela ſe peut encore confirmer par d'autres experien-

ces ; en voicy une que le hazard me fit un jour naître, qui me semble tres-propre pour montrer que nous voyons les objets dans le Microscope à liqueurs par la seule réflexion de la lumiere.

Un tres-petit corps opaque s'étant heureusement trouvé dans une goutte de liqueur placée au milieu du concave ou porte-objet de verre, se fit voir d'une belle couleur argentine dans une assez grande étenduë de sa surface tournée de mon côté ; & cette étenduë ne pouvoit être vûë que par des rayons de lumiere refléchis, pendant que les endroits qui en étoient un peu éloignez me paroissoient tres-opaques ; parce que la rondeur de cet objet ne permettoit pas que la lumiere refléchie de ces mêmes endroits, vint vers mon œil.

Le même hazard qui a fait trouver le corps opaque dont je viens de parler, posé au milieu du concave ou porte-objet, pourroit bien en faire trouver un autre dans le même lieu, dont les parties seroient si desunies & si interrompuës en sa surface, que les rayons de lumiere refléchis sur luy s'y absorberoient entierement ; d'où il s'ensuivroit que n'en revenant pas dans l'œil du Spectateur, ce petit objet paroîtroit toujours opaque. Ou enfin ce corps opaque occupant trop d'espace vis-à-vis de la lentille, & empêchant par-là l'entrée des rayons de lumiere, il ne pourroit être vû.

Mais si l'on veut faire réüssir cette experience, il n'y a qu'à prendre une lentille d'un foyer un peu long, comme d'un pouce, & donner au diaphragme, dont on doit la couvrir, une ouverture qui surpasse celle du diametre du corps que l'on veut observer ; alors si ce corps opaque est propre à refléchir la lumiere qu'il aura reçûë sur sa surface tournée vers nous, il ne manquera pas d'être vû.

On m'objectera peut-être qu'en faisant rencontrer le corps opaque vis-à-vis le milieu de la flâme d'une chandelle, on l'y voit si noir, que l'on ne distingue rien du tout en sa superficie ; ce qui ne devroit pas arriver.

J'avouë que si le corps opaque est trop petit, par rapport à la grosseur de la flâme de cette chandelle, il paroîtra noir, à cause que la grande quantité de rayons de lumiere, qui viendra

viendra dans l'œil, ſera capable d'effacer l'impreſſion des foibles rayons qu'il reçoit de l'objet que l'on veut voir.

Pour preuve inconteſtable de cette verité, ſi nous prenons un objet plus gros pour faire cette experience, notre œil recevant alors moins de rayons directs de la flâme de cette chandelle, ce peu de rayons ne nous empêchera pas de voir ce corps; & c'eſt une des principales raiſons qui doit nous obliger ſouvent à diminuer l'ouverture des diaphragmes que nous mettons ſur les lentilles des Microſcopes, & ailleurs.

Une autre experience qui prouve certainement que les objets, comme les anguilles du vinaigre, ſont vûs par la ſeule refléxion de la lumiere, qui retourne du fond du Microſcope ſur eux-mêmes; c'eſt que ſi l'on applique au côté plat du concave ou porte-objet, un diaphragme qui couvre même une partie du concave où ſont ces anguilles, on ne ceſſe pas pour cela de voir celles qui ne ſe trouvent pas dans les rayons de lumiere qui traverſent le milieu du concave; & même celles qui permettent par leur tranſparence le paſſage de la lumiere qui ſouffre réfraction, en traverſant le centre du concave, & les endroits voiſins; ne paroiſſent pas, à beaucoup prés, ſi diſtinctes que celles qui ne reçoivent la lumiere que par réflexion; & l'on eſt même ſouvent obligé de détourner quelque peu le Microſcope, pour ne pas recevoir dans ce moment tant de rayons directs qui nous empêchent de voir l'objet le plus diſtinctement qu'il eſt poſſible; quoyque ces rayons le faſſent paroître avec plus d'éclat.

Et il faut remarquer qu'en vous ſervant d'une lentille d'environ trois lignes de foyer, vous rendrez l'experience dont je viens de parler plus ſenſible, que ſi vous vous ſerviez d'une lentille d'un foyer plus petit; à cauſe que celle-cy, faiſant découvrir un moindre champ que l'autre, les objets un peu écartez du trou par où paſſe la lumiere, n'en pourroient pas être apperçûs.

3°. Lorſqu'on obſerve exactement les plus groſſes bules d'air formées dans la goutte de vinaigre qui occupe la concavité du porte-objet, & que pour cet effet on ſe ſert de la flâme d'une bougie au lieu du jour, on apperçoit l'image en petit de cette flâme qui paroît ſur la convexité de la bou-

le d'air tournée vers nos yeux; ce qui marque infailliblement que c'eſt par refléxion que nous appercevons cette petite image, comme nous la verrions par la refléxion de deſſus un miroir convexe de métal.

Tout au contraire, on appercevra cette flâme plus groſſe au-delà de cette bule d'air, qu'on ne l'a vûë en deçà; parce que la concavité du vinaigre, qui touche immédiatement le derriere de la boule d'air, a la proprieté de faire paroître plus groſſe l'image de l'objet qui luy eſt oppoſé.

4°. Si l'on met des grains de ſable ſur le verre concave du Microſcope ouvert par les côtez, pour donner paſſage à la lumiere; & qu'on regarde ces objets de haut en bas, avec ce Microſcope élevé à plomb au-deſſus d'un corps qui renvoye à l'œil des rayons de lumiere au travers de ce concave, pendant que ces mêmes grains de ſable en refléchiſſent auſſi; on les verra avec moins de diſtinction qu'on ne feroit, ſi on les regardoit en mettant à la place de ce corps un morceau de drap noir, aſſez prés du trou inferieur de ce même inſtrument; d'où il ſuit que la lumiere rompuë venant à l'œil immédiatement, aprés avoir ſouffert quelques réfractions dans ce verre concave, & dans ces grains de ſable, trouble l'action des rayons réfléchis, en cauſant une ſenſation confuſe de ces objets; de même que tout ce qui eſt peint dans un Tableau bien éclairé, y eſt vû avec moins de diſtinction & de beauté qu'il ne le ſeroit, ſi les objets qui l'environnent ne luy envoyoient pas par réflexion, une partie de la lumiere qu'ils reçoivent.

Enfin ſi c'étoit la lumiere rompuë qui vient immédiatement dans l'œil du Spectateur, aprés avoir traverſé les objets tranſparens, qui nous les fit voir diſtinctement, il s'enſuivroit que plus l'œil recevroit de rayons rompus, plus il découvriroit de parties diſtinctes dans l'objet; & c'eſt préciſement tout le contraire de ce qui arrive; puiſque à meſure que l'on augmente l'ouverture objective du Microſcope, pour donner paſſage à plus de rayons de lumiere qui entrent immédiatement dans l'œil, aprés avoir été rompus; plus l'objet paroît confus.

On objecte que pour voir ſi un verre de lunette eſt bien

adouci, ou s'il eſt bien poli, on le regarde en le plaçant entre la lumiere & l'œil ; & qu'ainſi nous en jugeons mieux qu'en le regardant de toute autre maniere ; d'où l'on veut conclure que nous voyons les défauts d'adouciſſement de ce verre, par la ſeule lumiere rompuë, qui vient immédiatement dans nos yeux, aprés l'avoir traverſé.

Cette conſequence me paroît tirée avec un peu trop de précipitation, & ſans avoir examiné les circonſtances qui accompagnent l'experience dont il s'agit ; puiſque bien loin de faire contre nous, elle va nous ſervir d'un nouveau moyen pour combattre l'opinion en faveur de laquelle on l'apporte ; en faiſant comprendre qu'il n'eſt pas toujours vray de dire que pour voir ſi un verre de lunette eſt aſſez adouci & aſſez poli, on le place entre la lumiere & l'œil ; puiſque ceux qui taillent ces verres n'ont pas beſoin de les démaſtiquer pour connoître s'ils ont l'adouciſſement & le poliment requis : ils ne font pour cela que regarder ce verre en tournant le dos à la lumiere, pendant qu'ils la font recevoir au verre qui eſt attaché à la molette.

On reconnoît même encore aſſez bien ſi un verre de lunette a les perfections qu'il doit avoir du côté du travail, lorſqu'il eſt détaché de deſſus la molette, en le regardant appliqué ſur un morceau de drap noir, pendant qu'il reçoit la lumiere preſque à plomb, & qu'elle revient de même dans nos yeux, ayant le dos tourné à la lumiere du jour, afin de n'en recevoir par refléxion, que de la ſurface du verre qu'on examine, en le remuant doucement, pendant qu'on le tient ainſi en experience.

Il nous reſte enfin à prouver qu'en mettant le verre entre la lumiere & l'œil, pour le regarder comme on le propoſe, nous le voyons encore par refléxion ; car pendant que nous l'obſervons dans cette ſituation, une partie des rayons de lumiere qui l'ont traverſé luy eſt renvoyée par les objets qui ſont en deçà, & d'où luy viennent en même tems d'autres rayons ; en ſorte que ceux-cy & ceux-là retournent de ce verre à nos yeux, par une ſeconde refléxion.

De plus, il faut remarquer que ſi dans cette experience nous tournons le verre que nous voulons obſerver exacte-

ment, vis-à-vis le bois d'une croiſée de fenêtre, afin de recevoir moins de lumiere qui ſe rompent en traverſant ce verre; nous le verrons certainement avec plus de diſtinction que nous ne ferions ſans cette précaution.

Enfin les objets que nous appercevons par le moyen des lunettes d'approche, ne ſe voyent auſſi que par la lumiere qu'ils reflechiſſent à nos yeux; & toutes les refractions que les rayons ſouffrent, en traverſant les verres de ces inſtrumens, ne ſervent qu'à nous augmenter l'apparence de l'objet, à nous le faire paroître plus proche, plus gros & plus diſtinct; mais moins clair qu'il ne paroîtroit aux yeux nuds, & ſans le ſecours des lunettes.

Nous pouvons donc maintenant conclure, que tous les objets apperçûs, ſoit par les Microſcopes en general, ſoit par les Teleſcopes, ne ſont vûs bien diſtinctement, que par les ſeuls rayons refléchis.

S'il arrivoit, Monſieur, qu'aprés avoir examiné cette petite Diſſertation, vous ne fuſſiez pas de mon ſentiment, je vous prie de me faire la grace de mettre par écrit ce que vous y aurez trouvé de défectueux, tant dans mes raiſonnemens, que dans les experiences dont je les ay accompagnez; afin que j'eſſaye ſi je pourray parvenir à rendre plus claire & plus intelligible la matiere en conteſtation.

Vous aurez auſſi la bonté de nous faire comprendre, 1°. Comment en ſuivant votre hypothéſe, nous voyons les grains de ſable poſez ſur le porte-objet du Microſcope à liqueur, ſemblable à celuy qui eſt repreſenté en cette figure, Planche 7. de la premiere Partie, lorſque nous les regardons de haut en bas?

2°. Comment nous appercevons les mêmes grains de ſable par ce même Microſcope, en luy donnant une ſituation horiſontale?

3°. Pourquoy nous les voyons mieux dans l'une de ces ſituations, que dans l'autre?

4°. Et pourquoy encore ces mêmes grains de ſable paroiſſent plus bruns, étant vûs dans la direction horiſontale du Microſcope, que dans ſa verticale?

5°. Pourquoy il faut moins donner d'ouverture aux dia-

phragmes des lentilles d'un court foyer, qu'à ceux des lentilles dont le foyer eſt plus éloigné du verre ?

6°. Pourquoy les plus petits animaux viſibles des liqueurs, & les plus petits atômes qu'on y découvre, ſont-ils mieux apperçûs lorſqu'ils ſont hors du rayon principal, que lorſqu'ils ſont dans ce même rayon, ou tout proche.

7°. Et pourquoy il y en a de ſi petits, qu'il n'eſt pas poſſible de les appercevoir dans la lumiere qui les traverſe directement, en paſſant par l'axe de la viſion ou auprés ; & qu'ils ſont vûs dans l'ombre, ou hors le cône des rayons qui paſſent par toute l'ouverture objective du Microſcope ?

8°. Pourquoy nous n'appercevons pas le concave ou porte-objet de verre, que l'on ſuppoſe être des plus parfaits, avec autant de diſtinction que nous appercevons les anguilles du vinaigre, par exemple, qui ſont ſur cette concavité ; puiſque que ce concave eſt plus tranſparent que ces mêmes anguilles ?

9°. Pourquoy certains corps opaques ſont-ils vûs dans le Microſcope à liqueurs, en les y regardant comme on regarde dans une lunette d'approche ; quoyqu'il ne paſſe aucun rayon de lumiere au travers de ces corps ?

Vous verrez, Monſieur, qu'il n'y a aucun Phénoméne contenus dans les difficultez que j'ay l'honneur de vous propoſer icy, qui n'ait été réſolu ci-devant, ou qui ne le puiſſe être facilement par l'hypothéſe de la double refléxion des rayons de lumiere ; & que de plus, il n'eſt pas néceſſaire d'avoir recours aux refractions que la lumiere ſouffre en les traverſant, ſi ce n'eſt aprés qu'ils ſont refléchis : & enfin que ces refractions ſont tres-nuiſibles, en un ſens ; puiſque les rayons ainſi rompus, & reçus dans l'œil immédiatement aprés, nous empêchent de voir les corps avec la même netteté & la même diſtinction, que nous les verrions ſans cela.

Je finis icy ces obſervations, que j'aurois pû pouſſer incomparablement plus loin, la matiere étant infinie ; puiſqu'elle s'étend à l'examen de tous les differens êtres qui nagent dans l'air & dans la mer ; à tous ceux qui couvrent la ſurface de la terre, de même qu'à ceux qu'elle enferme dans ſon ſein,

Si j'apprens que cet Ouvrage ait le bonheur d'être agréable au Public, je me trouveray bien récompensé de la peine & de la dépense que j'ay faite pour le composer; & cela me donnera peut-être lieu d'en faire imprimer bien-tôt un autre, qui aura pour titre :

Nouvelle Hypothése pour expliquer les effets de l'Aimant.

Par le moyen de laquelle on pourra non-seulement faire comprendre d'une maniere tres-simple, ce qui faisoit autrefois l'admiration des plus celebres Philosophes; mais encore les raisons d'un nombre surprenant de nouvelles experiences. Et quoy qu'on soit bien éloigné de mettre la pierre d'aimant en parallele avec l'éclat & la dureté du diamant, la beauté des couleurs celestes & azurées des saphirs, le jaune doré de la topase, le vert qu'on admire dans l'émeraude, la couleur de feu du rubis, celles de violette & de pourpre des ametistes d'Orient, &c. neanmoins on pourra tres-facilement prouver, & faire voir aux Naturalistes, que l'aimant seul a plus de vertu que n'en ont ensemble toutes les autres pierres précieuses : & qu'une seule des proprietez de l'aimant est beaucoup plus utile, plus nécessaire & plus estimable, par rapport aux usages que nous en tirons tous les jours, que toutes celles qu'on a vûës des autres pierres précieuses, qui font maintenant une partie de l'ornement & des desirs du beau sexe.

Fin de la seconde & derniere Partie.

TABLE
DES CHAPITRES
DE LA PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE I. *Description des Microscopes dont je me suis servi.* page 1

Description & usage des nouveaux Microscopes, dont on peut se servir à la lumiere du jour ou à celle d'une chandelle. 2

Des usages de ce Microscope. 6

CHAP. II. *Description d'un autre nouveau Microscope à liqueurs.* 10

CHAP. III. *Description d'un troisiéme Microscope à liqueurs.* 12

CHAP. IV. *Description & usage d'un quatriéme Microscope tres-simple.* 14

CHAP. V. *Construction d'un cinquiéme Microscope à liqueurs, par le moyen duquel on pourra employer des lentilles soufflées, & de celles qui ne le sont point, depuis les plus petits foyers jusqu'aux plus grands.* 19

CHAP. VI. *Description d'un nouveau Microscope à liqueurs, d'une construction fort singuliere, pour mettre en usage les lentilles d'un tres-petit foyer.* 22

CHAP. VII. *Description & usage d'un nouveau Microscope à tiges, tres-commode pour observer toutes sortes de petits objets, soit de jour ou de nuit, à la lumiere d'une chandelle.* 25

Des usages de ce Microscope. 28

CHAP. VIII. *Description & usage des Microscopes à canon de verre, que quelques personnes nomment Tombeaux; & d'autres, Cimetiere de divers animaux.* 30

Description du second Microscope à canon. 31

CHAP. IX. *Des usages que l'on peut tirer des Microscopes dont je viens de parler.* 32

CHAP. X. *Description & usage d'un tres-petit Microscope, monté d'une seule lentille.* 41

CHAP. XI. *Description d'un tres-petit Microscope à deux verres ; qui represente les objets dans leur situation droite & naturelle.* 43
CHAP. XII. *Description & usage d'une nouvelle Machine, tres-utile aux Anatomistes, aux Dessinateurs, aux Graveurs, aux Peintres qui travaillent en Migniature ; & generalement à tous ceux qui veulent découvrir ce que les yeux seuls ne peuvent appercevoir, & pousser leurs Ouvrages au point le plus haut de perfection.* 44
Des usages de cette Machine. 45
CHAP. XIII. *Explication de toutes les parties qui composent un Microscope à trois verres convexes des deux côtez.* 46
Explication du profil de ce Microscope. 47
Du foyer de chacun des trois verres de ce Microscope, & des diverses distances qui sont entr'eux. 48
Des usages que l'on peut tirer de ce Microscope à trois verres. la même.
CHAP. XIV. *Description d'une petite Machine nouvelle, qui contient trois sortes de Microscopes, & deux petites lunettes d'approche.* 50
CHAP. XV. *Description d'un nouveau Microscope universel, & de ses usages.* 52
Des usages de ce Microscope universel. 58
De la circulation du sang, & d'une nouvelle invention pour la faire voir dans la queuë d'un petit poisson nommé Tétart ou Chabot. 61
Profil d'un petit Microscope, composé de deux ou de trois lentilles convexes des deux côtez. 63
CHAP. XVI. *Autre nouveau Microscope universel.* 66
CHAP XVII. *Explication d'un troisiéme & dernier Microscope nouveau & universel.* 68
CHAP. XVIII. *Comment on doit ajuster une Lamproye, une Anguille ou un Tétart, dans un tuyau de verre, d'argent ou de laiton. Comment on applique ces tuyaux dans la Machine representée en la Planche 21. Fig. 4. Et enfin comment cette même Machine doit être placée dans la capacité du corps de ce Microscope.* 74
Comment & surquoy il faut saisir les poissons, dont la grosseur ne permet

permet pas de mettre en usage la Machine precedente. 76. & 77.

Comment on pourra conserver durant plusieurs mois tous ces poissons. 78

TABLE DES CHAPITRES
de la seconde & derniere Partie.

CHAPITRE I. *Des anguilles, serpens ou petits vers que l'on trouve dans le vinaigre.* page 2

CHAP. II. *Du vinaigre commun.* 6

CHAP. III. *Des vinaigres composez.* 7

CHAP. IV. *Nouvelles observations sur les anguilles du vinaigre, faites avec le Microscope representé en la Planche septiéme.* 8

CHAP. V. *Observations faites sur plusieurs sortes d'infusions de poivre en grains, mis à froid dans de l'eau commune.* 12

Du poivre blanc. 15

Du poivre long. la même.

CHAP. VI. *Observations faites durant une année entiere, de ce qui s'est trouvé dans une infusion à froid de sené.* 16

CHAP. VII. *De l'eau qui se trouve dans les huistres à l'écaille, & de ce que l'on y apperçoit en peu de jours ou d'heures, après être ouvertes.* 20

CHAP. VIII. *Des infusions d'œillets mis dans de l'eau commune, chaude & froide.* 27

CHAP. IX. *D'une infusion à froid d'un bouquet composé de roses, d'œillets & de jassemin.* 30

CHAP. X. *De l'infusion des barbeaux, ou petites fleurs bleuës qui viennent parmi les bleds.* 31

CHAP. XI. *Du thé mis en infusion.* 34

CHAP. XII. *Des infusions de queuës de framboises, mises à froid dans de l'eau commune.* 35

CHAP. XIII. *Des infusions de fenoüil, de sauge, de melon, de verjus, de tiges de souci avec les fleurs.* 36

CHAP. XIV. *D'une infusion de foin nouveau, mis à froid dans de l'eau commune, le 4. Juin 1711.* 38

CHAP. XV. *Seconde infusion de foin nouveau.* 39

Troisiéme experience faite sur de semblable foin. 40

CHAP. XVI. *Composition de plusieurs infusions mises ensemble dans un seul vaisseau.* la même.

CHAP. XVII. *On prouve dans ce Chapitre qu'il y a de tres-petits animaux qui en devorent de plus gros.* 41

Qu'il y en a de si petits qu'ils échapent aux meilleurs yeux armez de Microscopes. la même.

Qu'au bout d'un certain tems en esté on découvre des petits poissons dans l'eau de riviere, ou dans celle de fontaine, sans s'être corrompuë. la même.

Qu'au bout de quatre heures, & même en moins de tems, on trouve plusieurs especes de poissons dans l'eau que l'on donne à boire à des oiseaux. la même.

Et enfin comment les graines & les plantes doivent être mises en infusion pour produire de bons effets, par rapport aux experiences dont nous parlons. la même.

CHAP. XVIII. *Hypothése pour servir à rendre raison de la naissance, du progrès & de la mort des animaux que l'on observe dans les liqueurs préparées, & dans celles qui ne le sont point.* 44

CHAP. XIX. *Continuation des experiences sur les liqueurs.* 46

D'un ver de terre trouvé parmi des herbes potageres. la même.

CHAP. XX. *D'une infusion de Rhubarbe.* 47

CHAP. XXI. *De l'infusion d'un champignon, mis à froid dans de l'eau commune.* 48

CHAP. XXII. *Des petites fleurs colorées diversement, qui se trouvent dans les prez.* 49

CHAP. XXIII. *Du petit basilic qui a une odeur de citron.* 51

CHAP. XXIV. *D'un sediment de vinaigre détrempé d'eau commune.* 51

Remarques importantes. 52

CHAP. XXV. *De l'infusion des Barbeaux.* la même.

CHAP. XXVI. *D'une infusion de foin vieux.* 53

CHAP. XXVII. *De l'infusion des fleurs d'un Citronier.* 57

CHAP. XXVIII. *D'une infusion d'anémone, surnommée la Royale.* la même.

CHAP. XXIX. *Des infusions de trois differentes portions d'une tige de celeri, mises à part dans divers vaisseaux de verre.* 58

CHAP. XXX. *De plusieurs infusions de paille & d'épis de bled.* 65
Des Signes. 66
Des Grenades aquatiques, couronnées & barbuës. 68
CHAP. XXXI. *De la paille d'orge, de celle du ségle, de celle d'avoine, & du bled de Turquie; chacune de ces choses mises séparément en infusion dans de l'eau commune.* 71
CHAP. XXXII. *De l'écorce de bois de chêne qui porte le gland, mise en infusion dans de l'eau commune.* 72
CHAP. XXXIII. *Suite des Observations faites sur la même écorce de bois de chêne, qui étoit venu flotant sur l'eau depuis Montargis jusqu'à Paris.* 81
CHAP. XXXIV. *Des nouveaux poissons trouvez dans une infusion d'écorce de bois de chêne neuf.* 82
CHAP. XXXV. *Dissertation sur la maniere dont on apperçoit les objets qui sont vûs au travers des Microscopes, & des Lunettes d'approche.* 85

Fin de la Table des Chapitres de la premiere & seconde Partie.

Des Caracteres & de l'Imprimerie de JACQUES COLLOMBAT, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture. 1718.

Les Anguilles, Serpens, ou Vers du vinaigre. Pl. 1.



De l'eau où l'on a mis infuser du Poivre.

Des Poissons obseruez dans une infusion de Sené.



1°. *Des Animaux obseruez dans l'eau des huistres à l'escaille.* *Pl. 4*

2°. *Et de ceux que l'on a vû dans des infusions d'oeillets.*




2· Infusion de Barbeaux·
1· Infusion de Roses, d'oeillets, et de Jassemin
4· Infusion de queuës de Framboises·
3· Infusion de Thé·
6· Infusion d'epine vinette·
5· Infusion de fenoüil et de Sauge·
8· Infusion de fleurs de Soucy·
7· Infusion d'une grape de Verjus·
L
I
H
G
F
M
K
E
A
B
C
D
D
2
2
3
4
1
Q
P
O
O
O
O
N
X
V
T
S
R
Z
&
Z
Y

Pl. 6

Cette Planche contient tout ce qui s'est vû de plus remarquable dans neuf sortes d'infusions.



Infusion de Celery mis dans de l'eau commune. *Pl. 7*

Infusion de paille et d'épis de bled.

Grenades Aquatiques, couronnées et Barbues Pl. 9.



Infusion d'écorce de bois de Chesne.



Suite des Animaux trouvéz dans linfusion de l'écorse de bois de Chesne

Pl 11

Des Poissons trouvéz dans une infusion à froid d'écorce de bois de chesne neuf

Pl. 12.

Vigneux F.

∂-228.